

SCRIBONII

LARGI, MEDICI VETUSTIS

simi, de compositione medica-

camentorū liber, iam prius

dem Io. RVELLII

opera è tenebris erutus, & à

situ vindicatus.

Antonij Beniuenij libellus de abditiis

nonnullis ac mirandis morborū

& sanationum causis.

Polybus de salubri uictus ratione prius

torum, Guinterio Ioanne

Andernaco interprete.

Apud Andream Cratandrum.

M. D. LXIX.



CANDIDO LECTORI.

Nihil sane in literatorum uotis æquè fuit, atque re-
 diuius priscorum imagines omneis, easq; quàm libet
 edacis temporis iniuria delitas, posteritatis memo-
 riæ tradere. In qua re cum mirè sudatum sit, hætenus
 tamē post alios huius calculi inultos, Scribonius Lar-
 gus (indignum) sepultus delituit. Eccum tamen Ruell-
 ij uiri diligentissimi opera, laborēque reducem, ceu
 postliminiū, habemus. Noluit enim homo sanctus hac
 nos diutius antiquitate ueneranda fraudari: scilicet
 qui hunc ipsum inter medicos eo albo habitum sciebat
 quem Galenus non commendarit modò, sed πρὸς καὶ
 τὰ τόπῃ pluribus locis sequeretur. Iam quibus tē-
 poribus floruerit, ipse sibi testis est fidelissimus: quē
 etiam recepisse se ab Tyberij Cæsaris legato medica-
 mentum, hoc libro fateatur. Interim, optime lector,
 Latino medico frueri, atq; beneficij istud acceptum
 Ruellio feres, Nimirum qui ipse sedendum eum cura-
 rit, plurimisq; in locis multa reposuerit,
 quæ ætatis superioris incuria
 deprauata, contabue-
 rant. Nonnul-
 la etiā
 ex Galeno, quod ex notulis
 prehendas licet,
 reddidit.



COMPOSITIONVM INDEX.



AD capitis dolorem primis diebus, etiā
in febre. Compositio prima.

Item ad eundem aliud. 2

Ad capitis dolorē pluriū dierum. 3

Ad capitis dolorem omnem. 4

Ad capitis dolorem, cum inueterauerit. 5

Purgatio capitis per nares. 6

Alia purgatio per nares. 7

Alia purgatio. 8

Purgatio capitis per os. 9

Sternutatorium ad diuturnum capitis dolorem. 10

Ad capitis omnem dolorem, & quamuis ueterem,
quæ & in perpetuum sanat. 11

Ad comitalem morbum simplicia quatuor, compo-
situm unum. 12

Ad eundem aliud. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

AD OCVLOS Collyria leuia.

Ad conturbationes & epiphoras oculorum simplex
res, quæ omni collyrio melius facit. 19

Ad easdem collyriū ex plātaginis succo mirificū. 20

Ad easdem aliud. 21.

Ad easdem Diaglaucium nouè factum. 22

Ad plurium dierū ἐπιφοσὰς, cum glutinosa lachry-
ma fluit. 23

Aliud collyrium ad tenuem lachrymam, & ad pustu-
las, & hulcera pura. 24

Collyrium ad sordida hulcera, & crustas, quas ἐχέ

COMPOSITIONVM

- 303 Græci uocant. Item ad carbunculos, pustulas,
 & aspritudinem palpebrarum recentium. 25
 Collyriū leue, quod facit ad tenuem & acrem lachry
 mam, pustulas, & ad uestiones, & hulcera. Itē ad
 solutas cicatrices, quod quidā Athenippon, quidā
 Diasmyrnes, alij εὐωδὲς uocant. 26
 Aliud ad idem ἡπικρόν. 27
 COLLYRIA acria, & πικρὰ ad cicatrices ex
 tenuandas, & palpebrarū aspritudinem. 28
 Alio modo ad idem. 29
 Ad palpebras perungendas. 30
 Aliud quo Augustus usus est collyrium ἡπικρόν. 31
 Ad caliginē & aspritudinē oculorū, siccamq; pertur
 bationem, quam ξηροφθάλμια Græci uocāt. 32
 Aliud ad caliginem & aspritudinem. 33
 Aliud ad idē, quod magis mulieribus cōuenit. 34
 Ad cicatrices extenuandas ueteres, & caliginem, &
 aspritudinē acrem: quod semel inunctum plurium
 dierum effectum exhibet. 35
 Collyrium quod propriē ad aspritudinem & callosē
 tatem palpebrarum facit. 36
 Liquidum medicamentum ad ueterrimā aspritudinē
 palpebrarum, & callos durissimos. 37
 Aliud liquidū medicamentū ad suffusiones. 38
 Ad auriculæ dolorem, & tumorem simplicia bene
 facientia sex. 39
 Ad idem compositū ex duabus rebus mirificum. 40
 Ad tumore

INDEX.

Ad tumorem & exulcerationem aurium.	41
Aliud ad carnem in foramine auris excrescentē.	42
Ad parotidas simplex.	43
Compositio ad idem.	44
Alia cōpositio ad easdē antequā suppurauerint.	45
AD sanguinis eruptionē de naribus remedia.	46
Medicamentū cōpositū ad idē. Si præsocabuntur obturatis naribus, qua ratione efficiatur ut adspirēt,	
& nihilominus nares spissatas habeant.	47
Ad hulcera in naribus cōpositiones due.	48. 49
Ad grauē odorē earū, quē ὀσάννα Græci dicūt.	50
Ad polypos.	51
Ad grauedinem.	52
AD dentium dolorem, quibus colluendi sunt.	53
Quibus suffire oportet.	54
Quæ cum manducare oportet.	55
Quæ imponere extrā.	56
Qui mouentur dentes, ut confirmentur.	57
Ad eosdem aliud remedium.	58
Dentifricij compositio.	59
Dētifriciū Octauie Augustæ. Aliud Messalinæ.	60
AD fluorem gingiuarū, quas prægnautes quidā uocant, & fluorem sanguinis.	61
Ad cancrū in ore simplicia duo, cōpositū unū.	62. 63
AD faucium & uuae tumorem.	64. 65.
Ad suppurationē faucii suspectā etiā factam.	66
Ad anginam.	67

COMPOSITIONVM

Ad idem compositum ex pluribus.	68.	69.	70
Ad uuam diu iacentem.			71
Ad arteriam diu exasperatam.			72
Ad tumorem arteriæ & tussim.			73
Ad fluorem & raucitatem arteriæ.			74
Arteriace qua melior non est, facit ad omne uitium ar teriæ, cui ratamq; restituit uocem.			75
Ad suspirium simplicia quatuor.			76
Ad idem compositū ex pluribus.	77.	78.	79
Ad strumas simplicia duo.			80
Ad idem compositum ex pluribus, & ad mammarū duritiem.			81
Item ad idem compositum ex pluribus, & ad omnē duritiem.			82
Ad sanguinis eruptionem ex arteria, uel de pectore, uel de pulmone, simplicia quinq;. Imponēda extrā quæ sunt, & quæ euitanda.			83
Pastilli duo ad idem.	84	Pastillus ad idem.	85. 86
Catapotium ad tussim aridam, & ueterem.			87
Catapotium ad tussim cum fluore.			88
Catapotium ad tussim ueterem.			89
Pastillus ad destillationem pectoris, & quicquid sup primendum est, præcipuē ad phthisicos: initio so mnum facit, dolorē omnis partus sedat.			90
Pastillus ad idē remissior Valētis præceptoris mci.			91
Pastillus ad stomachi solutionē. Idē ad deiectionē, & uesicæ dolorē adiuvat, & oculorū epiphoras.			92
			Pastillus

INDEX.

Pastillus ex odoribus, facit ad omnem dolorem, pro-	
prie autem ad tussim.	93
Medicamentū quod cochleario sumitur, ad tussim ari-	
dam, & lateris dolorem cum febre.	94
Alterum medicamentum ad tussim aridam, & horro-	
res qui solent præcedere febres.	95
Aliud medicamentum ad tussim aridam.	96
Ad lateris dolorem, siue cum febre, siue sine febre,	
Pacchij Antiochi mirifica compositio.	97
Eadem ad morbo comitali correptos, quos ἐπιλη-	
πτικὸν dicunt, & furiosos.	98
Eadem ad scotomaticos, & cephalalgicos.	99
Ad suspiriosos, & uocis abscisionem.	100
Ad musculos maxillares, & facies prauas.	101
Ad duritiem mammarum muliebrium.	102
Ad stomachicos quod euidenter conuenit.	103
Ad eos quibus frequenter inacescit cibus, & inflatio-	
nibus urgentur, & ad melancholicos.	104
Ad stomachi uitiū, quod cum siti ardescit.	105
Ad intestina, & colum, & uomicas, & menstrua mu-	
lierum.	106
Ad idem, & comitalem morbum, & furiosos & po-	
dagram.	107
Ad stomachi solutionem, & fluorem.	108
Ad stomachi dolorem & inflationem.	109. 110
Pastillus ad cœliacos & torminosos.	111. 112. 113
Pastillus qui per anum mittitur, cum intestina cancer	

COMPOSITIONVM

occupat.	114
Potio, quæ cum hoc medicamentum subtus immiffum est, propriè conuenit.	115
Ad εἰλεον, qd' est inflatio intestinorū perniciofa.	116
Ad idem uitium alterum medicamentum.	117
Ad idem quod per anum mittitur.	118
Ad coli inflationem, & dolorem uetustum.	119
Cassij medici colice bona.	120
Iulij Bassi medici colice melior. Eadem ad uitia mu- liebria facit.	121
Ad colum, quod & in præsentia tollit dolorem, & in futurum remediat.	122
AD tumorem iocineris, & ad duritiem.	123
Ad duritiem iocineris ueterem.	124
Ad tumorem & dolorem iocineris, & lienis, & re- num, & uesicæ, & qui propter hæc mali coloris sunt. Idemq; prodest ad aquæ mutationes.	125
Ad tumorem & duritiem iocineris ueterem. Idē ad lienofos, & hydropicos, & arquatos, & quibus urina mouenda.	126
Ad auriginem, quod uitium quidā arquatū, quidam regium uocant.	127
Ad lienofos medicamentum.	128. 129
Lienem quod sanat extrā positum.	130. 131
Ad flatu lienofos.	132
AD hydropicos, cum iam distenti sunt aquæ multitu- dine.	133
	Alterū

Alterū medicamentū eiusdē generis efficacius.	134
Aluum mollientia.	135. 136. 137
Purgatio altera per globulos, qui deuorati integri deijciuntur.	138. 139
Ad tineaſ necandas, & lumbricos.	140
Ad lumbricos.	141
Ad τερνερμόν, uitium eſt extremi inteſtini, irritatio cum deſurrectione.	142
Ad renum tumorem, & hulcerationem.	143
Ad renum dolorē pōtio, ac renū, iocineris, lienisq; tu morē, atq; malū colorē, & aquę mutationes.	144
Ad lapidem in renibus innatum, & urinam ſuppreſ ſam.	145
Ad tumorem & exhulcerationem ueſicę.	146
Ad dolorem ueſicę, & difficilem exitū urinae: quod uitium Græci δυοργίαρ dicunt.	147
Ad ueſicam exhulceratam.	148
Ad ſanguinem per urinam reddentes.	149
Ad calculoſos.	150. 151. 152
Ad calculoſos, lienſoſos, hydropicoſos.	153
Ad lumborum dolorem.	154. 155
Ad paralyſin, & lumborū dolorem cōpoſitio Antio chi antidotus: optimè facit acopū ad paralyſin.	156
Ad lumborum dolorem malagma.	157
Ad podagram cum tumore, & ſeruore, & rubore, quam caldam uocant.	158. 159
Ad podagram frigidam.	160. 161

COMPOSITIONVM

Ad utranq; podagram remedium, quod in perpetuū sanat.	162
NE cui serpens noceat.	163
Ne quem scorpio feriat.	164
Ad morsus & ictus serpentium theriace.	165. 166
Altera theriace etiam ad aspidem.	167
Ad uiperæ morsum propriè.	168
Antidotos Zopyri.	169
Antidotos Mithridatis.	170
Antidotos Apulei Celsi ad canis rabiosi morsū.	171
Ad idem remedium quod brachio alligatur.	172
Celsi antidotos.	173
Compositio alia.	174
Emplastrum mirificū ad canis rabiosi morsum.	175
Antidotos Casij ad toxicum, & ad tela ueneno tincta.	176
Antidotos Marciani ad omnia mala medicamenta, quæ τελεῖα, id. est perfecta dicitur, quæ Augusto componebatur.	177
Singulorū malorū medicaminū ppria auxilia.	178
Ad cicutam.	179
Ad opium.	180
Ad altercum.	181
Ad gypsum.	182
Ad spumam argenti.	183
Ad cerussam.	184
Ad coriandrum.	185
	Ad lepo

INDEX.

Ad leporem marinum.	186
Ad salamandram.	187
Ad aconitum.	188
Ad cantharidas.	189
Ad buprestim.	190
Ad dorycnion.	191
Ad ixiam.	192
Ad ephemerum.	193
Ad toxicum.	194
Ad pharicum.	195
Ad tauri sanguinem.	196
Ad lac potum.	197
Ad fungos uenenatos.	198
Ad sanguisugam.	199
Quoties suspicio mali medicamenti fuerit, commune remedium.	200
EMPLASTRUM uiride Triphonis chirurgi, quod facit cum ossa in capite fracta sunt.	201
Emplastrum uiride Megetis chirurgi ad eadem.	202
Emplastrum uiride Triphonis ad uulnera recētia.	203
Emplastrum Traseæ ad eadem minus acre.	204
Emplastrum uiride Triphonis facit ad uetera hū- cera.	205
Emplastrum uiride Glyconis chirurgi mirificum ad omnia uitia corporis, & uocatur Isis.	206
Emplastrum nigrum, quod ὀλέθριον dicitur, facit ad omne uulnus recens & contusum.	207

COMPOSITIONVM

Emplastrum nigrū Traſeæ facit ad omne recens uulnus neruorū, muscutorumq; punctus. Idem articulos præcisos iungit. 208

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi, ad uulnera recentia, punctusq; muscutorum, neruorumq;, ad luxum, cōtusum, præcipuè cū ossa fracta sunt artuum: sine alligatura enim dimidio celerius sanat. 209

Emplastrum nigrū Triphonis chirurgi facit ad contusa, & ad canis morsum, & furunculos. Idem roſa dilutum explet hulcera concaua. Idem uocatur Basilice. 210

Emplastrum nigrum Aristi chirurgi facit ad eadem, & uocatur Tetrapharmacōs. 211

Emplastrum rubrum Dionysi chirurgi facit ad leuia uulnera, & in tenuioribus corporibus. 212

Alterum rubrum emplastrum, quo uenatores utuntur: facit enim ad canis, & ad omniū quadrupedū morsus, Megetis chirurgi. 213

Emplastrū coloris incerti, facit ad omnia mediocria uulnera, & ad morsum omniū quadrupedum: ad contusa, incisa articulamenta mirè facit. Item cicatricem ducit, tumorem non patitur fieri, neq; pus: fasciam, lanam succidam non desiderat: in balneo aut solio non excidit. Furunculos, strumas aut discutit, aut aperit, aut persanat. 214

Emplastrum luteum Euelpisti chirurgi, facit ad tenebra hulcera mediocriter leſa. 215

Emplastrum

- Emplastrum** quod aperit, & ducit pus, uel si quid aliud subest, Epispasticū dicitur. 216
- Emplastrum** ex sale album, quod Dialon Græci uocant, facit ad omnē duritiem, & diutinum dolorē, & ducit sudores: eadem hulcera callosa renouat, & cogit facilius cicatricem ducere. 217
- Emplastrū** aliud ex sale nigrū ad eadē efficacius. 218
- Emplastrum** album ad combusta, & exhulcerata ex frigore, quæ Perniones uocantur. 219
- Emplastrum** album ad cicatricem ducendam Pacchij Antiochi, ad perniones, ad combusta, & hulcera, quæ Cacoëthes Græci dicunt. Idem ex rosa dilutum facit melius omni lipara, ad omnia uitia quæ in ano fiunt. 220
- Emplastrū** ad combustum mirificè facit. Idem nigrū & citò persanat. 221
- Lipara** ad intertriginem, & exasperationem, atque tumorem ani. 222
- Lipara** rufa facit ad fissuras ani, quas Rhagodas Græci dicunt. Eadem ad eiusdem partis uitia, & hulcera diutina. 223
- Ad condylomata simplicia complura.** 224
- Ad idem composita.** 225. 226
- HAEMORRHOIDAS** quemadmodū medicamento curare oporteat. 227
- Non exhulceratas eminentias ex qualibet corporis parte medicamento tollere.** 228

COMPOSITIONVM

Suppurationem sine ferro a perire: & quod idem me- dicamentum pectoris, lateris, lumborum diutinos dolores tollit.	229
Melior Triphera, hoc enim nomine appellatur ut- runq; genus medicamenti.	230
Ad stigmata tollenda medicamentum.	231
Intestinum extremũ cum prodit, quibus oporteat re- medijs uti.	232
Ad testiculorum tumorem.	233
Ad ueretri tumorem.	234
Si hylcus sordidum fuerit, aut cancro tentabitur, cor- ruptũue fuerit, composita duo.	235
Si cicatrix ducenda est.	236
Ad omne hylcus, in omni parte corporis sordidum, cõmunia simplicia medicamenta, & compositum unum.	237
Ad omne purũ hylcus, & concavũ quæ cõplẽt.	238
Ad omne hylcus, in quo caro excrescit.	239
Ad idem alio modo compositum.	240
Emplastrum ad cicatricem ducendam.	240. 241
Emplastrum ad idem, διὰ καὶ μίας dicitur.	242
Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet cor- poris parte.	243
Ad ignem sacrum complura simplicia.	244
Ad idem compositum.	245. 246
Ad zonam, quam Græci ἐρηκτα vocant.	247
Ad idem aliud medicamentum.	248
Ad impe	

INDEX.

Ad impetigines.	249
Ad suggillationes.	250
Ad scabiem simplex unum, compositū unum.	251
Ad lepram, quæ quasi impetigo est cum prurigine cutis, simplicia quatuor.	252
Ad idem compositio.	253
Ad idem alterum malagma.	254
MALAGMA ad ὀπίσθιον ὄτον ὅπου ἐκκινῶνται μὲν. Idem facit ad omnem tensionem & contractionem nervorum.	255
Malagma quod stomachū solutū confirmat, aliū incitat, supprimit, & adstringit quicquid opus est.	256
Malagma ad pectoris & lateris dolorem, & quicquid ex perfrictione fit.	257
Malagma ad omnē dolorē, præcipuè iecinoris.	258
Malagma ad iocineris et lienis tumore et dolorē	259
Malagma ad præcordiorum tensionem.	260
Malagma ad lienosos.	261
Malagma ad omnem ueterem dolorem, præcipuè lumborum.	262
Malagma quod discutit strumas, parotidas, panum. Idem suppurationes interaneis partibus futuras aperit. Idem facit ad omnem dolorem articularū, præcipuè lumborum.	263
Malagma ad omnem dolorem corporis, & articularum: facit & ad podagram.	264
Malagma ad contusionem lateris. Idem facit ad sua	

COMPOSIT. INDEX.

- ſpectas in iſdem partibus ſuppurationes, uel lam
factas: aperit enim citò, & ſanat. Idē prodeſt præ
cordijs tenſis, iecinori duro.* 265
- Malagma ad luxum, contuſum, canis morſum, paroz
tidas, ſtrumas, podagram.* 266
- Malagma ad podagram, & omnem dolorem, & ten
ſionem neruorum.* 267
- ACOPVM ad perfrictionem, laſſitudinem, dolorē,
tenſionem neruorum. Idem hyeme non patitur
perfrigeſcere.* 268
- Acopum quod per uindemiæ tempus componitur, fa
cit ad omnē dolorem corporis, & neruorū.* 269
- Acopum odoris grauioris ad perfrictionem, & do
lorem neruorum.* 270
- Acopum optimi odoris, quo Auguſta Antonia ſerē
utebatur, facit ad neruorum dolorem: perfrigeſce
re non patitur.* 271

FINIS.

SCRIBONI

VS LARGVS CAIO IV

lio Callisto suo S.



Nter maximos quon-
dam habitus medicos
Herophilus, Cai Iuli
Calliste, fertur dixisse
se medicamenta diuina
num munus esse. Et id

quidem nō sine ratione, ut mea fert opinio. Prorsus enim quod tactus diuinus efficere potest, id præstant medicamenta, usu, experientiaq; probata. Animaduertimus itaque sæpe inter deliberationes, cōtentionesq; medicorum auctoritate præcellentium, dum quæreretur quidnam faciendū, aut qua ratione succurrendum esset ægro, quosdam humiles quidem, & alioquin ignotos, usu uerò peritiores, & (quod fateri pudet) longè summos à disciplinā medicinæ, ac ne† ad fines quidē eius professionis, medicamento efficaci dato, protinus uelut præsentī numine, omni dolore, pericula

† ad fores
quidē eius
profectos.

loq; liberasse ægrum. Quamobrem spe-
nendi sunt qui medicinam spoliare ten-
tant usu medicamentorum, nō à meden-
do, sed à potētia, effectūq; medicamen-
torum ita adpellatam. Probandi autem
qui omni modo succurrere periclitan-
tibus student. Ego certē aliquoties ma-
gnū scientiæ consecutus sum titulum
ex usu prosperē datorum medicamen-
torum, multosq; ex eadē causa non me-
diocrē gloriā tulisse memini. Est enim
hæc pars medicīnæ ut maxime necessa-
ria, ita certē antiquissima, & ob hoc pri-
mum celebrata, atq; illustrata. Siquidē
uerum est, antiquos herbis ac radicibus
earum, corporis uitia curasse: quia etiā
tunc genus mortalium inter initia nō fa-
cilē se ferro committebat. Quod etiam
nunc pleriq; faciunt, ne dicam omnes:
& nisi magna cōpulsi necessitate, spēq;
ipsius salutis, non patiunt sibi fieri, quæ
sanē uix sunt toleranda. Cur ergo aliqui
excludāt medicinam & usum medica-
mentorum, non inuenio, nisi ut detegāt
imprudētiam suam, Siue enim nullum
experis

*Medicina
necessaria.*

experimentum eius generis remediōrū habēt, meritō accusandi sunt, quod tam negligentes in tam necessaria parte fuerint: siue experti quidem sunt eorū utilitatem, denegant autē usum, magis culpandi sunt. Qui crimine inuidentiæ flagrant, quod malum cum omnibus animantibus inuisum esse debet, tum præcipuè medicis, in quibus nisi plenus misericordiæ & humanitatis animus est, secundum ipsius professionis uoluntatē, omnibus dijs & hominibus inuisi esse debent. Idcirco ne hostibus quidem malum medicamentum dabit, qui sacramento medicinæ legitimè est obligatus: sed persequet̃ eos, cum res postulauerit, ut miles & ciuis bonus omnimodo: Quia medicina nō fortuna, neq; personis homines æstimat, uerum æqualiter omnibus implorantibus auxilia sua succursuram se pollicetur, nulliq; unquam nocitaturam profitetur. Hippocrates cōditor nostræ professionis, initia disciplinæ ab iureiurando tradidit: in quo sanctū est, ne pręgnantī quidē medicamentū, quo

conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur à quoquam medico, longè præformans animos discipulorum ad humanitatem. Qui enim nephas existimauerit spem dubiã hominis lædere, quanto scelestius perfectè iam nato nocere iudicabit? Magni ergo æstimauit nomẽ decusq; medicinæ conseruare, pio sanctoq; animo quenque secundum ipsius propositum se gerentem. Scientia enim sanandi, nõ nocendi est medicina. Quæ nisi omni parte sua plenè incumbat in auxilia laborantium, non præstat quam pollicetur hominibus misericordiam. Desinãt ergo qui prodesse adflictis aut nolunt, aut non possunt, aliosq; detererẽ, negãdo ægris auxilia, quæ per uim medicamentorum frequenter exhibentur. Etenim quasi per gradus quosdam medicina laborantibus succurrit. Nam primum cibus ratione, aptoq; tempore datis, tentat prodesse languentibus. Deinde, si ad hos non responderit curatio, ad medicamentorum decurrit uim. Potentiora enim hæc & efficaciora, quàm cibi.

cibi. Post ubi ne ad hæc quidem cedunt
 difficultates aduersæ ualeitudinis, tunc co-
 acta ad sectionem, uel ultimo ad uisio-
 nem deuenit. At Asclepiades maximus
 autor medicinae, negauit ægris danda
 medicamenta. Quidam enim hoc men-
 dacio etiam pro argumēto utuntur. Po-
 teram tamen (si uerū id esset) dicere: Vi-
 derit Asclepiades quid senserit, forsan
 non omnino in hanc partem animū in-
 tendit. Homo fuit, parum feliciter se in
 hoc negotio gessit. Nō deterreor perso-
 na, quū rem tam manifestè prodesse ui-
 deam. Nunc uero quum tam impudens
 cōminiscatur de eo, quid possum ul-
 tra dicere, nisi genere quodam parrici-
 dium ac sacrilegium eos cōmittere qui
 hæc dicūt? Ille enim febricitantibus, ui-
 tijsq; præcipitibus correptis, quæ ὁξὺν
 πάθος Græci dicūt, negauit medicamen-
 ta danda: quia cibo uinoq; aptè interdū
 dato remediari tutius eos existimauit.
 Cæterum in libro qui Ἰπποκράτους, id
 est, præparationum inscribitur, conten-
 dit ultimæ fortis esse medicum, qui non

ad singula quæque uitia binas ternasue
 cōpositiones, & expertas protinus pa-
 ratas habeat. Vides ergo quàm nō pla-
 ceat Asclepiadi usus medicamētorum?
 cui nisi plura quis ad quodq; genus uitij
 medicamenta composita habeat, nō ui-
 detur dignus professiōe medicinæ. Sed
 ista licentia nomine tantummodo medi-
 corum, propter quorundam negligē-
 tiam latius processit. Rarò enim aliquis
 prius quàm se suosq; tradat medico, dili-
 genter de eo iudicat: cum interim nemo
 ne imaginem quidem suam committat
 pingendam, nisi probè prius artifice
 per quædā experimētū atq; ita electo.
 Habent itaque omnes pondera atque
 mensuras exactas, ne quid erroris in re-
 bus non necessarijs accidat: uidelicet
 quia sunt quidā qui pluris omnia quàm
 seipsos æstimāt. Itaq; sublata est studen-
 di cuiq; necessitas, & non solū antiquos
 autores, per quos consummatur profes-
 sio, quidam ignorant, sed etiam commi-
 nisci falsa de his audent. Vbi enim dele-
 ctus non est personarum, sed eodem nu-
 mero

*Medicus
 expertus
 eligendus.*

mero malus bonusq; habetur, quod sine labore potest contingere, idemq; dignitatis utilitatisq; præstare uidetur posse, unusquisq; id magis sequitur. Sic, ut quisque uolet, faciet medicinã. Quosdã enim à peruerso proposito nemo potest mouere, & sanè omnibus permisit liberarum arbitriũ magnitudo professionis. Multos itaque animaduertimus, unius partis sanandi scientia, medici plenum nomen consecutos. Hos uero ab initio rectam uiam secuti, nihil prius totius artis perceptione, quæ homini permittitur, iudicauimus: Quia ex hac omnia commoda nos cõsecuturos existimabamus: nõ mediũfidiũ tam ducti pecuniæ aut gloriæ cupiditate, quàm ipsius artis scientia. Magnum enim & supra hominis naturam duximus, posse aliquem tueri, & recuperare suam, & uniuscuiusq; bonam ualeitudinem. Itaque ut cæteris partibus disciplinæ, ita huic quoq; quæ per medicamenta uirtutẽ suam exhibet, curiose institimus: eò magis quòd percipiebamus in dies ex usu profectus eius,

quos interdum supra fidem atq; opinio-
nem plurimorū exhibebamus. Sed qd
ultra opus est probare, necessariū usum
esse medicamentorum; præcipue tibi,
qui quia percepisti utilitatē eorū, idcir-
co à me compositiones quasdam petij-
sti. Ego autem memor humanitatis tuæ
candorisq; animi tui, quē omnibus qui-
dem hominibus plenè, mihi autem etiā
peculiariter præstas, nō solum quas de-
siderasti, uerumetiam si quas aliās exper-
tas in præsentī habui, in hunc librū con-
tuli. Cupio enim mediūsfidius qua pos-
sum, tuæ in me tam perseueranti bene-
uolentiæ respondere, adiutus omni tem-
pore à te, præcipue uerò his diebus. Ut
primum enim potuisti, nō es passus ces-
sare tuæ erga me pietatis officium, tra-
dendo scripta mea latina medicinalia,
Deo nostro Cæsari; quorum potestātē
tibi fecerā, ut ipse prior legeres, simpli-
citerq; indicares mihi quid sentiret; plu-
rimum enim iudicio tuo tribuo. Tu por-
rò cādīdīssimo animo & erga me bene-
uolentiūssimo, diligētiam meam sub tan-
ti nomī-

ti nominis editione, non uerbis, sed re probasti: periculumq; non minus tui iudiciij, quàm ego styli, propter me adisti, quo tempore diuinis manibus laudando consecrasti. Fateor itaq; libèter, unicam me tibi gratias agere, quod & prius quàm rogareris, consummasti amicissimo adfectu uota mea, quod contigit mihi fauore plenissimo tuo, maturiorem percipere studiij huius mei fructũ ac uoluptatem. Ignosces autem si paucae uisae tibi fuerint cõpositiones, & nō ad omnia uitia scriptae. Sumus enim (ut scis) peregre, nec sequit̃ nos nisi necessarius admodum numerus libellorum. Postea tamen, si & tibi uidebit̃, ad singula quaeq; uitia plures compositiões colligemus. Oportet enim copiam quoq; earum selectam habere: Quoniam reuera quaedã quibusdam magis, & non omnes omnibus conueniunt, propter differentiã scilicet corporum. Quarum initium à capite faciemus: summum enim & primum locum hoc obtinet, dantes operã ut simplicia primò ponamus. Interdum enim

hæc efficaciora sunt, quàm ex pluribus
composita medicamenta. Erit autem
nota denarij unius pro græca drachma:
æque eñ in libra. *. denarij octoginta
† sunt, sicut
drachmæ quatuor apud nos † quot drachmæ apud
Græcos incurrunt. Primū ergo ad quæ
uitia compositiones exquisitæ & aptæ
sint, subiecimus, & numeris notauimus
quò facilius quod quæretur inueniat.

Deinde medicamētorum, quibus
compositiones cōstant, no-
mina & pondera ui-
tijs subiūximus.

SCRIBO

SCRIBO

NII LARGI COM

positiones Medicæ.

AD CAPITIS DOLOREM.

Compositio I.



D capitis dolorē, etiā
in febre, primis diebus
benefacit serpylli pon.
quadrās, rosæ aridæ. p^o
quadrans. Hæc inco-
quantur duobus sexta-

rijs aceti acerrimi, donec ad dimidias
perducantur. Inde sumitur cyathus, &
in duobus rosæ commiscetur, frequen-
terq; ex eo curatur caput; ubi enim con-
caluit quod infusum est, nisi aliud recēs
adijciatur, nocet.

Item prodest eodem modo ruta per
se uel cum hederæ baccis decocta. Poly-
gonium quoq; & menta multis profuit,
ea ratione decocta, & infusa capiti do-
lēti. sphondylion, & agni semē, & plata-
ni pilulæ similiter aceto incoctæ, rosæq;

folia residuo aceto cōmixta. III.

Cum autē pluribus diebus perman-
serit dolor, tum omnium supradictorū
oportet uncias singulas sumere, ijsq; ad
miscere lauri baccarum, castorei, nucū
amararum, pulegiij, sampfuci foliorum,
singulorū uncias, & aceti sextarios tres
decoquere ad dimidiās. Eodem modo
rosa admixta, non tamen frequenter, ca-
put curare. IIII.

Ad omnem capitis dolorem effica-
citer prodest, crocomagnatis pondo
sextās, aluminis fissi, uel gallæ. p°. uncia.
Hæc terere ex aceto & rosa uicibus ad-
iecta oportet, usquedum mellis habeat
spissitudinem: inde frontem, & utraque
tempora oblinere. V.

Ad capitis dolorem, cum inueteraue-
rit, benefacit hæc compositio: Myrrhæ
*. p°. i. croci. *. p°. ij. amygdalorum ama-
rorū. *. p°. ij. rutæ uiridis. *. p°. iij. sphon-
dylj. *. p°. i. panacis. *. p°. i. laurus bac-
carū. *. p°. iij. serpylli. *. p°. ij. castorei
*. p°. i. Teruntur hæc omnia aceto, & fi-
unt pastilli: cum opus est, diluuntur ace-
to &

to & rosa, in mellis spissitudinem, atque ita frons & tempora illinuntur. VI.

Oportet uero permanēte capitis dolore, materiam quoque detrahēre ex eo per nares, uel os. Quæ res etiā auriculæ, uel dentibus dolētibus prodest. Nec minus quibus subitæ uertigines obuersantur, quos σκωτομαλικοὺς Græci dicūt. Item comitali morbo correptos, & caligine impeditos ex magna parte leuat. Debēt autem ij omnes pridie abstinere, & superioribus diebus aquam potare. VII.

Per nares ergo purgať caput ijs rebus infusis per cornu, quod rhinenchia tes uocatur: Hedera succo per se, uel betæ succo, cum exiguo flore æris, uel cyclamini succo mixto lacte aut aqua parī mensura. VIII.

Bene detrahit è naribus liquorem & hæc compositio: Salis, nitri, mellis, acetī, olei ueteris, singulorum, *. p^o. binum, cyclamini succi, σαυιδιον & γειας, quā herbam pediculariam, quod pediculos nescat, quidam appellāt, singulorū, *. p^o. i.

Hæc in unum mixta, naribus per cornū infunduntur, uel pinna longiore nares interius perfricantur. Cum satis uisum fuerit fluxisse, ut reprimatur, aqua frigida nares diutius abluere pura oportet: uel ea, in qua pridie crocum adiectum maceratum fuerit. IX.

Sed si per os magis detrahere materiam uisum fuerit, quia non sine tormento per nares ea deducere, suadebimus pyrethri radiculam cōmanducare, atq; subinde hiantem pati fluere saliuā: uel uuam passam cum piperis albi granis totidem dabimus commanducandam, & expuendā: æque enim & hæc deducūt pituitam. Benefacit & sinapi ex aceto tritum, & non excastratū, gargarizatū trium cyathorū mēsurā, admixto mel-
lis. p^o. quadrante; detrahīt enim largiter pituitam. X.

Prodest cum diu caput dolet, adtondere ad cutem, & radere, & diutius sic cum ad relaxationem cutis fricare, & aqua calida fouere pura, uel laurum in coctam habēte. Quo tempore etiā ster-
nutamen.

nutamentum concitare non alienū erit medicamento, quod ex his rebus componitur : Veratri albi, castorei, struthij quod est radix lanaria, piperis albi, singulorū. *. p^o. i. hæc confusa tenuiter forato cribro transmittuntur : cum opus fuerit, per pinnam, uel calamum scriptoriū naribus sufflentur, uel specillo tincto in aquam, & excusso, tacta naribus iniiciantur. Proritat sternutamentum etiam per se confusum, & eadem ratione iniectum ueratrum album. Nigrum, siccum, & aridum sternutationem statim inuitat.

XI.

Capitis dolorē quemuis ueterem & intolerabilem protinus tollit, & imperpetuum remediāt torpedo uiua nigra, imposita eo loco quā in dolore est, donec desinat dolor, & obstupeſcat ea pars : quod cum primū senserit, remoueatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. Plures autē parādæ sunt eius generis torpedines : quia nōnunquā uix ad duas, trēsue respondet curatio, id est, torpor, quod signū est remediatiōis.

Ad comitiale morbum.

XII.

AD comitiale morbum, quem Græci ἐπιληψίαν uocāt, herbam quam ijdem πολυνεύρον, nos nervalem appellamus, oportet ieiunum quamplurimum uiridem comesse, à prima luna ad tricesimam. Hæc eadē herba ebrio data copiosa, in crapula uinum discutit, mentemq̃ restituit.

XIII.

Item hinnulei cerui coagulū intra nouem dies exceptum, benefacit ad morbum comitiale. Intelligitur autem dierū numerus ex eo, quod iacent aures simul eorū primis temporibus, à nono em̃ die subrigūtur. Oportet ergo sumere tunc coagulum, & arefacere, quo neq̃ Sol, neq̃ Luna accedit, atq̃ inde dare pueris uiciæ magnitudinis globulum, ex aquæ caldæ cyathis duobus: maioribus uerò natu fabæ solidæ magnitudine, ex aquæ caldæ cyathis tribus per dies triginta. Donentur autē aquæ puræ supra medicamentū cyathi duo, aut tres. Hoc remedium qui monstrauit, dixit ad rem pertinere, occidi hinnulum cultro quo gladiā

gladiator iugulatus sit. XIII.

Constat inter plures & crocodili testiculum. *. p^o. i. aut uictoriati, per dies triginta ex aquæ cyathis tribus sumptum multos remediâsse. XV.

Ad recentem comitiales morbum cito proficit, ad ueterem tardius, tymi albi *. p^o. iij. ex acetî cyathis tribus, & mellis boni pondo uncia : ut dilutum ieiunus bibat per dies quadragintaquinque. Sed cum biberit, citatus ambulet milia passuum minimè duum. XVI.

Scio Romæ quandam honestam matronam aliquot comitali morbo liberasse hoc medicamento : eboreæ scobis hemina, mellis Attici pondo libra, hæc in unum miscentur. Postea adiicitur, si puer fuerit qui laborat, testudinis masculæ, palumbi masculi, utrorumque ferorū, id est, nuper captorū sanguis, quantum fluxerit dum uiua utraq; animalia dimittantur. Sin autem puella fuerit, foemineî generis animalia sint, & eodem modo capta, sanguine effuso emittant. Oportet autem clauum Cyprii æris acui

tum demittere in iugulū testudinis, & palūbū uenas, quæ sub alis sunt, ære acuto incidere. Hoc medicamentū ligneo uase seruatum reponitur. Cum opus fuerit, datur ex eo luna decreſcente per continuos dies triginta: primum cochlearia tria, deinde quinq̃, deinde ſeptē, deinde nouem, ſummum undecim: & rurſus nouem, deinde ſeptē, deinde quinq̃, poſtea tria: & iterum augetur, minuiturq̃ numerus cochleariorū, donec dies triginta antedicti cōſumantur. Poſtea oportebit ſcobis eboreæ heminam per duos meſes conſumere uitio corruptum, accipientem ex ea terna cochlearia in diē, ex aquæ cyathis tribus. Hoc medicamento qui utitur, neque uinum, neq̃ ſuillam guſtet. Præterea habeat in brachio uerua eborea. Nam ſunt & qui ſanguinem ex uena ſua miſſum bibant, aut de caluaría defuncti terna cochlearia ſumant per dies triginta. XVII.

Item ex iecinore gladiatoris iugulati particulā aliquam nouies datam conſumant, Quæq̃ eiſdem generis ſunt, extra

extra medicinae professionē cadūt: quī
profuisse quibusdā uīsa sunt. XVIII.

Illud tamen nō oportet ignorare, sa-
nari hoc uitiū cum cognitum est, aliqui-
bus: uiros facilius mulieribus remedia-
ri: pueros, uel uirgines liberari post cō-
plexū & deuirginationē.

Collyria composita leuia.

XIX.

AD conturbationes & epiphoras
oculorum scio multa collyria, ta-
met si tardē, magnos tamen effectus ha-
bere. Sed nulli collyriorum tantum tri-
buo, quātū lycio Indico uero p se. Hoc
enim inter initia, si quis hoc collyrio in-
ungatur protinus, id est, eodem die, &
dolore praesenti, & futuro tumore libe-
rabitur. Superuacuum est autem nunc
laudes eius referre, in alijs enim exper-
tus intelliges simplicis rei uix creden-
dos effectus.

XX

Oportet uero minimē quater, quin-
quiesue ex intervallo inungere, deinde
cum combiberint oculi ad singulas in-
unctiones, eaq; quā poterint sustine-
re calidissima, spongijs expressis uapo-

rare eos diutius, eodemq; die in balnea ducere, ita ut cū cætero corpore caput quoq; & facies calida immergat, & fo ueatur: uinoq; uti ut quisque assuetus est. Postero die si qua uestigia epiphora remāserint, inungere collyrio aliquo acriore aquato sub uespere, & rursus in balneum deducere, & uinum dare eodē modo. Ferē enim uno die tollit epiphoram, & præcipue incipientem, neq; adhuc alio medicamēto tactam. Sed si ea uis fuerit epiphora ut nō cedat uno die, spectare oportebit donec impetus sedetur, & ita in balneū deducere, cæteraq; facere quæ præcepimus. Idem hoc medicamentum etiā suprā perunctū tardius quidem, sed eosdem effectus præstat, maximē in teneris corporibus, ut mulierum, & puerorum, quorum oculi nullius medicamenti uim sustinent: tria duo enim aut plerumq; quatrīduo tollit dolorem, adiutū ouī infusione, & aquæ calidæ uapore.

XXI.

Item compositorū collyriorū hoc maximē probo ad recentes epiphoras, & contur

cōturbationes oculorū, tumoresq̃, & dolores: Aloës Indicæ, *. p^o. iij. croci *. p^o. ij. opij. *. p^o. i. gūmis. *. p^o. iij. plantaginis succi cyathos tres. Terere oportet per se crocū diligēter, deinde cætera admiscere pridie macerata succi plantaginis cyatho: atque ita reliquis duobus cyathis admixtis, cum spissata fuerint, fingere collyria. Vtrunq̃ autem genus medicamenti eximiè prodesse iudico, proprietate quidem quadam: sed præcipuè quòd nullam in se aspritudinem habet, ut pleraq̃ quibus ferè inunguntur homines. Nam quæ ex cadmia, aut ære usto, eiusdemq̃ generis pigmentis componuntur, quibus curiosè terantur, naturā suā tamen amittere non possunt. Nunq̃ enim ut succus diluunt, sed cum in summam subtilitatem deduci non possint, perseverantia tamen terentium, corpora quasi puluerulenta necesse est maneat. Quorū uerò partes uelut configūt, certè exterius pungūt foramina prima, & tuniculam oculi, atque initijs interdum non tam molestam futuram con-

citant epiphoram.

XXII.

Quod nomine etiam quidē Diaglaucium dicī, probo in inītijs. Nā & hoc genere quodam ex eadem materia constat, nec ullam aspritudinē habet, quando sic cōponit: croci, *.p°.v. sarcocollæ *.p°.x. glaucei succi, *.p°.xx. tragacanthi, *.p°.v. opiī. *.p°.v. Et hoc em̄ ego adiūcio, & ita melius respondet, scilicet opiū & in hoc, & in omni collyrio, medicamētū. Verū adiūcere oportet, qđ ex lacte ipso syluatici papaueris capitū fit, nō ex succo foliorū eius, ut pigmentarij institores eius rei cōpēdi causa faciūt. Illud em̄ cū magno labore exiguū cōficitur, hoc sine molestia & abūdāter teritur. Ante oīa crocū aqua pluuiatili, deinde adiūcit sarcocolla, glauciū, opiū, tragacanthū, prius omnia seorsum macerata nō multa eius generis aqua: ut qđ primum, id est (si potest fieri) eadem die fingantur collyria: solet enim diu neglectum mortario inarescere. His uti primis diebus collyrijs, non cāteris auxilijs prout res postulat, abstinendo dico sanguis

sanguinis detractiōe, meliusq; eam cæteris proficere adfirmo. XXIII.

Cū uero pluribus quis diebus uexatus fuerit epiphora cū perseuerantia tumoris, & pītuita ipso calore oculorum glutinosior uisa fuerit (qd' ferè sexto septimoq; die accidere solet) tū proderūt & ea quorū genus superius improbaui mus, cōposita ex rebus metallicis. Facilius em̄ iam patiūtur oculi (si modo exulcerati nō fuerint) iniuriā. Quorū præcipuè hoc mihi placet, qd' à colore φουόρ dicif. Accipit aut hęc: æris usti, *. p°. xij. cadmiæ ustæ, *. p°. xij. stibij cocti *. p°. xij. acaciæ chylismatis, *. p°. vi. aloes, *. p°. iij. opij, *. p°. ij. croci, *. p°. iij. castorei uictoriati p°. myrrhæ, licij, idem scilicet pōderis, cōmis, *. p°. xvij. aqua pluuiatili quæ sunt durata diu, teruntur donec leuissima fiāt: postea cætera alio mortario singula trita admiscenť: dum tollendū est, cōmi adiicif. Hoc quidem etiā in initijs utunť, cum oui aquato liquore p se, uel cū collyrio, qd' à cinereo colore ποσιῶκον appellat. XXIIII.

Collyrium spodiaceum à quibusdā cinereum dicitur, componitur autem ex his: cadmiæ, botryitidos ustæ super testam donec incandescat, & uino falerano extinctæ. *. pond. xl. cretæ samiae, quam uocant astra. *. p°. lxxx. stibij cocti. *. p°. xx. opiij. *. p°. x. cōmis Alexandrini. *. p°. xx. Terunt hæc omnia aqua pluuiatili, commi ultimū adijcitur: ante hoc, cum cætera leuia sunt facta, opiū miscetur maceratum pridie aqua. Facit hoc per se etiam initio cum tenuis abundansq; fluat lachryma, & pustulæ molestæ sunt: aut cum prima tunica oculi exesa est, aliæue exulcerata. Cum purum hulus est, diluitur ferè oui albore, quod est tenuissimum.

XXV.

Ad sordida hulcera oculorum, crustasq; habentia, quas ἑλκῆες uocāt, item carbūculos, quos ἀνθράκας dicūt, facit bene & per se mel Atticum pyxide Cyprij æris conditum, & repositum mensibus duobus, nec minus: quanto em̄ diutius remanet, efficacius fit.

XXVI.

Sed præcipuè hoc collyriū, qd' quidā
Athe

Athenippū, qdā Dīasmynes, quidā ^{εὐω}
 & uocāt, quia boni odoris est. Sed præ-
 cipuè hoc, qd' etiā ad pustulas, papulasq;
 & suppuratiōes oculorū facit, & ad cica-
 trices nō ueteres, & ad palpebrarum re-
 centē, aut in corporibus tenuioribus as-
 piritudinē. Oportet autē eo ad sordida
 hulcera diluto cū ouī albo, id est, aqua
 tissimo uti: deinde cum lachrymæ flue-
 re desierint, cinereo supèr inungere. Itē
 ad pustulas ex ouo tritum facit. Ad pa-
 pulas uerò, & ad dolores cum rubore,
 & distentione oculi sicca, cum lacte mu-
 liebri & ex aqua. Aut ad cicatrices re-
 cētes extenuandas, & palpebrarū aspi-
 ritudinē tollendā, subiecto scilicet spe-
 cillo, aut inuersa palpebra, si quis eo uta-
 tur. Componitur autē ex his: Pompho-
 lygis lotæ. *. p°. viij. æris usti. *. p°. viij.
 croci. *. p°. iij. myrrhæ. *. p°. iij. nardi. *.
 p°. sex semis & uictoriati, lapidis hēma-
 titis. *. pon. duum & uictoriati, pipe-
 ris albi grana decem, opij. *. p°. i. aut ui-
 ctoriati, commis. *. p°. x. teritur uino
 Chio.

XXVII.

Collyrium Psittacinū à colore ita dictum, facit ad epiphoras quæ cum tenui & acri lachryma cōsistunt. Item ad ustiōnes & solutas cicatrices, & uastum tumorem, quem quia à loco interdum uidetur propellere oculum, *περὶ πρὸς ὄφθαλμον* uocant, cum oui albo quod est teuue. Sed præcipuè facit, cū quasi sanguine suffusi sunt oculi, & ob id nullum nisi leuissimum collyrium patiūtur: recipit autem hæc: Croci. *. p°. iiij. cadmiæ. *. p°. iiij. stibis. *. p°. iiij. opij. *. p°. ij. commis. *. p°. ij. amyli & recentis & dulcissimi. *. p°. iiij. Eodē modo quæ scripta sunt, in mortario debent teri ex aqua pluuiali. Amylum autem cum iam fingendum erit collyrium, adijcietur. Interdum & hoc superinungatur qui prius Athenippo curati sunt. His ferè collyrijs leuibz omnia quæ circa oculos cum tumore & dolore fiunt, remediamus.

Collyria acria.

XXVIII.

Acrioribus autem ijs ad cicatrices extenuandas, & palpebras asperas: quod quia ex quatuor rebus ut quædriga

driga equis constat, & celeres effectus habet, ἄγμα dicitur. Recipit autem hæc: æris usti, *. p°. iij. thuris arboris corticis, *. p°. iij. ammoniaci guttæ, *. p°. iij. commis, *. pond. iij. Teruntur ex aqua pluuiali.

XXIX.

Hoc etiam superunctum, ad puerorū epiphoras, & qui non sufferunt inunctionem facit: ut huiusmodi medicamēta, quæ πῆξις τὰ uocant. Croci siculi pond. uncia, cōmis pond. uncia: hæc aqua teruntur, fiunt collyria.

XXX

Est & hoc medicamentum satis efficax, quo ita oportet palpebras perungere, ne quid intra oculū fluat. Recipit autem hæc: Croci siculi, *. p°. ij. crocomagmatis, *. p°. xij. thuris, *. p°. iij. aluminis rotundi, *. p°. vi. opij, *. p°. i. myrrhæ, *. p°. ij. cōmis, *. p°. ij. Vino falerno teruntur, cum leuia facta sunt, & crassitudinem habēt mellis spissi, adijcitur passicretici, p°. sextans: reponitur pyxide stagnæa, si passum adiectum non erit, collyrium erit.

XXXI.

Benefacit & hoc medicamentū, quo

Augustus usus est, & recipit hæc: Alu-
minis fissi. *. p°. xl. thuris cādidi. *. p°. x.
aloēs. *. p°. xv. croci. *. p°. xv. opij. *. p°. ij.
gallæ. *. p°. x. rosæ foliorum aridorū
*. p°. x. plantaginīs succi uel seminis. *.
p°. x. Vīno falerno teruntur, cū leuia fa-
cta sunt, & spissitudinem mellis habēt.
Adjicit passi sextarius, aut hemina, aut
rursus commiscetur. Reponitur uase sta-
gneo, uel argenteo. XXXII.

Collyriū psoricū ad caliginem, & ad
aspritudinē oculorū, siccamq; perturba-
tionē sine tumore, quā ὀφθαλμίας ap-
pellāt. Facit hoc collyriū benè qd' psori-
con dicit. Habet aut hæc: Croci. *. pon.
xij. psorici. *. p°. xxij. psimithij. *. p°. ij.
opij idem, piperis albi idē, cōmis. *.
pond. vi. aqua pluuiāli commiscetur,
teruntur. XXXIII.

Stratioticum collyrium ad aspritudi-
nē, & caliginē. Recipit aut hæc: psimmi-
thij. *. p°. vi. piperis albi. *. p°. i. ompha-
cij. *. p. ij. cadmiæ. *. p°. ij. opobalsami
*. p°. ij. opij. *. p. i. cōmis. *. p°. ij. terunt
aqua pluuiāli. Collyriū hoc melius supe-
riori

riori ad caliginē facit, XXXIII.

Stacton, quod uocant, ad eadem. Ferè autē mulieribus prodest. Habet hæc: cadmiæ. *. p^o. xij, stibis. *. p^o. vi. piperis albi. p^o. ij. mysis usti donec puniceum fiat. *. p^o. ij. æruginis rasæ. *. p^o. i. & uictoriati, æris floris idem, commis. *. p^o. v. aqua pluuiali teritur. XXXV.

Collyrium acre ad extenuandas cicatrices, & quāuis ueteres, caliginemq; & aspritudinē oculorum, quod semel inunctum plurium dierum effectum præstat. Oportet autem eo aquato uti, diu enim tenet, ammoniaci guttæ. p^o. li. brā, æruginis pon. libram, commis. p^o. quadrantem: pluuiali aqua teritur ærugo: postea cætera adiungunt macerata aqua. XXXVI.

Collyriū quod propriè facit ad aspritudinem palpebrarum, & callositatem. Oportet subijcere specillum, aut inuertere palpebrā: æris usti. *. p^o. xxiij. æruginis. *. pon. vi. croci. *. p^o. x. myrrhæ. *. p^o. i. nardi spicæ. *. pon. i. casia rufæ fistularum uictoriati pond. piperis albi

grana. xlv. cōmis. *. pon. nouem, uinō
Chio teruntur. XXXVII.

Medicamētū liquidū ad palpebrarū
ueterrimā aspritudinē, & excrescentem
carnem, *σύνχωσιν* quam uocāt. Item callū
durissimū, Hygrā appellant, quia est li-
quidū medicamentū, carnē ex palpebris
tollit sine magno dolore. Recipit hæc
Myrrhæ, thuris, croci, singulorum. *.
pond. iij. mysios. *. pon. iij. chalcitis. *.
p^o. vi. Hæc terunt diligenter aceto acris
ubi leuia facta sunt, & habent spissitudi-
nem passi, miscetur eis mellis atticī. p^o.
libra. Deinde in patella æris cyprii su-
per carbones posita inferuescit, donec
mellis habeat nō nimīū liquidā spissitu-
dinem; atq; ita reponit pyxide æris Cy-
prii. Cum opus fuerit inuertitur palpe-
bra; deinde hoc medicamēto suffricā-
tur curiosē ad delachrymationem, id est
ubi desierit mordere medicamen. Rur-
sus inuertere oportet palpebram, atque
ita pollice impresso mēbranas innatan-
tes abducere, quæ faciliē subsequuntur.

Post hæc cinereo ex aqua inungendi
erunt

erūt crassiore . Hoc inunctum multorū
annorū callos, & aspritudines palpebra
rum desperatas à quibusdā oculariorū
paucis diebus tollit. XXXVIII.

Hygra ad suffusiones oculorū, quas
Græci *ὕψηλα* dicunt, medicamen-
tum liquidum. Fœniculi succi, *. p°. iiij.
opobalsami, *. pond. iiij. mellis atticī, *.
pond. iiij. olei ueteris, *. p°. iiij. hyænæ fel-
lis, *. pond. i. euforbij, *. p°. i. Hoc, oleo
diluitur, & ita commiscetur cæteris. A-
quato uti oportebit hoc medicamento:
est enim acerrimum, & undique humo-
res trahit. Quamobrem non sunt inun-
gendī qui capitis dolorem, aut grauita-
tem habēt. Item ante bīduū, aut trīduū
ut aquam bibant quos destinauerimus
eo ungere. Quanquam melius facient
etiā si perseveranter aquā potauerint:
uitio em̄ molestissimo facilius inter ini-
tia carebunt. Non præterit me, habe-
re te prudentes ocularios, quibus si no-
mina dixeris collyriorum in hoc libro
scriptorū, contendant forsan se quoque
habere eadem cōposita: sed si pondera,

aut effectus comparare uoles, longè di-
 uersos inuenies. Ego enim ipse eodem
 nomine multa cōposita, nō iisdem pon-
 deribus & rebus, interdū habeo; sed his
 maximè probatis utor. Nec utiq; adfir-
 mo non posse & alios eadē habere: nā &
 ipse ab alijs accepi, sed rarò. Scio quos-
 dam ocularios simpliciter tradētes com-
 positiones, meq; multum elaborasse, ut
 ueras & incorruptas acciperē, conscius
 sum mihi. Neq; illud rursus dico, nouas
 & non aliquibus notas in hoc libro con-
 gēsturum compositiones, uerum etiam
 quasdā diuulgatas, & (ut ita dicam) pu-
 blicatas. Eiusmodi enim, quia effica-
 ces sunt, etiā pluribus in notitiā ueniūt.

Ad aurium dolorem.

XXXIX.

AD auriculæ & tumorem, & dolo-
 rem sine hulcere prodest herbæ
 urceolaris, aut cucurbitæ ramentorum
 succus tepens per strigilem in foramen
 auris dolentis infusus. Itē bestiolæ mul-
 torum pedum (quæ tactæ conduplicāt
 se in orbem pilulæ rotundissimæ simi-
 lem, κατοιικιδίους ὄνους, aut πολύποδας Græ-
 ci hoc

ei hoc genus animalium uocant) oleo domestico complures inferuefactæ uase ferreo, benefaciunt. Prodest & gliris pinguis, & gallinæ adeps, & medulla bubula, liquefacta, tepensq; infusa. XL.

Sed præcipue picis flos, quod *πικρὸν λαίωμ* appellant, cum oleo communi mixtum, ita ut tertia pars sit olei. Nam & dolores sedat, & ferè non patitur suppurationem fieri. Et si facta fuerit, eadem res persanat. Ad summam, ego ipse diu uexatus ab aure, cum multis frustra usus essem medicamentis, ab hoc sum persanatus, & alios complures sanauit. Florem picis autem appello, quod excipitur dum ea coquitur, lana superposita eius uapori. Hoc etiam grauitatem odoris protinus tollit. XLI.

Item benefacit hoc medicamentum ad tumorem, & exulcerationem aurium: acetum acris sextarii duo, incoquuntur mala granata, quibus coriarii utuntur, quia semper ualida sunt, nec unquam maturescunt, *ῥοὰς ὀξείας* Græci dicunt, donec madida fiant. Tunc hæc adiunguntur &

admiscentur. Aluminis fissi uncia, acacia succi pon. quadrās. Reponitur medicamentum ampulla uitrea. Cum opus est, ad tumorem quidem calidū per strigilem infunditur: deinde foramen summum lana succida tegit. Ad hunc autem frigidum per eiusdem generis lanam & auriscalpium inijcitur. XLII.

Si caro exereuerit in foramine auris, compescitur sine dolore aut ferro hoc pastillo: Aluminis fissi pon. triens, æruginis pon. triens, misyos usti pon. triēs, rubricæ sinopidis pon. triens, commisp. sextans. Terunt priora ex aceto acris, donec quasi cum collyrium componit, leuia fiant. Vltimum commi adijcitur: & fiunt pastilli, qui ad omnia hulcera faciunt, aqua diluti, cum aut compescenda sint, aut cicatricem debeant ducere. Sed aquatioribus oportet uti, cum cicatrix est cludenda. Benefaciunt & ad exulceratas nares qualibet ex causa, & graui ter olentes.

Ad parotidas. XLIII.
Ad parotidas cōuenit noctuæ ce-
rebellum

rebellum butyro mixtum: discutit enim ferè eas sine dolore & molestia. Oportet autem aqua marina feruenti, nouis spongijs demissis, & per linteum intortum utrisq; expressis uaporare parotidam, atq; ita oblinere hoc medicamēto, superque tegere lana sulphurata totam maxillam.

XLIIII.

Item benè discutit parotidas iris Illyrica contusa, cocta ex passo more fariæ hordiaceæ, calda bis terue imposita.

XLV.

Discutit & hoc medicamentum parotidas, antequàm suppurauerūt: Spuma argenteæ pondo dua, cerussæ. p^o. libra, salis ammoniaci pon. libra, æris flor. pond. dodrans, aceti sextarius, olei ueteris sextarij duo & dimidium. Spumam & cerussam salem per se & cū aceto terere oportet mortario, deinde oleo admixto trañcere in cacabum amplum, ne extra fundat, & efferuescat: efferuescit em̃ ualde. Cum hæc super ignē posita habuerint emplastri temperaturam mollis, deponere oportebit cacabū, cū

feruere desierit: paulatim aspergere aris
florem, & mouere spatha medicamen-
tum, ne extrà fundatur: & rursus coque-
re, donec habeat emplastri spissitudinē
stricti.

Ad sanguinis eruptionem de naribus. XLVI.

ERumpit è naribus sanguis, qui cū
abundanter fluxit, nisi celerius sup-
primat, periculū adfert. Proderit ergo
aqua frigida uel posca subinde asperge-
re totam faciem, uel spongia refrigera-
re, acetū acre infundere in aurem, cuius
è regione sanguis fluit: aut in utraq; si
ex utraq; sanguis emanauerit: gypso to-
tam faciē cum fronte, & maximè nares
crasse oblinire prodest: & caput frigida
aqua copiose, superposito aliquo tegu-
mento, perfundere, uel cucurbitam oc-
cipitio adfigere. Inijcere autem intus
narē aut nares oportebit cochleæ uiuæ
carnem per se, aut cum thuris polline tri-
tam: uel herbam quæ, quia multa est, &
ubiq; nascitur, πολύγονον appellatur. Idē
trita facit & λυσίμαχιον herba eodem ge-
nere, Proderit & spongiæ particulam
præse

præfectam, aptè forcipe ad amplitudinem & patorem narium figuratam injicere paulò pressius ex aceto per se. Interdum aspergēda ei galla erit, uel chalcitis curiose trita, uel utraque in unum æquis ponderibus mixta, melius enim facit.

XLVII.

Item bene supprimit & hoc medicamentū: Mali corticis quo coriarij utuntur, p^o. quadrās, aluminis ægyptij, p^o. sextans, chalcitis, p^o. uncia. Hoc tritum per succidam lanam aspersum medicamentum injicere oportebit. Facit autem etiam ad omnem ex qualibet corporis parte, seu uulneris sanguinisq; eruptionem: quoniam interdū ita (ut diximus) minus curati, præfocati uidentur. Et maximè cum utraq; obturata spisse necessario sunt foramina narium, qua spirandi facultas eripitur, non alienum est scire qua ratione utrunq; præstari possit, ut neq; spiratio interpelletur, neq; remedium efficacissimum (quod per oppilationem nariū efficitur) excludat. Oportet ergo sumere pinnam anseris quam

maximam, uel calami scriptoriꝝ fistulā modicē plenā; deinde aptare ad longitūdinē nasi, atq; ita præcidere utraq; parte ut perforata sit, inuoluereq; ex fasciola tenui lintea quasi insita explere circuitū eius, donec cum uideatur pator narium cuneatiōe quadā recipere posse fistulā, atq; ita ut est circūuolutā mergere aceto acri & iniicere, interdum per se, uel asperso super acetū utro libuerit antè dictorū medicamētorum. Hoc autem remedio magis uti, cum per utraq; nares sanguis abundauit.

• *Ad hulcera in naribus.* XLVIII.

AD hulcera in naribus, plūbī steracus, qđ scoriam dicūt, ex uīno & murteo oleo uicibus adiecto terere oportet, donec spissum fiat, & ita per pinam nares obteguntur. XLIX.

Facit & hoc medicamentū bene: Pōpholygis, *. pond. iij. cerussæ, *. p°. xij. hyssopi, *. p°. trium. Vīno falerno & rosa uicibus adiecta teritur, donec mellis habeat temperaturam.

Ad

Ad polypos.

L.

AD grauem odorem nariū, ὀσμὴν
Græci hoc uitium uocant: ærugī
nis pond. quadrātem, aut squamæ æris
p^o. quadrantem, aut utranq; rerum pon
deris fescunciæ in mellis despumati. p^o.
libra decoquere oportebit, & eo uti li
quido per pinnam.

L I.

Ad polypos, mīsy uistū, chalcitis usta,
æris flos, uistum fori, æris squama tusa,
cribrata, si eo medicamēto per pinnam
sapius nares tactæ, eiusmodi uitia atte
nuata, cotidie emendātur: cum sint à ce
rebro paribus ponderibus, sicca bene
faciunt.

L II.

Sed quia plerunq; uexātur nares gra
uedine, quæ tumore earum efficitur: nō
alienum est te eius quoque remedia scī
re. Prodest igitur quies unius diei, & ab
omni re abstinētia. Perungendæ nares
erūt bitumine líquido, aut myrrha sta
cte, uel pice ligda. Postero die pastillus
iste nocte sup cibū dandus est, et si opus
fuerit, per triduū cōtinuum eodem tem
pore: recipit autem hæc: Apīj seminis

pon. trientem, anesi. p^o. quadrantem, al
terci seminis, quod *βοσκήμιον* dicit^r. p^o.
trientem, opij. pond. unciam. Fiunt pa
stilli ponderis uictoriati: alijs parte ter
tia detracta dantur cū aquæ cyathis tri
bus. Faciunt autem & ad oculorū epi
phoras, & stomachi nausēā, & deiectis
unculas, & ad omnem fluorem.

Ad dentium dolorem.

LIII.

AD dentium dolorem quamuis plu
rimū dicant forcipes remediū es
se, multa tamen citra hanc necessitatem
scio profuisse. Itaq; cum etiam exesus
est aliqua ex parte, tum nō suadeo pro
tinus tollendum, sed excidendū scalpro
medicinali qua cauatus est, quod sine ul
lo fit dolore: reliqua enim solida pars
eius, & speciem, & usum dentis præsta
bit. Sed cum dolor urgebit, uariē sedan
dus est, partim collutione quorundam,
partim cōmanducatione, nōnunquam
suffitione, aut impositione aliquorum.

Prodest colluere os frequenter radice
herbæ quinquefoliæ incoctæ in uino.

Item herba urceolari, & cupressi bac
cis aqua

cis aqua incoctis. Alterci quoq; radix, aut eiusdē semen linteolo spisso inligatum, & aqua sæpius inferuefactum, denti subinde adpositum. Item leuat æquē dolorem dentium portulaca, commanducata ab ea parte qua nō dolebūt, ut succus traiectus contineatur pusillo diutius, & solani succus tepens benefacit gargarizatus. LIIII.

Suffire autem oportet ore aperto alterci semine carbonibus asperso, subinde os colluere aqua calida, interdū em̄ quasi uermiculi quidam eijciuntur. Leuat dolorem & bitumen suffitū. LV.

Item commanducare proderit herbam rhododaphnen, & saliuam dolentibus trañcere, ac pusillo diutius continere, & ita hiantē pati saliuā decurrere.

Item mentastrum, uel radicem *κοτυλαιο*, quæ herba similia folia cymbalis habet, nasciturq; ferè in parietibus humidis. Pyrethri quoq; radix commanducata multorum leuauit dolorē.

Nec minus alumen fissum linteolo spisso circundatū, & ita dolenti pressum

diutius continere prodest. LVI.

Imponere ipsi uerò denti toti oporet hoc medicamētum quasi emplastrū: Peucedani succi, *. pon. iij. opopanacis *. p^o. i. thuris, *. pond. duum, uuæ passæ sine granis, *. p^o. i. Hæc per se contundi iubebis, deinde cætera seorsum trita cōmisceri in unum. Vbi fuerit dolor, auris, scalpium lana molli inuoluitur, deinde tingitur feruētissimo oleo, atq; ita denti primum, deinde proximis gingiuis superponitur bis tēue, donec hebetescat ex aliqua parte dolor: post hoc, medicamēto dens cooperitur. Si repetierit, aut permanserit nihilominus aliquis dolor, super medicamentum auriscalpiū cum lana ex oleo candenti eodem modo imponere sæpius oportebit, id est, donec dolor tollatur. LVII.

Sed si quando mouentur dentes ex perfrictione, confirmandi erunt plurima gargarizatione lactis asinini, aut uini Marsici ad tertias decocti, in quo lappathi radices coniici debebunt, ut unà decoquantur. Stringit etiam dentes alumen

alumen, quo infectores utuntur ex melle Attico, ita ut duæ partes sint mellis, tertia aluminis. Hæc misceri oportet mortario, deinde patella fictili feruefacere ut spissentur: atque ita recodere quolibet uase æreo, donec hoc medicamentum primo austerè, & nimis perstringere dentes, postea remissius uidebitur. LVIII.

Item proderit motis dentibus hoc medicamentum: Aceti acerrimi sextarius unus semis, cedriæ ueræ ne habeat picis aliquam mixturam hemina, aluminis fissi pond. triens. Teritur alumen cum aceto, miscetur deinde cedriæ, & unâ omnia uasæ æreo coquuntur, tedita pingui mota, donec in mellis spissitudinem temperati medicamentum redigatur. Hoc medicamento si quis ter in mense dentes fricuerit, dolorem eorum non experietur.

Dentifricij compositiones.

LIX.

DEntifricium quod splendidos facit dentes, & confirmat: Farinæ hordeaceæ sextarium cōspargere oportet aceto cū melle mixto, & subigere di-

utius : atq; ita in globulos diuidere sex.
Quibus dilatatis admisceri salis fossicij
semunciam, deinde furno coquere, do-
nec in carbonem redigantur, tunc tere-
re oportebit eos globulos, & admisce-
re spicæ nardī qđ satis uidebitur. LX.

Ad dolorem faciundū hoc Octauia
Augusti soror usa est: ad dentiū dolorē;
& confirmationē benefacit radicis edu-
lis cortex sole arefacta, & contusa, cri-
brata. Item uitrum candidum, quod si-
mile crystallo est, diligenter tritum, ad-
mixta spica. Vtuntur pleriq; etiam hu-
iusmodi dentifricio: herbā urceolarem
legunt cum iam in semine est quamplu-
rimā cum radice: deinde lotam uno die
siccant: postridie recentī muria dura ma-
cerant: tertio die expressam olla noua
componunt, subinde salis fossicij qua-
si tabulata interponunt: atq; ita perco-
quunt fornāce balneariorum, donec in
carbonē redigantur. Postea trita ad ter-
tias admiscēt spicæ nardī quod satis est.
Hoc cum eo quod candidos facit den-
tes, tum etiam cōfirmat, Augustā con-
stat usam

stat usam. Nā Messalina dei nostri Cæsaris hoc utitur, cornorum cerui ustorū in ollam nouam ad cinerem redactorū sextario uno, mastiches chiæ pondo uncia, salis ammoniaci pondo fescuncia.

Ad fluorem gingiuarum.

LXI.

Solent gingiua quorundam, fluore infestari, quas prægnautes uocant. Profunt eis lentisci folia arida contusa, & cribrata perforato cribro: facit & cinis eiusdem lētisci foliorū ex aqua eiusdem decocti. Compositum autem hoc medicamentū prodest, qđ & ad omnia hulcera quæ in ore sūt, utile est, ἀνθηρά à Græcis appellatur: recipit hæc: Aluminis fissi. *. p°. iiij. myrrhæ. *. p°. i. croci *. p°. ij. cypiri, id est, iunci radicis. *. p°. ij. gallæ. *. p°. i. rosæ lutei floris. *. pond. i. sandaracæ. *. p°. ij. His omnibus rebus tunsis cretis, arido medicamēto uti oportet per pinnam etiam ad πρὸς λιδας & ἐπὶ οὐλιδας, id est, ubi ex transuerso gingiua suppurauit: aut tonsillarum tumorem magnum, ut digito pressius fricentur, uel ubi super extremum mola

rem increuerit gingiua.

Ad cancrum in ore. LXII.

E St & molestum interdum cū can-
cer os corripit, quod inītijs negle-
ctum, breui spacio temporis mortis cau-
sa est. Oportet ergo, cum primū uisum
fuerit, antequā latius serpat, faucesq;
occupet, misy usto quamplurimo cum
melle uti sæpius: deinde colluere aqua
oleastri decocti subinde, aut corticis ma-
li granati. LXIII.

Medicamentum Andronis prodest
in omni parte corporis facto cancro, re-
cipit autem hæc: Mali granati corticis
*.p°.x. terræ mali, *.p°.ix. aloës, *.pon.
iij. myrrhæ, *.p°.ij. gallæ, *.p°.viij. alu-
minis fissi, *.p°.iij. æris floris, *.p°.duū.
Teruntur & cribrātur sicca curiose: de-
inde admiscetur passum creticum dum
habeat spissitudinem mellis: cum opus
est, uino austero sumēdum medicamen-
tum est, uitro reponitur, diluitur. Facit
hoc medicamentum ad carbunculos, &
ad ignem sacrum, & ad zonam, quam
Græci *εστρα* dicunt.

Ad

Ad faucium uuaeq; tumorem. LXIIII.

AD faucium uuaeq; tumorem stomatice hac ferè utuntur, quia nullam aspritudinem habet, & satis efficax est. Vuae amineæ acerbæ cum primum granum incipiet perlucere, succi sextarios quatuor, mellis attici sextariū commisceto in unum, atque in æreo uaso coquito, subinde mouens, donec mellis spissitudinem habeat. LXV.

Altera eiusdem utor stomatice, cum diutius uexatæ partes antedictæ sunt: Aluminis fissi. *. pond. duū, gallæ contrusæ. *. p^o. duum, omphacij aridi. *. pond. i. croci. *. p^o. i. passi cretici sextarius unus. Hoc decoquitur uaso fictili ad dimidias, & ita cætera diligenter trita admiscentur. Vtrunque autē medicamentum stagnæo reponendum est uaso.

Ad suppurationem faucium. LXVI.

VBi uerò suppuratio faucium suspecta est, diutius permanēte earū tumore, & interdū febriculis nō sine horrore intercurrentibus, oportebit gargarizare quidē aqua mulsa crebrius, fursu

ribus siligineis decocta, uel passo ad dimidias decocto benè caldo, uti ore & faucibus diutius contineat, uel ea aqua, in qua ficus arida pinguis erit decocta: perungere autē fauces hoc medicamentum, quàm tactus sustinere poterit pusillo pressius: Mellis optimi heminam, resinæ terebinthinæ. .x. p^o. duum, rosæ cyathos duos, resinā cum rosa in duplici uase, uti solēt unguētarij, liquefacere oportet: deinde admiscere ei mel, & coquere donec spissum fiat medicamentum. Hoc etiam, cū eruperit suppuratio, uti oportet; expurgat enim & explet idem.

Ad anginam.

LXVII.

AD anginam prodest & sanguinis detractio, cucurbitarū admissio, ceteraq; auxilia quibus medici efficacius utuntur. Medicamenta autem simplicia quidem hæc faciunt: laser cyrenaicum, si poterit inueniri: sin minus, syriacum aqua dilutum, crassius per pinnam faucibus adhibitū. Item euforbiū aqua dilutum.

LXVIII.

Compositorum autem medicamentorum

torum hæc sunt apta, Fellis taurini, salis, acetī, mellis, olei ueteris, æquas partes in unum miscere oportet, & cum opus fuerit, pinna perfricare fauces diutius.

LXIX.

Itē benefacit git frictū. *. p^o. duū, pyrethri. *. p^o. i. sagapeni uictoriati pōdus, melle miscēt hæc in unū trita.

LXX.

Facit bene & hoc medicamentum: Fellis taurini. *. p^o. ij. elaterij, qui est succus cucumeris syluatici. *. p^o. i. cachrysos animati. *. pond. i. tritum melle admixto reponitur. Cum opus est, dilutum aqua tepida sumetur, & fauces perungentur, cogunturq; inde q̄ plurimū de uorare. Soluit enim uentrem, & ita uehementissimè prodest. Item hoc medicamentum uehemētissimè prodest, multos enim à summo discrimine mortis liberauit. Benefacit hirundinum pullorū cineris pondo quadrās, hyssopī pondo sextans, nitri. p^o. uncia, piperis. p^o. semuncia, laferis pondo semuncia; his tritis cretis, mellis attici quod satis erit admiscetur. Et hoc aut cæteris medicamentis

sæpius fauces, & pressius fricare oportet. Multis & hoc profuit medicamentum, qd' est sine dubio efficacius & uehementius: costi, apij, anesi, schoeni, cassiæ rufæ, singulorū. *. p°. binum, git. *. pon. i. amomi uictoriati, p°. unius, Zee, quod est semen. *. p°. duū, aluminis fissi semuncia, gallæ mediæ magnitudinis, numero. v. croci. *. p°. duum, crocomatigomatis uictoriati pond. myrrhæ uictoriati, p°. Aristolochiæ creticæ. *. p°. iij. cinnami. *. pond. iij. hyrundinum syluestrium pullorum cineris. p°. uncia, nardi spicæ uictoriati pondo. Hæc omnia siue contusa, siue creta diligenter melle attico despumato comprehendantur. Cum autem opus fuerit, adiicietur quod satis erit eiusdem mellis. Hoc Augusta semper compositum habuit.

Ad uuentumorem & dolorem.

LXXI.

VVam supprimit diu iacentem sal ammoniacū, galla contusa, æquis ponderibus. Eadē ratione aluminis fissi. *. p°. iij. piperis albi. *. p°. i. quibus in unū mixtis cochleario ter tacta resilit.

Item

Itē herbæ cyclamini succo per cochleas
 riū ter die tacta, ac per triduum, nō solū
 resilit ac fit minima, sed etiam rarō uala
 de molestat. Item ad uuæ tumorem &
 tonsillarum siccum & efficax medica
 mentum: gallæ tusæ, p^o. uncia, æris flos
 pond semuncia, menarum sine ouis que
 sunt, salsarum capita decem. Hæc com
 buruntur, & ita cæteris admiscuntur ci
 neribus, & postea nihilominus in unū
 diutius teruntur. Oportet autem digito
 humido tangere medicamentum, & sic
 uuam ab imo rectam diutius supprime
 re sursum uersum. Item aliud efficacius
 ad uuam diu iacentē, cyperi siccata be
 ne, p^o. quadrās, myrrhæ. ʒ. S. croci sicca
 ti antè. ʒ. r. sandaracæ. x. pond. i. alumē
 nis fissi. ʒ. S. æris usti. ʒ. S. Hæc omnia
 intūdūtur, cribrant, ac digito melle mi
 xto medicamentum sumitur, & ita uua
 leuatur, ac tonsillæ pressius fricātur per
 triduum, aut si uoles, digito mūdo sine
 melle curabis.

*Ad tumorem & raucitatem arterie & uocis
 abscisionem.*

LXXII.

AD arteriam exasperatam simplia
cia quidē hęc faciūt : commis alex
andrina uel tragacanthū per se sub lin
gua retentum, compositio autē hęc est.

Vide infra
post compo
sit, cx.

Deest compositio.

LXXIII.

Ad tumorem arteriæ, papaueris syl
uatici iam maturi, uiridis tamen ad
huc, capita quāplurima uase fictili con
iiciuntur, aquaque superfunduntur, ut
supernatet duobus tribus ue digitis.
Hęc ubi triduo macerata fuerint, eodē
uase coquuntur donec demadescant, po
stea exprimuntur capita, omnisq; aquæ
percolatæ prius diligenter mensura ca
pitur, ad cuius modū mellis atticī quar
ta pars miscetur: deinde per duplex uas
coquitur, donec mellis habeat spissitudi
nem. Hoc medicamentū ad arteriæ tu
morē, & ad tussū facit. LXXIIII.

Altera arteriace ad fluorem & rauci
tatem arteriæ. Item ex ea ad tussim, &
abscissum sonum uocis. Tragacanthi. *
p^o. vi. commis alexandrinæ. *. pond. y.
myrrhæ. *. p^o. i. thuris. *. pond. ij. croci
*. p^o. i. piperis albi grana. xx. cariotarū

recens

recentium trium pulpas medias, detracta exteriori cute, interioribusque uenis, uel uuae passae nouae & incorruptae, purgatis interioribus granis. p^o. viij. comis & tragacanthum passo cretico uno die & una nocte macerari oportet, & postero die pila & pilo mundo contundere, & caetera trita mortario curiose admiscere. Inde dare fabae magnitudinem, globulum sub lingua tenere deuorantem quoad liquefactum fuerit. Hoc medicamentum, pipere detracto, & ad tumorem arteriae facit. Seruandum autem puxide buxea.

LXXV.

Arteriace qua melior non est, referatur autem ab Asclepiade nostro: facit ad omnia superius dicta efficacius, & quicquid in arteria uitij est: constat ex his: myrrhae optima pinguis. *. p^o. xxiiij. tragacanthi candidi. *. p^o. xxviij. glycyrrizae radice. *. p^o. xviij. resinae terebinthinae uerae. *. pond. xviij. tragacanthum sicut est contundere, & per cribrum tenuibus foraminibus ejicere oportet. Deinde myrrham tritam seorsum admiscere, & rura

sus utraq; in unum diu terere, atq; ita in pilam coniungere, & ibi cū concaluerint ictu pili terebinthinam paulatim miscere, donec omniū unitas fiat. Postea glycyrizam contusam & cribratam, mortarioq; nihilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim durissima hæc arteria ce, & hoc ipso præcedit cæteras: quia linguæ subiecta nō facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectum.

Ad suspirium.

LXXVI.

AD suspirium faciūt bene inter simplicia quidem acetum scillites, quod uocāt, cochleario ter quaterue sumptū in die. Prodest & ipsa scilla argilla circumdata, & furno cocta, purgatis exterioribus putaminibus, & quod tenerri- mum est eius, mellis duabus partibus atticī admixtum & tritura bene cochleario, semel in die bis'ue sumptum profuit multis. Pulmo uulpis in olla fictili ad cinerem redactus, & datus mensura cochleario

chleariorum triū, cum aquæ calidæ cyathis tribus. Item pulmo cerui eodem modo factus & datus. LXXVII.

Prodest & hoc medicamentum euidenter : Aluminis fissi, p^o. *.vi. opij, p^o. *.i. aqua exigua opium diluitur, miscetur alumini antè trito, fiunt globuli ciceris amplitudinis, dantur ieiuno ante cibum quaterni aut quini. Hoc medicamentum & ad sanguinis eruptionem ex interioribus partibus facit, & ad ueterē tussim, & ad phthísicos, uel alios qui purulenta excreāt. LXXVIII.

Hoc quoq; medicamentum ad suspitium satis commodè proficít. Sulphuris uiui p^o. *.i. nítri p^o. *.i. selibra, abrotanini qđ tribus digitis comprehēdi possit. Hæc contunduntur, & teruntur curiose. Cum opus est, dantur ex his cochlearia duo cum duobus cyathis aceti calidi ieiuno. LXXIX.

Aliud medicamentum ad suspitium efficax ualde. Facit autem & ad lumborum diutinū dolorē, & ad paralyfin, & hydropícos, lienosos. Bryoniæ, id est,

albæ uitis radicis. p^o. *. xij. iris Illyricæ
 p^o. *. xij. ammoniaci guttę p^o. *. xij. aspa
 ragi radicis .p^o. *. vi. scyllæ bulbi crudi
 ex interiore parte, p^o. *. xij. tragacanthi
 p^o. *. vi. mel miscetur cōtusis & tritis do
 nec ceræ mollis habeat temperaturam.
 Inde cum opus est, datur p^o. *. i. cum
 aqua mulsa cyathis tribus uel quatuor.

Ad strumas & omnem duritię in cor

poris quolibet loco.

LXXX.

AD strumas bene facit radix cucu
 meris syluatici cocta ex aqua mul
 sa & trita, atq; ita imposita. Item ebiscū
 eodem modo factum. Sed melius mari
 ni lepores oleo uetere necati faciunt, in
 plumbea puxide clusi, quā diebus qua
 draginta diligenter alligatā oportet ha
 bere. Postea ex ea, pinna oblinēda sunt
 strumæ, superq; eas pellis lanata nō ni
 mium tonsa, tegendi gratia, imponen
 da est. Præcipere autē oportet, ne quis
 hoc medicamento manus inquinet, aut
 inquinatas, prius quàm lauerit, ad os
 referat.

LXXXI.

Ad strumas & ad duritiās mammarū
 mirificē

mirificè facit antequàm suppurent, & post suppurationem nihilominus, hoc medicamentũ. Olei ueteris p^o. dua, spuma argenteæ pond. libra, gallæ syriacæ p^o. triens, mannae thuris p^o. uncia, galbani p^o. uncia. Cum oleo coquitur spuma donec cerati spissi habeat temperamentum, deinde admiscetur ei galla, & secundum hanc manna: cum emplastri habet spissitudinẽ, tollitur ab igne medicamentũ; & cum desinet feruere, paulatim galbanũ miscetur, per minutas partes linitur aluta cũ opus est. Hoc medicamentum soluitur tertio quartoue die si non suppurauerint strumæ: sed si apertæ fuerint, hyeme alternis, æstate cotidie.

LXXXII.

Malagma ad strumã & omnem durtiem mirificum. Idem ad mammarum muliebrium durtiam, & ad panículas, & ad tubera, & cætera quæ subito adnascuntur. Recipit hæc: Resinæ terebinthinæ pond. dua, ceræ pond. semissem, propolis, quam quidam ceram sacra uocant, p^o. fescunciam, galbani p^o. sextan.

tem, olei ueteris. p°. selibrā. Hæc oīa oleo ad ignē liquefacere oportet, & post ea miscere uisci de quercu pondo quadrantem, ammoniaci guttæ p°. quadrantem, ebisci radicis aridæ p°. quadrantē, cypiri radicis, quē nos gladiolū appellamus, p°. sextantem, ferulæ pond. trientem, aphronitri p°. quadrantem, asij lapidis florum p°. quadrantem, opopanax p°. sextantē. Hæc omnia ordine quo scripta sunt cribrata, in cacabum coniiciuntur, opopanax oleo diluit. Vbi temperatum est medicamentum, manibus subigitur, linitur cum opus est aluta.

Ad sanguinis eruptionem. LXXXIII.

AD sanguinis eruptionem, siue ex arterijs, siue à pulmone, uel pectore ea fuerit, benefacit symphyti radix, quam quidam Inulam rusticam uocant, quidam autem Alum gallicum dicunt, lota aqua frigida, & rasa cultello eburneo uel osseo. p°. sextantis, aut plus, id est, quantum poterit manducare & deuorare, neque enim amara est. Oportet autem eodem die acetum non gustare, quod

quod interdū per se magnificè solet prodesse: sed huius radicis effectū resoluit. Itē benefacit polygonij succus cyathorum duorum aut trium per triduum repetitus. Et plantaginis & solani eodem modo succus pdest: & cretæ samiæ p°. *i. sumptū ex aquæ frigidæ rigore detracto cyathis tribus, Prodest & herbæ quā *πλιόμ* uocāt, nos ut opinor, tinariā, fasciculus, quantū manu cōprehēdi potest, in tribus heminis aquæ decoctus, & ad tertias redactus, si quis inde cyathos tres dederit p triduū. LXXXIII.

Oportet autē extrā sentienti uulnus, eo loco spongiām ex aqua recenti imponere, uel ex aceto acri, ac frequenter mutare ne concalescēt nocēat. Et uetere artus constringere, quod pleriq; medicorum faciunt, ignorantes quod incitatur sanguinis eruptio musculorū compressionē. Quandoquidem omnis constrictio in utranq; partem exiget æquē subiectam materiam, sicut utrem si quis mediū laqueo cōstrinxerit, animaduertet in utranq; partē excludere subiectū

liquorē. Et si sup̄er foratus casu fuerit, incitatioē ei aculabitur quod in eo erit. Eadem ergo ratione cum sanguis erup-
tus est, qui constringunt uī magna ar-
tus exprimentes, sanguinem uenis sub-
iectū cogūt magis erumpi per uulnus.
Huīus rei argumentum est, si quis super
laqueum percusserit uenam in brachio,
quæ est animalis, animaduertet æquē
incitari sanguinē ex ea parte, quā ex
inferiore loco cū percussa est uena. Et
hoc per se quidem si non uiderant medi-
ci, meritō essent culpandī, quòd negli-
gētes in ancipiti casu hominum essent.
Cum præsertim Asclepiades etiam plu-
ribus usus sit argumentis in hac re: neq;
ei quisquam contradixit, quis enim ad-
uersus ueritatem hiscere potest? Proin-
de magis sunt custodiendi qui pollicen-
tur salutis custodiā uniuscuiusq; se factu-
ros. Tam inertes autem & negligentes
necessaria quidem ad conseruandam uī-
tam humanam, quæ per aliorum laborē
reperita sunt, studeāt scire. Meritō itaq;
manifestē quidā iugulātur genere quo-
dam in-

dā incitata eruptione sanguinis ab eius-
modi hominum imprudentia. Et, ô bo-
ne deus, hi sunt ipsi qui imputant suam
culpam medicamentis quasi nihil pro-
ficiantibus. Sed ad propositum reuer-
temur.

LXXXV.

Faciunt enim cōposita medicamen-
ta ad sanguinis eruptionē, quorū & hoc
est: Acaciæ succi, p^o. uncia, ^{ὑποκυσίδος}
qui est succus rosæ syluaticæ, quam ca-
ninam quidam uocant, pond. uncia, ba-
laustiū, quod est flos mali granatī, quo
coriarij utuntur, pond. uncia, opij p^o.
semuncia. Balaustium cōtunditur, sic-
catur, sicco mortario teritur. Cætera pri-
die macerata in aqua commiscentur, &
diligenter pastilli finguntur. Quidam
p^o. *.i. quidā uictoriati denarij dant ad
ætate cuiusq̃, ex aquæ frigidæ remissæ
cyathis tribus aut duobus. Atq̃ ille qui
dem pastillus benefacit ad dysenteri-
cos, id est, torminosos.

LXXXVI.

Alter pastillus ad sanguinis eruptio-
nem mirificè faciens. Tragacanthi, p^o. *.
ix. samia cretæ, p^o. *.viij. ceræ ponticæ,

p^o. *. ix. glycyrizæ succi (est autē radix
 dulcis) p^o. *. v. Symphyti succi p^o. *. xij.
 Cōmis pond. *. iij. ὑποκυσίδος succi p^o.
 *. vij. thuris pond. *. v. aluminis liquidi
 p^o. *. ij. opij. p^o. *. v. amyli. p^o. *. vi. myr
 rhæ p^o. *. v. croci p^o. *. vij. plātaginis suc
 ci. p^o. *. iij. passi meconij quod satis erit
 miscebitur, fiunt pastilli. Alij p^o. *. i. alij
 uictoriati dabunt ex aquæ tepentis cya
 this duobus & dimidio.

*Ad tussim ueterē, & destillationes, & suspiria & in
 flationes, cum dura habēt præcordia, & lienos
 sos, & phthificos.* LXXXVII.

C Atapotiū, id est, medicamentum
 quod non diluit, sed ita ut est de
 uorat, ad tussim quæ cū fluore est. Cro
 ci pōdo uncia, myrrhæ p^o. sextātis, opij
 pond. quadrantis. Contunditur crocū,
 percribratur, contusæ myrrhæ opiū ad
 miscetur aqua exigua dilutum. Postea
 adiicitur crocum, & cum in unum benē
 mixta sunt, finguntur pilulæ erui ma
 gnitudinis. Dantur in nocte ternæ uel
 quaternæ. LXXXVIII.

Catapotium alterū ad tussim aridam.

My rr

Myrrhæ, piperis, castorei, galbani, storacis, opij, singulorū idem ponderis. Castoreum & piper contunduntur & cribrantur. Deinde myrrhæ antè tritæ cæteris contusis æquè admiscētur. Vbi omnium unitas mortario facta est, melle despumato medicamētum comprehenditur: deinde formātur pilulæ uiciæ magnitudinis. Dantur ternæ uel quaternæ in noctem. LXXXIX.

Aliud catapotiū ad tussim ueterē, suspiriū, & phthisi tentatos, lienē, & iecur durū habētes. Idem inflationē tollit, & purgat mulierē, si qua ex partu substiterūt. Styracis p^o. *.vi. myrrhæ p^o. *.ij. & uictoriati, opopanacis p^o. *.ij. iris Illyricæ p^o. *.ij. galbani p^o. *.ij. resinæ terebinthinæ pon. *.v. alterci seminis. p^o. *.i. nitrū p^o. *.i. piperis albi p^o. *.i. opij p^o. *.i. Irim, altercū, piper cōtundere oportet & cribrare, nitrū mortario terere, & cætera pilo commiscere, & postea hæc eis adiungere, atq; facere catapotia magnitudinis fabæ. Inde terna uel quaterna in noctē dare ad inflationē in ipsa distentione cū aquæ calidæ cyathis tribus. XC.

Pastillus ad tussim, destillationem pectoris, pulmones, ad epiphoras oculorum, uesicæ dolorē qui cum fluore consistit, ubi sæpius & non sine cruciatu urinam faciūt. Item ad eos qui sanguinem reijciunt, aut per urinā reddunt. Ad deiectionem, tormina, grauedinem, choleram, stomachi crebram nauseam cum uomitu, sine febre. Et quicquid reprimere & siccare oportet, optimè compescit. Præterea facit ad omnis partis corporis dolorem, præterea capitis: Quin etiam si quando aliquis hoc fuerit inunctus. Alij uitio non erit dandū hoc medicamentum. Cum aut ad omnia quæ suprà dixi, manifestè prosit, tum præcipuè ad initia phtisim habētes benefacit. Multos enim eripuit ex magno periculo interdū bis tēue datus hic pastillus: recipit hæc: Myrrhæ troglodytis pon. *.vi. croci. p^o. *.v. opij. p^o. *.iij. thuris pond. *.v. alterci albi seminis. p^o. *.iij. apollinaris herbæ radicis corticis pon. *.iij. Contunditur hic cortex per se, & cribratur tenui cribro: deinde crocum, postea

postea altercum, myrrha, thus, quibus
miscetur opium pridie aqua maceratū:
subinde aquæ exiguū adijcitur, donec
fingi pastilli possint pond. *. uictoriati.
Alij tertia huius ponderis detracta, dan-
tur in noctem ex aquæ cyathis tribus.
Somnum faciunt, dolorem sedant, ut su-
perius dixi. Oportet autem ex eo etiam
catapotia facere: quidam enim facilius
eā quā potionem sumunt, uerum non
multum interest.

XCI.

Ad eadem remissior quidē pastillus,
sed non contemnendus, croci, myrrhæ,
alterci, opi, pondera paria contusa mia-
scentur, despumatò attico melle fiunt
pastilli eiusdē ponderis. Dantur ad æta-
tem eius tres in noctem: licet & hinc ca-
tapotia facere propter eandem causam,
sed tunc aqua, non mel adijcit.

XCII.

Pastillus ad tussim & sanguinem rei-
cientes, & stomachum solutum habena-
tes facit, & ad deiectionē, & uesicæ do-
lorem. Aprij semen pon. *. vi. alterci se-
minis p°. *. xij. anethi. p°. *. xij. opi p°.
*. vi. croci p°. *. iij. rosæ foliorū arefacto

f

rum in umbra p^o. *. xij. myrrhæ pon. *.
 xij. Semina, & crocū, & folia rosæ con-
 tunduntur, cribrantur, myrrha teritur
 opium aqua maceratur: omnia in unum
 miscentur aqua adiecta: fiunt pastilli ui-
 ctoriati pon. alijs tertia parte detracta.
 Dantur ad stomachum imbecillem ha-
 bentes, & sanguinē reijciētes, ex aqua
 frigida cyathis duobus, cæteris ex calia
 da totidem cyathis. XCIII.

Pastillus ex odoribus benefacit ad
 omnem dolorem. Propriè autē ad tuss-
 sim. Item pectoris destillationem, & o-
 culorum epiphoras. Facit & ad suspi-
 rium, & ad lateris dolorem, & ad phthi-
 sicos: & uesica, renibusq; laborātes, uel
 sanguinem ad urinam reddentes cū do-
 lore. Casiæ, cinnamī, croci, singulorū
 p^o. *. iij. alterci seminis, apollinaris her-
 bæ radicis, singulorum pond. *. iij. pi-
 peris p^o. *. ij. opij p^o. *. iij. thuris pon. *.
 iij. nardi spicæ p^o. *. ij. Vīno falerno cō-
 tusa & trita utraque ut debent, consper-
 guntur: fiunt pastilli uictoriati pond.
 Et alijs parte tertia detracta. Dantur in
 noctē

noctē, prout uires sunt, cū aquæ calidæ
cyathis duobus aut tribus. XCIIII.

Medicamentum, quod per cochlearium deuoratur, benefacit ad tussim aridam, & eos qui difficulter glutinosa excreant, & præfocari uidentur interdū. Sed præcipuè ijs qui lateris dolorē cum febre sentiūt, quos Græci πλευρητικούς uocant. Liberat enim eos ab omni periculo. Hoc medicamentum Apulei Celsi fuit, præceptoris Valentis & nostri, & nunquam ulli se uiuo compositionem eius dedit, quod magnam opinionem ex ea traxerat. Est autem hæc quæ componitur tribus rebus his: Piperis nigri electi & pōderosi granis duobus, myrrhæ troglodytidos pond. *.ij. mellis atticī despumati libra. Piper contunditur diligenter & cribratur, myrrha teritur mortario curiose: & postea utraque in unum miscentur: deinde mellis adiicitur. Dantur cochlearia quina uel sena. Pleuriticiis etiam plura sæpius, & cū interuallo dare oportet: & maximè cum tussunt, aut præfocari uidentur, &

difficulter spirant, siue noctu siue inter-
diu. Protinus enim excreant ea quæ ob-
stant transitui spiritus, & tussire desi-
nunt.

XCV.

Alterum medicamentum ad tussim ari-
dam. Nasturcij animati seminis pond.
uncia, alterci seminis p^o. uncia, opij p^o.
uncia, myrrhæ pond. uncia, croci p^o. se-
muncia, sulphuris uiui p^o. semuncia, pi-
peris albi p^o. quadrans, Melle colligia-
tur medicamentum. Datur fabæ ægy-
ptiæ magnitudine ex cyathis aquæ tri-
bus in noctem. Facit autem hoc medi-
camentum ad lateris dolorem, & ad sto-
machî inflationem, grauedinem, cœliac-
cos qui subito uniuersa deiciunt. Pro-
dest & dolentibus superpositum & cir-
cundatum denti; & si exesus est, in cauer-
nam eius infertur. Tollit præterea hor-
rores febrem præcedentes: tum, cū hæc
circuitum certum habet, datum ante horam,
diutius corpore pfricato ex oleo calido.
Prodest & illis qui sine horrore circuiti-
bus febrium uexant. Quamobrē ἀλεξιπύρε-
τος hæc cōpositio dicitur.

XCVI.

Aliud

Aliud ad tussim aridam, & glutinosa excreantes. Purgat etiā interaneas uomicas, suppurationes, lini seminis, urticae seminis, nasturcij seminis, iris Illyricae radicis, æqua pondera misceri oportet, & cum melle despumato, quantum satis sit: & frequenter oportet cochleario dare.

Antidotos hyera Pacchij Antiochi ad uniuersa corporis uitia, maxime lateris, & ad podagram. XC VII.

AD lateris dolorem, siue cum febre siue sine febre fuerit, cōpositio mirifica, nō ignorata quidem ab antiquioribus propter effectus, sed præcipuè à Pacchio Antiocho auditore Philenidis Catinensis usu illustrata. Fecit em̃ magnos quæstus ex ea propter crebros successus in uitijis difficillimis. Sed ne hic quidem ulli, se uiuo, compositionē dedit. Post mortem autē eius Tiberio Cæsari per libellum scriptum ad eum, & bibliothecis publicis posita uenit in manus nostras, quā antea nullo modo extrahere potuimus. Quāuis omnia fecerim

mus, ut sciremus quæ esset. Ipse enim clusus componebat, nec ulli suorum committebat; plura enim quam recipit ipse met contundi iubebat pigmenta, fallendi suos causa. Hæc postea nos sciuius, quæ, ut sanè & libello ipse fatetur, non à se inuenta, sed usu exactiore comprobata ad quæ uitia, & cū quibus, & quæ admodum data proficeret. Etenim non ignota, ponderibus tamen antiquis aut adiecit, aut detraxit. Et res quæ in hac compositione sunt, non utique conueniunt ad antiquas. Iterdum enim earum quædā plures etiam numero accipiunt, atque ideo non idem præstant, cum integram hæc mirifica temperatura composita mirificos effectus habeat. XCVIII.

Facit hoc uerò medicamentum non solum ad lateris dolorem, sed etiam ad plura uitia efficaciter. Quamobrè semper habeo id compositum. Percurram autem quambreuissimè, ad quæ uitia, & qualiter datum proficit, ut etiam in libello eius scriptum est, & ego magna ex parte iam expertus sum. XCIX.

Sanat

Sanat ergo morbo comitiali correptos, quos ἐπιληπτικούς Græci vocant, furiosos, quos μαινόμενους dicunt. Item sanat quibus subitis tenebris obscurantur oculi cum uertigine, σκοτοματικούς hos Græci appellat. Nec minus diutino correptos capitis dolore, quem κεφαλαργία appellat. Prodest data p^o. *.ij. ex aquæ mulsæ cyathis quatuor, cum remissi fuerint. Et si frequenter quidem corripiuntur, post binas ternasue accessiones danda erit antidotos Hyera : hoc nomen enim tribuit ei duas propter causas, ut existimo. Vnam, ne eius nomen uerū dicendo, ostenderet quæ esset. Dicitur enim à quibusdā πικρά, quia amara est : à quibusdam δ' ἀκολοκυνθίδι. Alteram quò magis sub tãta specie nominis commendaret medicamentū. Sed si ex longo interuallo accessionibus uexabuntur, in remissione dolorum sapius dandum erit medicamentum. Ita enim aut ex toto remedio est, aut certè minuitur quotidie impetus uitiorum & sedatur, interuallaque maiora accipit, &

hoc ipso opportuniore fiunt ad uera
tripotionem, qua maximè hæc uitia tol
luntur. Dare autem his oportet secun
dum purgationem (bis anim aut ter spu
mosa & glutinosa deijciunt) ptisanæ cre
morem, olera lenia ex urtica & lapatho
malua facta, torpedine interdū admixta
& cū exiguo pane, aquamq; potui. C.

Facit bene hæc compositio ad suspia
rium, & ad uocis abscissionem, & subia
tas præfocationes ex qualibet causa or
tas, & ad eos qui sapius existimatur ab
incubone deludī. Vsq; eò tamen uexan
tur, ut interdum uitæ periculum adeant
(est enim uisum non contemnendum)
utiq; in processa ætate. Quibus dandū
erit medicamentum, proximo die eius
noctis qua correpti sunt, cum interual
lum à somno fecerint, & quod satis est
ambulauerint, ex aquæ hyssopum aut
marrubium incoctum habentis cyathis
quatuor uel quinque, .x. p^o. i. uel unius
& uictoriati, prout res postulauerit.
Deinde post horas treis quatuor ue cre
mor ptisanæ detur.

C.I.

Facit

Facit & hoc medicamētum ad eos, quorum musculi maxillares cum maximo dolore tensi sunt, aded ut aperire os nullo modo possint, τετανον hoc uitium Græci dicunt. Item facit ad deprauatam faciem in utramlibet partē, κυνικόν ωσμον hoc idem appellāt, genus morbi. Præcipuè uerò ad pectoris, & lateris dolores prodest ex qualibet causa factos, siue latente & occulta, siue manifesta: ut ex ictu, casu, conatu aliquo supra uires, uel ponderis supra modum portatione, uel contusione, quæ frequēter gladiatoribus accidere solet in luctationibus, & eorum maximè sauciatis. Nec minus arbore alta delapsis, uel scalis deuolutis, excussis à rheda uel curriculo, atq; ita tractis. Sed his, id est manifesta causa uexatis, cum acetī cyathis tribus quatuorue danda erit antidotos. Illis uerò qui ex occulta causa laborant, ex aqua mulsa proderit. Præterea neruorū tensionibus mirificè conuenit. Quamobrē facit & ad tremulos, & syderatione tentatos utralibet: una enim ex con-

tractione, altera cū remissione neruorū
 conspicitur, *παράλυσιν* hoc utrumque vi-
 tium Græci appellant. Ad quod etiam
 cum correpti sunt prodest ex aquæ mul-
 sæ cyathis tribus quatuorue datum me-
 dicamentum, * p^o. i, uel unius & uictoria-
 ti, admixto pondere uictoriati casto-
 rei. Prodest & ad articulare morbum,
 quem *ἀρθρίτην* uocant, ad spinam, & to-
 tius lumborumq; dolorē: ex aqua mul-
 sa datur ad uires cuiusque. Item ad po-
 dagram benefacit: nam & in præsentia
 detractiōe ipsa leuat, & in futurum o-
 mnī molestia liberat. Dimidio enim ce-
 lerius sanantur qui acceperunt medica-
 mentum, quàm prius solebant. CII.

Quid dicam? duritias in māmīs mu-
 lierum cum dolore consistenteis, quas
 nullum medicamentum leuat, quemad-
 modum ex toto imperpetuum interdū
 sanat, quas plerique medicorum insa-
 nabiles adfirmant, *καρκινώματα*, & *κακοή-
 θες* appellant. Poteram nominare ho-
 nestas fœminas, quas aut ille, aut ego
 hoc medicamento sanauimus: nisi cre-
 derem.

derem fidem te habere nobis alioquin,
ipse tibi iam dixissem.

Illud uerò supra omnium opinionem
est, quod ad stomachicos euidenter con-
uenit, cum sit uirosissimum medicamen-
tum aduersus stomachum, ne ad lenia
quidem, & simplicia medicamenta aptè
dispositum. Sed uidelicet in eiusmodi re-
bus potentior usus ratione est: expertus
enim unusquisque intellegit stomacho
quoque hoc medicamentum eximie pro-
desse.

Remediat enim eos quibus frequen-
ter inacescit cibus, & eos qui assidue in-
flationibus urgentur, uel dolore eius ue-
xantur, aut assidue nauseant, aut saliuæ
abundant, uel inedia consumuntur, sto-
machumque ita solutum habent, ut ex
eo uarios liquores subinde respuant con-
sentiente capite, ut nullum genus ci-
bi continere possint. Item ad bilem as-
tram generantes, quos *μελαγχολικους*
appellant, benefacit. Oportet autem non
continentibus cibos secundum uomitum
peritus oleo perunctis, & diutius presse

fricatis dare medicamentum. *. p^o. i. ex aquæ cyathis tribus : deinde artus constringere, & interdum olfactarijs reficere, & commanducatione oliuarũ con-
tufarum, earumq; rerum quæ stomachũ constringere solent, interim subrectos recubantes, deinde cum deiecerint, solutis uinculis rursus perungere, & fricare totum corpus. Atq; ita uarietate apta ciborum stomachum proritare, ut hali-
ca ex mulso, malorum cydoniorum succo facto, uel ex granatorum per se ma-
lorum, uel si quos magis delectat ex frigida posca: secũdũ quæ, apala oua pro-
derunt, & intubĩ cocti uel crudi ex ace-
to. Item lactucæ caules cum folijs ex posca decocti, conchula marina, purpu-
ræ murices, pelorides, uolua pomorũ,
forba mala orbiculata, scādina, pira, cru-
stumina segnina olla reposita, item uuæ ex olla. Hæc em̃ & huiusmodi quæ sunt cõfirmāt stomachũ, quibus & insequen-
tibus diebus uti oportebit paulatim ad cõsuetudinẽ progredientẽ, donec pro-
pè om̃i molestia ægri liberentur.

C V.
Est

Est stomachi uitiū quod cum siccitate & ardore eius, & inrequiebili (ut ita dicam) & inextinguibili siti consistit: & τὸν Græci uocant, ab eo quod exicat omnem stomachi humorē. Scimus quosdam urnas aquæ bibisse, neque ideo sitim aliqua ex parte in præsentia compescuisse. Ad hoc *, p^o. i. uel uictoria^{ti} datum ex aquæ cyathis duobus frigida, ita prodest ut faciliè abstinere ab aqua proximis diebus possint. Lienosis uerò ex posca, & iocinerosis duritiam habentibus diutinā ex aqua mulsa satis conuenit. Nec minus hydropicis, quibus datur eadē ratione. Sed his per complures dies oportebit ptisanæ cremorē sine ullo liquore dari, C V I.

Prodest cōpositio hæc & colo inflato, & cæteris intestinis. Futuras quoque uel iam factas uomicas iisdem partibus aut discutit, aut celerius aperit. Itē menstrua mouet mulieribus, quæ difficulter purgantur. Dandum autem erit his ex aqua medicamentum. In aqua decoquitur herba que artemisia dicitur, aut quam

δι' ἡμῶν appellāt. Etiam ad papulas & sacrum ignem, uel quam zonam uocāt, benefacit ex aqua mulsa, detracto prius sanguine, si res postulauerit: ut & in aliis omnibus superius dictis faciendū est. Omnia em̄ auxilia adhibēda sunt, quæ ex usu prodesse eis comperta habemus: quia facilius adiuta antidotos adiuuabit, & effectus exhibebit. Recipit aut̄ hæc: Stœcados, marrubij, *χαμαίδρυς*, quæ herba similia quercus folia habet, agari- ci, cucurbitulæ syluestris, quam *κολοκυνθίδα* appellāt, singulorum, *. p^o. x. opo- panacis, sagapeni, petroselinī, terræ ma- li, piperis albi, singulorum, *. p^o. v. cin- namī, nardī spicæ, myrrhæ folij, croci, singulorum, *. p^o. iij. in unū omnia pon- derata contundunt & cribrantur. Præ- terea opopanaces & sagapenum: hæc enim mortario teruntur, adiecto melle tenui, id est, quamliquidissimo: deinde cæteris miscentur, quæ & ipsa recipere debent tantum mellis, quantū satis erit ad comprehendenda, & cōtinenda ea. Reponitur medicamētum uaso uitreo.

Datur

Datur, ut suprà diximus, ad cuiusque uires, & est prorsus sacrum, ut autor huius nominis appellat. C V I I.

Si quando aut efficaciore eo uoluerimus uti propter difficultatē naturalem uitiorū, aut diuturnitatem, ut in furiosis aut comitiali morbo correptis, uel lumborū perpetuū dolorem habētibus, podagra correptis uastius, cucurbitæ syluestris adiicimus ad superius dicta pondera. *. p^o. xx. opopanacis atq; sagapeni, singulorum. *. p^o triū. Quamobrem utraq; parata debent esse medicamenta: ut cum opus fuerit, usus alterutrius in promptu sit. Illud utiq; credas interim uelim mihi, dum in alijs expertus persuadaē, hoc medicamentū non solū nō nocere stomacho, uerūetiam reficere & cōfirmare eum supra omnē opinionē.

Ad stomachi dolorem & inflationem, & cetera uitia interius. C V I I I.

Medicamentum quod propriē aduersus solutionem stomachi facit & fluorem eiusdem: maximē uerò cum nihil cibi retinere possunt, sed quicquid

datū est reijciunt. Mastiches chia candi
dæ pōdo libra, tragacāthi albi pondo li-
bra, apollīnaris herbæ radicis uncia, Cō-
tunditur tragacanthum cum radice: po-
stea mastiche adijcitur. Reponitur in ui-
treo uaso. Dantur cum opus est cochlea-
ria tria secundū uomitum per se factū
ex aquæ frigida cyathis tribus.

Ad stomachi dolorem & inflationem. C I X.

P Almarum. *. p^o. xl. anethi. *. pond.
iij. croci. *. p^o. duū, git. *. p^o. duū,
& asari. *. p^o. duum, murti nigræ bacca-
rum. *. pond. iij. iuniperi grana nume-
ro uiginti. Cōtundunt seorsum omnia,
& in unum miscentur: deinde fiunt pa-
stilli. *. p^o. i. alijs uictoriati. Dantur ie-
iuno ex aquæ cyathis quatuor, aut ex
cretico musto, qd' est passi genus. C X.

Medicamentum siccum ad stomachi
inflationem, & dolorem, & inediam.
Mouet urinam: ideoq; facit & ad hy-
dropicos, & iecur durum habentis, au-
ruginem, quam quidā regium, quidam
arquatum morbum uocant. Refertur in
Musam Antonium. Recipit autē hæc:
Aloës

Aloës p^o. assis trientem, croci, cinnamī,
nardi syriacæ spicæ, asari, xylobalsamī,
mastiches chiæ, singulorū. *. p^o. vi. Tun-
ditur, & uitro reponit̃. Dantur cochlea-
ria duo uel tria ex aquæ cyathis tribus.

*Compositio. LXXII. quæ superius defuerat, hic
ex Galeno. vij. de cōpositione medicamentorū κα-
τὰ τὸ πρῶτον citante Scribonium Largum
sic restituta est à Io. Ruellio.*

Altera Scribonij Largi, quæ qd̃
sub lingua teneatur, ὑπεργλωσσίῃ ap-
pellata, facit ad abscissionē uocis: Radi-
cis dulcis. *. p^o. viij. myrrhæ. *. p^o. xxiij.
terebinthinæ. *. p^o. xxxij. tragacanthæ
*. p^o. xxxviij. singula sicca seorsum tun-
dito et cernito, resinaq; in pilam cōiecta
excipito. Vbi in unitatem coierunt, in
formulas digerito, quæ ægyptiæ fabæ
magnitudinem æquēt, & in umbra sic-
cato: cumq; usus poscet, unam aut alte-
ram sub linguā tenendā dato, ut illique-
scens deuoretur. Medicamentū opor-
tet cum res exiget, celeriter effingere,
siquidem confestim exiccarī solet: quia
propter in promptu terere cōuenit me-

dicamenta cum in pastillos coges.

Hæc Galenus ex Scribonij Largi sententia.

*Ad cœliacos, & torminosos, & uentris
diutinum dolorem.* CXI.

AD cœliacos, id est, qui subitò & multa deſciunt. Item & ad aluum citatam, & interdū lenia tormina: Sorborum aridorum cōtuſorum sextarius unus, rhus ſyriaci coquuntur sextarii duo, malagranata recentia decē, item mala cydonia decem. Hæc utraq; conijciuntur in ſapam factam ex muſti adhuc in dolio feruentis sextarijs triginta ſex, ad duodecim sextarios decoctā, donec malorum coria percoquantur, ut ſint madida. Deinde terunt hæc fictili mortario, ut grana comminuantur, quibus deinde cydonia admisceant, & æquē teruntur. Poſtea rursus & ſorba arida admisceantur cribrata curioſe ſapæ quæ reſidua eſt, & omnibus in unum bene coactis. Reponitur medicamentū in uitreo uaſe. Dantur autē inde ieiunis in diem ligulæ binæ uel ternæ per ſe. Sin autē grauior morbus inſedit, hic datur. CXII.

Pastillus

Pastillus ad coeliacos & torminosos
 optimè faciens: Balaustij hypocystidos
 pridie aqua macerati, p^o. sextans, alter
 ci seminis, cretæ samiae, singulorū p^o. un
 cia, uino myrtite adiecto, fiunt pastilli
 *. p^o. unius, aut uictoriati. Dantur ieiun
 o sine febre ex uino myrtite, aut signi
 no, cyatho uno cum duobus aquæ mi
 xto: febricitantibus, ex aquæ cyathis tri
 bus. Hoc etiam, incitata libidine ipsius
 morbi, pastillus, siue plures diluti aqua
 calida, uino, oleo, per clysterem immi
 titur, statim somnus cōsequitur quoties
 desurrexerint torminosi, qui grauiter
 afflicti sunt, & utiq; prodest.

Alius pastillus ad torminosos efficacior. C X I I I.

A Caciae. *. p^o. quatuor, croci. *. p^o.
 duum, gallæ. *. p^o. viij. hypocysti
 dis. *. p^o. iij. lycij. *. p^o. iij. myrrhæ. *.
 pond. iij. rus quo coqui utuntur, nar
 di spicæ syriacæ, aloës, singulorum. *.
 pond. duum, anesi, commis, singulo
 rum. *. pond. quatuor, piperis nigri.
 *. p^o. duum. Tunduntur, teruntur, cri
 brant ex succo cauliculorū rubi, uel ex

maipe

uino signino collyrii tritura. Cum fuerint hæc lenia, aut unguis nulla pateat asperitudo, finguntur pastilli. *.p°. i. alijs p°. uictoriati. Datur unus ieiunio ante meridiem, alter in noctem ex aqua, si febres erunt: ex uino signino, si sincerè corpus erit. Hoc efficax est medicamentum, & si cætera quæ debent, sentiente eius ualitudine, rectè adhibita fuerint, utique sanant.

CXIII.

Pastillus item qui clysterio immittitur torminosi per anum, cum sordida, & sanguinolenta eijciunt, id est, cū intestina eorū cancer occupauit, quo quasi cauterio tunc tantūmodo uti oportet, alioqui nocet. Ideoque à quibusdā ignorantibus eius usus accusatur, quasi nocuus. Recipit aut hæc: Chartæ combustæ cineris. *.p°. xxx. calcis uiuæ. *. pondo xxiiij. ^{ἀσθενικῶς}, quod est auripigmentum, *.p°. xij. sandaracæ. *.p°. sex. Hæc trita uino consperguntur, in quo rosa & lentesc prius incoquuntur, ut possint fieri pastilli. *.p°. duū aut unius. Cum opus est, teritur unus pastillus, & immittitur per aquam

aquam decoctam, rosam & lentem habentem, si febricitabūt: sin minus, ex uino eadem incocta habēte. Facit & murti fasciculus cū oleastrī uel oliuæ ramulis, utrorunq; modo prout res exegerit, incoctus.

CXV.

Potio autē, id est pastillus cū immisus fuerit, medicamentū sic conuenit in noctem: Myrrhæ. *. p^o. duum, lycij. *. p^o. iij. thuris. *. p^o. i. opij. *. p^o. duū, aloës. *. p^o. duum, acaciæ. *. p^o. iij. murti, baccarum nigrarū. *. p^o. xvi. ouorum ex aceto coctorū uitelli duo. Hæc trita uino Surrentino consperguntur, & fiunt pastilli. *. p^o. i. Dantur febricitantibus ex aquæ cyathis quatuor, permixti Surrentini uini cyathis duobus.

CXVI.

Ad εἰλεον, quod uitiū est inflatio tenuium intestinorū, facit bene galbani p^o uictoriati, deuoratur in pilulas diuisum duas uel tres. Mouet & ructum, & interdum deijcit uentum deorsum, atque ita prodest.

CXVII.

Ad idem uitiū mirificè prodest hoc medicamentū, Facit autē ad lateris do-

lorem, & ad omnem partem corporis, dauci seminis, panacis radicis, castorei, paria pondera, rutæ syluaticæ dimidiū, tritis uel cōtulis mel decoctum adijcere oportet. Inde dare. .x. p^o. i. aut uictoriati ex aquæ caldæ cyathis tribus. C X V I I

Facit & ad huiusmodi per anum immissum foenum græcū: id aqua bene coquere oportet, atq; inde sumere heminam. Itē in oleo domestico incoquere rutam quamplurimā, & hinc caldam heminā adijcere priorī aquæ, quibus utrisque admiscere aphronitri triti sescūciā, et ita per clysteria caldā immittēre. Hoc ego iam stercus per os deſcipientē (quod si non mortiferū est) sanauī unguentarij cuiusdam seruū. Est autē uitium εἶλεος periculosissimū, & ideo inter præcipua refertur. Quamobrem non utiq; cū magna fiducia ad hoc genus uitij aggredi debemus.

Ad coli dolorem etiam uetustum compositionū genera experta, quæ in totū persanāt. CXIX.

AD coli inflationē benefacit cumiani syluatici semen per se, ut est datum

tum, quantū cochlearia tria in aquæ cal-
dæ cyathis quatuor. CXX.

Nam Cassij medici colice bona mul-
tis nota propter effectus, uera hæc est,
ut ab eius seruo Atimeto accepī, legato
Tiberij Cæsaris: quia is eam solitus erat
ei componere. Apij seminis p^o. selibrā,
anisi p^o. quadrantem, castorei p^o. sextan-
tem, myrrhæ p^o. quadrātem, spicæ nardī
Indicæ p^o. sextantē, opij p^o. quadrantē,
croci p^o. fescunciam, piperis longi p^o.
sextantē, piperis nigri p^o. sextantem se-
munciam, petroselini p^o. sextantē, schœ-
ni p^o. fescunciam. Hæc omnia contusa
cribrata, melle Attico decocta miscen-
tūr. Datur ex hoc medicamēto quantū
nux abellana media patet, ex aquæ cya-
this tribus calidæ. In ipsīs doloribus sta-
tim prodest. Item medicamentū ceratū
ex malabathro facit ex duabus partibus
& ceræ unius mixtum, & extrā imposi-
tum in uentrem totum. Præterea bene-
facit & ad stomachi inflationē, & ad su-
spirium, & ad iocineris dolorē, tussim,
destillationem. CXXI.

Colice mirifica Iulij Bassi, citò leuat;
 deinde tollit inflationes coli & omnis
 partis corporis. Facit et ad stomachi im-
 becillitates, & ad intestinorum aliqui
 dolorē, quē Græci σφοδρὸν appellāt, ex
 aqua hyssopū, aut rutā decoctam habē-
 te. Itē benefacit ad sanguinē, & ex inte-
 riore parte. Nō em̄ patitur latē fieri nec
 intus uulnus cōuerti; sed citò supprimit
 sanguinē, et uulnus cogit coire. Dandū
 autem his medicamentum ex aqua, πο-
 λιδὸν coctum habēte, aut rutā. Prodest
 & torminosi, & cœliaci, datū ex aqua
 centunculū herbam incoctam habente,
 quam Græci γναφαλίδας dicunt, uel sor-
 ba, uel siliquam syriacam. Lienosis da-
 tur ex mulso uel passo aquæ mixtis. Eo-
 dem modo dandum est & eis qui san-
 guinem per urinam uel aluum reddunt.
 Nec minus etiam mulieribus quæ fluo-
 re sanguinolento infestantur, quod ἔσθρ
 ἐρυθρὸν Græci dicunt, uel ex partu ab-
 ortu'ue, quæ residuos uulvæ dolores ha-
 bēt: et in totum quibus supprimēdus est
 fluor, aut ex aliqua parte corporis infla-
 tio tol-

tio tollenda. Recipit autem hæc : Spi-
cæ nardi, costi, piperis albi, piperis ni-
gri, piperis longi, myrrhæ, opij, apola-
linaris radicis, & cinnami, asari, acori,
thuris, brassicæ seminis, castorei, singu-
lorum, *. p^o. xij. opopanacis, *. p^o. x.
stœchadis, dauci, amij, singulorum, *.
p^o. xvij. seselis cretici, *. pond. xxiiij.
mel atticum miscetur, datur non plus
quàm. *. p^o. aut uictoriati. Cæterū pro-
ut cuiusque uires postulabunt, dummo-
do infra hoc pondus ex aquæ caldæ cya-
this tribus in noctem secundū cœnam.
Hæc potio etiā febricitantibus tutò
datur : sed cœliacis in ipso dolore pro-
dest. Vitreo uase seruatur. CXXII.

Ad colī dolorem faciunt quidem mi-
rificè quæ superius posita sunt; sed cæte-
ra medicamenta in alijs uitijs dolorē le-
uant in præsentia, hoc uerò quod dictu-
rus sum, supra hominis spem conditio-
nemq; est. Ideo primo tēpore ne fidem
quidē habet, postea à nullo satis dignè
laudari potest. Nam & in præsentia
dolorem tollit, & in futurum remediât.

ne eum unquam repetat. Rarò em̃ quis iterum, uel ad summum tertio, hoc accepto medicamēto, uexatus est. Quam obrem si quando repetierit iterum dolor, dandæ erunt per triduum & tunc potiones, eodem modo quò primæ datæ fuerint. Interdum & tertio in dolore eodem genere potiones dabuntur: quod accidit post hanc, utique in futurum quoque remediatur, ita ut ne suspicio quidem ulla relinquatur uitij. Si quando tamen frigus, aut multitudo cibi præcesserint, grauitatem quandam, & priorem eius loci sine ullo dolore sentiunt planè, ut intellegant quasi quanto malo caruerint. Hoc medicamento muliercula quædam Romæ ex Africa multos remediauit. Postea nos per magnam curam compositionē accepimus, id est, precio dato quod desiderauerat, & aliquot non ignotos sanauimus, quorum nomina superuacuum est referre. Constat autem medicamentum ex his rebus: Cerui cornua sumuntur, dum tenera sunt, quasi in taleas breueis diui

diuisa, olla fictili componuntur, operculoq; superposito, ex argilla undique circumdata, fornace uruntur, donec in cinerem candidissimum redigantur: atq; ita in uaso uitreo mundo reponuntur. Cum dolorem habet aliquis, pridie quam poturus est medicamentum, debet abstinere ab omni re: atq; ita postero die sumuntur ex cornibus cochlearia tria cumulata, satis ampla: quibus miscentur piperis albi grana nouē trita, & myrrhæ exiguum, quod odorem tantūmodo præstare possit. Hæc cum in unum commixta sunt mortario diligēter, cochlea uerò africana, id est, inde adlata sumitur q̃ potest amplissima, & uiua mortario cū sua testa cōtundit, atq; ut est teritur, donec nullū uestigium appareat testularū. Postea uini falerni non saccati cyathus adiicitur, & nihilominus rursus teritur. Magis em̃ tunc apparent residendo amplitudines, si quæ reliquæ sunt: quibus leuatis, iterum adiiciuntur cyathi duo eiusdē uini, atq; ita prioribus bene admiscentur: transfunditur que cum his

quæ sunt in mortario, calice nouo, & supra carbones imponitur, mouēte aliquo cochleario liquorem, ne quid subsidat, et perurat. At ubi bene incaluerit, injiciuntur in eundem calicem quæ supra dixi cochlearia tria, & permouetur. Cum autem calore temperata & potio datur abducēda, statim dolorem leuat. Hoc facere oportebit per insequens bi-
dium, capiētē cibi in pradio, aut alio tempore exigū, quod facile conficiat, ne crudus sumat medicamentum. Post ea in consuetudine uictus sui, qui colo infestabatur, dimittatur. Oportet tamen nō indifferēter remediatis in futurū uiuere: tametsi em̄ à colī dolore tuti sint, metuere nihilominus debēt, ne alia parte corporis æquē adficiantur ad intemperantiā colī antequā remediati erunt.

Ad tumorem, dolorem iocineris

et duritiem.

CXXIII.

AD tumorem & dolorem iocineris, item ad duritiem facit bene lupi iecur primum in aqua feruenti dimissum, atq; ita arefactum. Quantū uictoriorū

riatorū pon. triū ex aquæ caldæ cyathis
tribus p̄ aliquot dies dabis. CXXIIII.

Item benefacit ad duritiā iocineris
ueterem cunillæ aridæ, quam satureiā
quidam uocant, cōtusæ. *.p°. unius, uel
uictoriati, cum mulsi cyathis duobus &
totidem aquæ. CXXV.

Proficit mirificè hæc cōpositio ad tu-
morem, & ad dolorem cum duritiā io-
cineris & lienis. Item ad renium dolorē
benefacit. Nam colorem corporis re-
stituit, qui propter uitia dictarum par-
tium corrumpitur, pallidusq; conspicit-
tur. Prodest hoc item medicamentum
etiā ad aquæ mutationes: croci. *.p°. x.
nardi. *.p°. duum, casia. *.p°. duum, co-
sti. *.p°. i. schœni. *.p°. i. cinnami. *.p°.
i. myrrhæ factæ. *.p°. i. mellis optimi
*.p°. xxv. Datur quantū faba ægyptia,
in musti mulsi cyathis quatuor. Vitreo
uaso seruatur. CXXVI.

Ad iocinoris duritiā ueterem, hydro-
picos, lienosos, arquatos, & quibus o-
pus est urina. Item ex partu residua mu-
lieri purgat, & uulvæ dolorē tollit sic.

Anesi. *. p^o. viij. dauci. *. p^o. iij. petroselli
 ni, item iuniperi, item silis, tragacanthi,
 p^o. selibra, panacis. *. p^o. viij. iris, myr-
 rhæ, costi, amomi, singulorū. *. p^o. vi. cu-
 mami. *. p^o. iij. casia. *. p^o. iij. smyrnæ, qd^e
 est semen olusatris. *. p^o. viij. nardi syria-
 ci. *. p^o. iij. acori. *. p^o. x. balsami semina-
 nis. *. p^o. vi. opij. *. p^o. v. erui moliti se-
 xtarij bes, scyllæ coctæ pōdo triēs, uini
 chij aut lesbij quod satis erit. Pastilli fi-
 unt. *. p^o. duum.

Ad auruginem.

CXXVII.

Dauruginem, quod uitiū arqua-
 tum quidā uocant, capreæ monta-
 næ stercus arefactum & tritum, adiecta
 mica myrrhæ, ex uini meri cyathis tri-
 bus: si febricitabūt, ex aquæ totidē. Itē
 rumicis radices tres aquæ tribus hemia-
 nis incoctæ, donec sextarius relinquat,
 inde cyathi quatuor per tridū dant.

*Ad lienosos ueteres & nouos impu-
 bium puerorum.*

CXXVIII.

Lienosis benefacit tamaricum lon-
 gè à mari collectū, & arefactū, &
 cōtusum. *. p^o. unius aut uictoriati, datū
 ex

ex aqua, uel ex posca. Prodest & inula
arida cāpana eodē modo contusa & cri-
brata, ex uīni mixtī cyathis quatuor. *.
p^o. i. data. Mirificē facit & ammoniacae
guttæ. *. p^o. uictoriati, cū cauliculis tri-
bus rubi ex aceto datū per dies quinq̃.
Tollit em̃ ex toto duritiā. CXXIX.

Potio ad lienosos, balani qua un-
guentarij utuntur. *. p^o. duū, costi. *. p^o.
i. capparīs radicis. *. p^o. i. hederæ nigræ
baccarum. *. p^o. duum, *πικλυμένον* quam
sylvæ matrem uocamus. *. p^o. uictoria-
ti, galbani. *. pon. viij. cardami nigri, id
est, nasturcij seminis. *. p^o. duum, & ui-
ctoriati, piperis nigri. *. p^o. i. scyllæ co-
ctæ. *. p^o. xij. Hæc omnia colliguntur
scylla, fiunt globuli, Dantur. *. p^o. duū
uel unius, ex melle & aceto mixtis cya-
this quatuor aut tribus. Eadem facit ad
hydropicos bene, ex aqua mulsa urinā
mouet. CXXX.

Lienosos sanat extrā impositus sinapis
sextarius unus detritus, adiecto sextario
uno lētis aceto coctæ. Oportet aut impo-
sitū esse medicamētū, donec dolorē pati
supra

non possint: postea solio caldo dimittantur, ut plures eos contineant dum desinat dolor, alioquin exilient: maior enim fit dolor calda tactis, postea ceratū ex rosa imponere oportebit. CXXXI.

Aliud eadem ratione impositū melius facit. Sinapis sextarius, git cyathi duo, nasturcij cyathi quatuor, myrobalani corticis cyathi quatuor, piperis cyathi duo, sinapi aceto acri pridie maceratum, deinde tritū, contusum cæteris miscetur: in panno inlitum medicamentū imponitur, fascia quàm longissima alligatur plurimum in unum cōmissa, quò tardius solvatur. Hoc est efficacissimum, & multorum annorum tollit duritiam. Sed post hoc si quæ reliquæ remanserint, ammoniaco tollendæ erunt & rubo. CXXXII.

Inflatibus lienosis dare oportebit aquam, in qua candēs ferrum demissum, uel lac caprinum, capta tantūmodo hædera pasta. Proderit & his sinapis sicca, contusa, cerato mixta, extrā impositum & gypsum aqua cōpersum, & acetum
in quo

in quo tamaricum decoctum fuerit, uel
fica abditum, & ita extra impositum.

Ad hydropicos.

CXXXIII.

AD hydropicos, cum iam distenti
sunt propter aquæ multitudinem
(initio enim alia uia prodest) benefaci-
unt chamæleæ, quæ herba est simillima
oliuæ, folia quinque uel sex, etiam si ari-
da fuerint, data ex aquæ mulsæ cyathis
tribus, salis cocleario adiecto: largiter
enim aquam ducit. Item squamæ æris,
quam λεπίδα Græci uocant, pondo ui-
ctoriati, data cum apij seminis parî pon-
dere ex aquæ mulso cyathis quatuor:
plurimum autem aquæ deijcit. Datur &
radicis succus ex uini cyathis tribus mi-
xtis. Oportet uerò secundū purgationē
spōgijs nouis totū uentrē ex aceto & sa-
le eiusdē mēsuræ diluto & inferuefacto
imponere, & constringere extra instita
longa, cibosq; assæ carnis dare, cū pane
azymo, fricātem totū corpus sale, oleo
paribus mēsuris, uini meraci quod satis
erit dantem.

CXXXIII.

Benefacit ad hydropicos hæc com-

h

positio, & maximè in initijs, quorum
 sufflatū corpus est, ὑποσάρεκα quod Græ-
 ci uocant, uitis albæ radicis pond. xx.
 cocci cnidij. *. p°. iij. scyllæ bulbi cocti
 detracta exteriorē parte. *. pon. x. myr-
 rhæ. *. p°. viij. cymini cyathis tribus, an-
 si cyathis tribus, uini falerni sextarijs
 duobus, passi sextario uno. Præter myr-
 rham, omnia contusa, non cribrata, ma-
 cerantur passo & uino, nocte & die: po-
 stridie colatur liquor, cui myrrha trita
 admiscetur, à quo cyathus datus à bala-
 neo alternis diebus, singulis adiectis cy-
 athis, donec profectus intelligat. Opor-
 tet autem his diebus dare eis cibos assæ
 carnis agrestis, aut uolucrum, aut uinū
 austerum meraculum.

Aluum mollicientia.

CXXXV.

Quoniam interdum res postulat et
 per aluum detrahi materiam, ut di-
 utius lippientibus, secundum sanguinis
 detractionem, scabiem, ignem sacrum,
 papulas habentibus, & alia eiusmodi circa
 cutem summam, non alienum iudic-
 cauimus horū quoque genus exponere.

Sed.

Sed prius exponemus quæ aluum mediocriter molliunt, simplicia quæ sunt.

Mollit ergo aluum herba mercurialis lenibus oleribus quamplurima mixta: item nitri uictoriati pondus, cum resina terebinthinæ auellanæ nucis magnitudine deuoratur: calices quoque eis incrustentur, additis quinque uel sex salis farrisque granis, apij seminis paribus mensuris: & is qui uinum non austerum præbiberit, quantum possit ante cibum, & inter prandium, uel coenam, bellè aluum mollit. Item ouilli lactis sextario si quis adiiciat cnici purgati. *. p°. iij. Mollit & uentrem quidem tribus heminis uini ut aloës uictoriati pondo, uel idē pondus duobus tribusue sextarijs uini, & ita totū per partes aqua mixtum bibūt. Videtur autē uinū uetustius uentremque cū eo satis mollit. Facit autē aloë per se uictoriati uel. *. p°. ex aquæ cyathis tribus frigidaë uel calidaë pductæ. CXXXVI.

Purgat ergo bellè chamælea, quæ herba oliuæ folia similia habet: quorū quinque uel sex dare oportet, trita ex aquæ

mulſæ cyathis. iij. frigida, ſi adſuetus erit: ſi minus, calida, adiecto cochleario. Detrahit em̄ aquam largiter. Biles purgat, & filicis radix lota & raſa, atq; in minimas particulas cōciſa, quātū placet aceto aſperſas cōdito, ut ſolet, ita cū p^o. quadrante cōſumpta. CXXXVII.

Bene purgat & hæc cōpoſitio: Aloës uictoriati pondus, colofoniæ uictoriati pondus: unā teruntur, adiicitur mellis quod ſatis eſt ad colligēda ea. Datur ex aquæ calidæ uel frigida cyathis quatuor. Hoc medicamentū ſtomachum non corrumpit.

Globuli mirifice purgantes, qui ut ſumuntur, ita integri deiiciuntur, nec lædunt ſtomachum. CXXXVIII.

Colofoniæ. *. p^o viij. bdellij. *. pondus, cōmis. *. p^o. unius. Hæc tria ſucco lactucæ colliguntur, & finguntur pilulæ fabæ magnitudinis. Dantur paribus pilulis uſq; ad ſeptē, prout uni uſcuiuſq; uires patiuntur.

Globuli qui etiam coenatis dantur, & efficiunt mane deiici quod ſatis ſit. CXXXIX.
Coloſo.

C Olofonia. *. p^o. iij. aloës. *. p^o. iij.
 Tragacanthi. *. p^o. duum. Hoc pridie aqua maceratur, postero die cæteris admiscetur: fiunt inde globuli fabæ magnitudinis. Dantur à tribus usque ad septem, prout cuiusq; vires patiuntur. Stomachum nullo modo uexant.

Ad tineas & lumbricos necandos. CXL.

A D tineas necandas, eijciēdas, per triduum allium plurimū edat, & ueteratū caseum mollem, secundū hoc filicis Macedonicæ cōtusæ, aridæ & cribratæ. *. p^o. viij. cum melle quantū ipse uoluerit consumat. Post horas quatuor detur ei aloës & scamoniæ, singulorum uictoriati p^o. ex aquæ mulsæ cyathis quatuor: cū cœperit desurgere, aqua calda supponatur. Licet & sine oleo pridie incoenato dare utraq; medicamēta. CXLI.

Ad lumbricos satis cōmodè facit & sandonica herba quæ nunc uiget, & cornu ceruinū limatū lima lignaria, quantum quatuor uel quinque cochlearia ex aquæ mixtorum decoctorū cyathis tribus, pridie maceratum, deinde tritum,

& datum, aqua exigua adiecta.

Ad prolapsionem & libidinem nimiam desurgendi extremi intestini. CXLII.

T Enesmos est irritatio ultimæ partis directi intestini, in quo ultimo sæpius libet desurgere sine causa. Proderit ad hoc quoties desurrexerit, uino austerissimo & aqua calidâ fouere, uel uerbenis & murti & oliuæ ramulis, factis ita, ut duæ partes murti sint. Quinetiã penicillũ intinctũ, & nõ nimis expressum, ex alterutro eorum ano expositum proderit habere, uel eodem modo glomus staminis albi: diutius enim uaporẽ cõtinet. Perungundus erit anus specillo lycio, patarico, uel indico. Vel hoc collyrium iniiciendum, quod ad omnẽ defectionẽ, & tormina benefacit: Aca-ciae, mali granati corticis usti, singulorum, *.pon. iiii. hypocyttidis, rhois quo coriarij utuntur, opij, singulorũ pondo sena, omphacij pondo quatuor & uictoriat, croci. *.p. iiii. uino austero colliguntur: fiunt collyria magnitudinis nuculeorum pineorum.

Ad

Ad renium tumorē & exulcerationem, etiam
si sanguilentā urinam faciant. CXLIII.

ADrenium tumorem, & exulce-
 rationē, etiam si sanguilentā uri-
 nam faciant, rosæ aridæ foliorum, papa-
 ueris nigri seminis, nucleorum pineorū
 paria pondera, contunduntur seorsum,
 & in unum miscētur: inde datur quantū
 nucis iuglandis, ex passi cyathis duo-
 bus, et aquæ cyathis tribus. CXLIII.

Alia ad reniū dolorē potio, quæ etiā
 quasi arenā sabulosam detrahit. Apij se-
 minis, petroselini, anesi, singulorū. *. p°.
 xvi. dauci seminis. *. p°. iij. schoeni. *.
 p°. vi. croci. *. p°. trigintaduum, mellis
 quod satis uidebitur. Dantur quantum
 lupinus ex mellis ligula, & aquæ cya-
 this. iij. Ad reniū tumorem & dolorem
 facit eadē, & ad iecinoris, et ad lienis tu-
 morē, ad eos qui mali coloris, ppter hæc
 sunt uitia: itē aquæ mutationes. Croci.
 *. p°. x. nardi indicī. *. p°. duū, casia. *.
 p°. ij. costi. *. p°. i. cumami. *. p°. unius,
 myrrhæ stactes. *. p°. unius, mellis opti-
 mi. *. p°. uiginti quinque. Dantur quantū

fabæ ægyptiæ, ex mulsi cyatho, mixto
 aquæ duobus, uel mulsæ aquæ cyathis
 tribus. CXLV.

Si cui autem lapis in renibus innatus
 fuerit, & urinam nō faciet, medicamen-
 tum his rebus fieri debet: Petroselinū
 p°. .z. anesi p°. .z. dauci seminis p°. .z.
 git p°. .z. cinnamī p°. .z. schoeni pon. .z.
 croci. .v. apij seminis p°. .v. Hæc o-
 mnia tusa, creta, melle attico despuma-
 to p°. .ij. z. colliguntur, & medicamen-
 tum uitro condunt. CXLVI.

Ad tumorem & dolorem uesicæ, &
 exulcerationē benefacit aqua, in qua
 ferrum candens demissum est. Hoc ego
 traxi ab aquis caldis quæ sunt in Tuscia
 ferratæ, & mirificè remediunt uesicæ ui-
 tia. Appellantur itaq; uesicariæ, quon-
 dam Milonis Gracchi prætorij homi-
 nis optimi ad quinquagesimū lapidem
 reddentis. CXLVII.

Ad tumorem & dolorē uesicæ, & ad
 eos qui difficulter urinam reddunt: Al-
 terci seminis, apij seminis, maluæ semi-
 nis, cucumeris edulis seminis purgati,
 singu.

singulorum. *. p^o.vi. amygdalorum dulcium purgatorū, nucleorum pineorum purgatorum, singulorum. *. p^o.iij. opij. *. p^o.i. croci. *. p^o. unius & uictoriati, passo contusa consperguntur. Datur hoc medicamentum. *. p^o.i. ex passi cyathis duobus, & aquæ totidē. CXLVIII.

Ad uesicam exulceratam, nucleorū amygdalorum uictoriati pondus, cum cumeris edulis seminis purgati cyathus unus, anesi cyathus, papaueris nigri. *. p^o.iij. croci. *. p^o. unius, palmas cariotas. p̄. triginta. Has macerari oportet in passi sextariū unum, atq; conterere, his adijcere cætera: ex eodem dare nucis iuglandis magnitudinem ex passi cyathis tribus. CXLIX.

Ad sanguinem cum dolore per urinam reddentes: Aluminis fissi pondus uncia, tragacanthi pondus sextans. Tragacanthum ex alumine trito cogitur in pastillos uictoriati pōdo: hinc uiciæ magnitudine detractum datur ex passi cyathus tribus.

Ad calculosos experta. C L

AD initia uetustæue comprimenda, & emēdanda benefacit ad calculosos herba σκολοπένδριον, quam nos calcifragam appellamus, bellefacit confusa. *. p^o. i. ex aquæ cyathis tribus per dies triginta, eodē modo ἱεραβοτάνη, quā nos uettonicam dicimus. Item eodē genere datur tantum, licet aut aqua earum decocta uti cotidie ieiunū. *. p^o. unius, cum aquæ cyathis tribus. C L I.

Multos cum admiratiōe effectus audiui narrantes, Cai Iulii, nasci in lapidicinis bestiolas adhærētes saxis quasi uerucas: has quinque ex aquæ cyathis tribus suffundere, & per urinam extrahere lapides certum est. C L I I.

Ad calculosos, cucumeris feminis, dauci, anesi, apij, petroselinii, myrrhæ, singulorum. *. p^o. trium & uictoriati, cassiæ, daphnidis, cinnami, nardi, singulorum. *. p^o. unius, aqua colliguntur, fiunt pastilli lupini magnitudinis. Ex aqua dantur cyathis tribus per dies quadraginta. Hoc medicamentū cum componitur,

nitur, pilum ligneum sit, qui contunditur, anulum ferreum non habeat. Hanc enim superstitionem adiecit Ambrosius medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse. Detrahare autem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidum quasi arenam. CLIII.

Ad calculosos, lienosos, hydropicos, urinam detrahít, lapidẽ extenuat: Eryngij, pyrethri, saliuncæ, calcifragæ, singulorum. *. pº. xxv. ebuli, aristolochiæ singulorum. *. pº. oxymyrsinæ, quæ scoparia regia uocatur, succo hæc omnia cõtusa ligno, colliguntur, fiunt pastilli. *. pº. i. Datur autem ex aceti & mellis cyathis tribus. Calculosis illecebræ quantũ manus capit, aut auriculæ murinæ idem, aut betonice tantundẽ: earũ quælibet herba ex aquæ tribus heminis ad tertias decoquitur, inde sumuntur cyathi tres, & eodem adiñciuntur uini cyathi duo, et nitri uictoriati pondo, atq; his dilutũ medicamentum datur pº. i. per dies. xlv.

In arenam soluit lapidē, & hydropicis ex mulsi mixti cyathis tribus dandū est.

Ad lumborum dolorem diutinum,

& paralyfin. CLIIII.

DD lumborū dolorem, cucurbitæ syluestris floccorum, aut seminis *.p°.dum, brathys. *.p°.i. salis. *.p°.i. Fiūt catapotia melle decocto adiecto. Valentibus tota dat cōpositio, imbecillioribus aut dimidia. Sed manē p clysterem alius ducenda, ouorum albis temperatum. CLV.

Ad lumborum dolorem & paralyticos, cucurbitæ syluestris. *.p°.iiij. pyrethri. *.p°.iiij. myrrhæ. *.pon. dum uel unius. Dantur ex passi cyathis tribus: licet hinc catapotia fieri, dū idem ponderis deuore. Sed & his alius acris clysmo manē trahenda est. CLVI.

Ad lumborum dolorem & paralyticos antidotos Hiera Pacchij Antiochi melius omni medicamēto facit. Sed ad paralyfin mirificè hoc acopum facit, qd oportet in sole diu fricare, aut loco flamma præcalfacto. Olei sabini, *.p°.xxv. cucume

cucumeris syluatici recentis radicis. *.
 p^o. xv. Hæc radix magnitudine nucis iu-
 glâdis concisa uaso fictili nouo ex oleo
 coquitur, donec succum omnem remit-
 tat, & quasi arida sit: post hoc adiicitur
 per linteū uel colum transmissio oleo, in
 quo adiicitur dum calet, ceræ ponticæ
 in frusta redactæ pondo libra, olei lau-
 rini pondo libra, olei cyprini pondo li-
 bra, olei lilij pond. libra, olei ueteris p^o.
 dua, piperis albi contusi, & per cribrū
 tenuissimū transmissi. *. p^o. as. pyrethri
 contusi, & per idem cribrum transmis-
 si. *. p^o. unius. Hæc in unum miscentur,
 reponuntur uaso fictili. Facit præterea
 ad lumborū, & ad omnem dolorē cor-
 poris, & præcipuè neruorū. Muliebres
 locos durissimos mollit, cū diu alijs me-
 dicamētis nihil profectū est. CLVII.

Ad lumborum dolorem malagma
 quod propriè facit: Picis liquidæ sexta-
 rios duos, olei ueteris sextarium unum,
 resinæ terebinthinæ sextariū unū, ceræ
 p^o. libram & trientem, magmatis p^o. bes-
 sem, aphronitri p^o. trientem. Coquitur

pix cū oleo, donec spissā fiat, & post eā
adīcīt ei resina, deinde cera, & secun-
dum hāc ex interuallo magma. Vbi ha-
bet emplastri figurā medicamentū, tola-
litur ab igne cū tepere cōperit, & apha-
ronitrū aspergitur sensim, ne superfuna-
datur quod in cacabo est.

Ad podagram.

CLVIII.

AD podagrā caldam cū feruore, &
tumore rubicūdo, quam caldā uo-
cant, benefacit primis diebus herba ura-
ceolaris, item caseus mollis recēs per se,
postea herbæ salis pusillum admiscere
oportet. Item facit apīū uiride per se &
cum polenta. Nec minus solanū, portu-
laca, plantago, spongia uel rhodia, uel
africana mollis ex aqua frigida, lana suc-
cida ex rosa & uīno. Subīnde autē hęc
omnia mutare oportet prius, quā ex-
calefiant. Prodest & omentū caprinū.
Item faba molīta cū suis ualuulis ex ace-
to cū melle diluto cōspersa & imposita,
ducit enim sanguinem, & dolorē leuat.
Benefaciūt & mala citrīa q̄maxime co-
cta, ex acetī sextarijs tribus, donec madī-
da fiāt.

da fiant: qbus tritis adiicitur aluminis fissi
 p^o. uncia, myrrhæ p^o. sextās. Bñfacit &
 aloë aceto diluta, & per pinnā pedibus
 inducta. Itē opiū lacte muliebri dilutū.
 Mirificè uerò hoc facit cataplasma, id
 est, superpositū medicamentū. CLIX.

Tollit em̄ triduo dolorē lomentī he-
 mina, feniculi seminis cyathi duo, polen-
 tæ tenuis cyathi duo. Cōmiscentur hæc
 in unū contusa, molita, trita, deinde con-
 spargunt aqua pluuiā: et ita temperant,
 ne durū sit medicamentū, aut aquatū ni-
 mis. Impositū protinus leuat, triduo tol-
 lit dolorē. Hoc cōstat, si quis ter in men-
 se inter denos dies usus fuerit, in nocte
 non laboraturum. CLX.

Ad frigidā podagrā, quæ sine tumore
 et rubore cōsistit, cataplasma: Piperis
 nigri moliti hemina, feniculi seminis cō-
 tusi hemina. Coquunt ex aqua: utraque
 ubi tēperata sunt, adiicitur axungia suilla,
 & dū calet, pāno spisso inducto medica-
 mentū imponit. Benefacit ad idē genus
 & lini seminis, & fœni græci seminis,
 farinæ ordeaceæ, singulorum bini se-
 xtarij, cribrati in unum commiscuntur;

inde coquere oportet: quod satis erit ex aqua & oleo: subinde calidum cataplasma etiam imponere. Ad hos benefacit & hybisci radix ex aqua mulla cocta & imposita. Item sabucum cum axungia uetere tritum & impositum. Adiectus & brassicæ cinis cum axungia, uel semen caulium. Vbi autem impetus cessauerit & in hoc, & in priore genere podagrarum, calda aqua marina diu fouēdi sunt: uel, si hæc non erit, aquæ puræ feruenti salē adiūcito, post epiphemate uti oportet, quod ad parotidas scriptū est. Tolerat enim citò reliquias per sudores, & in futurum confirmat neruos, nec patitur facilè uitiari.

CLXI.

Scio quendam hoc quasi acopomedicum usum in noctem, nec postea tentatum podagra, cum antè diu esset uexatus. Lanam succidam pondo libra, uini ueteris sextario diu lauabat: deinde expressam reijciebat: uino autem residuo adiūciebat aphronitri usti pōdo sextantem, olei ueteris p^o. libram: reponerat in oleario fictili: utebatur, ut superius di-

rius dixi, in nocte. Multis pfuit ad corpus in duplici calceo pellem caninam habere. CLXII.

Ad utramlibet podagram torpedinem nigram uiuam cum accesserit dolor, subijcere pedibus oportet, statibus in littore non sicco, sed quod alluit mare, donec sentiat torpere pedem totum & tibiam usq; ad genua. Hoc & in praesenti tollit dolorem, & in futurum remediatur. Hoc Anthero Tiberij libertus supra haereditates remediatus est.

Genera medicamentorum, & demonstrationes

serpentum ictus, morsusq;. CLXIII.

VT sis tutus, etiam si quando rus secesseris, ponā theriacarū compositiones, id est, ad serpentū morsus, atq; ictus medicamenta. Sed prius quæ cognita habui remedia, ne cui serpētes noceāt, dicā. Habere ergo incinctū oportet peucedanum, uel cerui cum captus est, in oculi angulo, qui est ad nares uersus, quæ inueniuntur sordes uirosi odoris, has Siciliæ uenatores diligenter colligunt, & habent in cincto propter an-

tedictam causam, Idem præstat & hiera-
 botane, & trifolium acutum, quod ^{ὄξυς} ^{τρίφυλλον} Græci appellant: nascitur &
 hoc Sicilæ plurimum, nam in Italiæ re-
 gionibus nusquam eam uidi herbam, ni-
 si in Lunæ portu cum Britanniam pe-
 teremus cum deo nostro Cæsare, pluri-
 mum super circumdatos montes. Est au-
 tem folijs, & specie, & numero similis
 communi trifolio, nisi quod huius ple-
 niora sunt, & quasi lanuginem quandā
 super se habent, & in extrema parte ue-
 lut aculeum eminentem. Sed huius fru-
 tex duorum pedum interdum, aut etiā
 amplior cōspicitur, & odorem grauem
 emittit, quorum nihil circa patrense tri-
 folium inuenitur. Sed utrasque superius
 dictas herbas, quas cum inueneris, pri-
 die notare oportet, & circūscribere sini-
 stra aure fruges aliquas ponentem, atq;
 postero die ante solis ortū sinistra manu
 uellere, ita illigatas habere. CLXIII.

In Africa, aut sicubi scorpiones sunt
 noxi, stellionem aridum incinctū opor-
 tet habere.

CLXV.
 Theriace

Theriace prima. CLXV.

Theriace facit ad omniū serpētium morsus, & ictus, & adflatus. Mirificè eadem prodest & ad contusiones, & ad conuulsiones interiorum partium laterisq; ex qualibet causa, & pectoris dolores. Vitis albæ radicis pōdo octo, trifoliū acuti seminis, quod & ipsum in extremo aculeū habet, uel eiusdem radicis trepōdo, panacis p°. iiij. terræ mali. *. p°. v. rori marini radicis. *. p°. iiij. laseris. *. p°. iiij. gīngiberis. *. pond. iiij. rutæ syluaticæ. *. p°. sex. cumini thebaici. *. p°. iij. myrrhæ. *. pond. iij. cumini æthiopici. *. p°. v. castorei. *. p°. iij. eryngii radicis. *. p°. iij. serpylli. *. pond. iij. erui albi seminis moliti. *. p°. xij. Chio uino consperguntur contusa ac trita: fiunt pastilli. *. pond. unius, aut uictorjati. Dantur ex uino mero uetere, uel ex mixto, uel aqua: quæ si non fuerint, per se commanducandus erit pastillus & deuorandus.

Theriace secunda. CLXVI.

Alter pastillus ad eadē facit: Cinna

mi. *.p°. iij. serpylli. *.p°. iij. staphisa-
 gria, quam herbā pediculariā quidam
 uocāt, quod pediculos necat, à quibus
 hoc nomen trahit, seminis. *.p°. iij. & ui-
 ctoriati, piperis albi. *.p°. vi. peucedani
 lactis. *.p°. viij. & uictoriati, glycyfidæ
 nigrae seminis, quam peoniam Græco-
 rum quidam appellant. *.p°. unius & ui-
 ctoriati, terræ mali. *.p°. triū, nasturcij
 seminis. *.p°. iij. cachryos. *.p°. duū &
 uictoriati, castorei. *.p°. duum, salicæ
 *.p°. quinque.

*Hic nonnullæ desunt compositiones: Theriace tertia
 ad aspidem, Theriace ad uiperæ morsum propriè,
 Antidotos Zopyri, & media pars antidoti mithria-
 datij, quarum aliquæ hic ex Galeno secundo
 antidotorum restituuntur à
 Io. Ruellio.*

Altera Theriace etiā ad aspidem. CLXVII.

Antidotos altera ad aspidis mor-
 sum siue præsumpta, siue post da-
 ta: gentianæ. *.p°. iij. trifolij. *.p°. iij.
 seminis eiusdē. *.p°. duū, polij. *.p°. iij.
 malī terræ. *.p°. pond. duum, peucedani ra-
 dicis, galbanī, singulorum. *.p°. duum,
 petrosæ

petroselinī. *. p^o. iij. rutæ syluaticæ. *.
 p^o. trium, pyrethri. *. p^o. unius, herbæ pe-
 diculariæ, quā uocant σαφίδρα & γρία, tan-
 tundem, maceris. *. p^o. iij. uitis albæ ra-
 dicis. *. p^o. duū, piperis candidi tantun-
 dem, ammoniacæ guttæ. *. p^o. unius &
 uictoriati, acori. *. p^o. iij. uarbasci, aiuge
 idææ, chamæleæ, marubij tenuis, cony-
 zæ minoris, cumini æthiopici, lachry-
 mæ papaueris, castorei, feniculi semina-
 nis, agarici, casia rufæ, schœni, idest iun-
 ci odorati floris, radicis ponticæ, singu-
 lorum. *. p^o. ij. dauci cretici. *. p^o. i. & ui-
 ctoriati, opopanax tantundē, sagape-
 ni. *. p^o. ij. & uictoriati, abrotoni. *. p^o. i.
 & uictoriati, styracis dictamni, singu-
 lorū. *. p^o. unius & uictoriati, cinnamo-
 mi, nardi, singulorum. *. p^o. iij. myrrhæ
 *. p^o. iij. thuris. *. p^o. unius, croci. *. p^o.
 yij. anesi. *. p^o. unius, cyrenaicæ lachry-
 mæ. *. p^o. i. hinnuli coagulī. *. p^o. iij. mel-
 lis attici, qđ ad ea excipiēda satis sit: inde
 sumit nucis abellanae tuberculo. Sic præ-
 sumpta à morſu tueſ. Hæc cōpositio ad
 Antipatrū autorem referit. CLXXVIII.

Ad uiperæ morsum propriè.
Non restituta. C L X I X.

Antidotos Zopyri ad lethalia uenena & omnem serpentis ictum efficax, ratio componendi hæc est : Opobalsami. *. p^o. trium, nardí indicæ, myrrhæ, troglitidis, iunci rotundi floris, cinnamomi, characiæ, costi recentis, píperis longi, hypocystidis, píperis nigri, scordij, meu cretici, cardamomi, singulorum *. p^o. iij. thuris masculi, opobalsami, dictamni, singulorū. *. p^o. vi. petroseliní, casia rufæ, singulorū. *. p^o. vij. croci coricij. *. pond. vij. mellis atticí quod ad ea colligenda satis sit. Datur abellanae nucis magnitudine, si febris absit, ex uia no, febricitantibus ex aqua mulsa. Prodest etiam sanguinem excreantibus, coeliacis, iocínerosis, lienosis, & renum dolore uexatis, emortuos foetus & secundas hærentes trahit. C L X X.

Antidotos mithridatis recipit hæc : Meu. *. pon. duū, lachrymæ papaueris pondo uictoriati, styracis. *. p^o. vij. polij, casia nigra, seselis, bdellij, píperis albi, sin-

bi, singulorum. *. p^o. v. & uictoriati, hypocystidis succi, myrrhæ, thuris masculi, castorei, piperis lōgi, cyphis, malobathri foliorū, singulorū. *. p^o. vi. scordij, costi, singulorum. *. p^o. vi. & uictoriati, nardi syriaci. *. p^o. vi. dauci cretici. *. p^o. vi. & uictoriati, croci, cinnami, gingiberis, singulorū. *. p^o. vi. succi radicis dulcis, agarici, singulorum. *. pond. viij. & uictoriati,

Hæc defuerant in compositione: sequentia in ponderibus & mēsuris & effectibus mithridatij compositioni, quæ est apud Galenum citato loco, consentiunt.

Acori. *. p^o. duū, phu. *. p^o. i. sagapeni *. p^o. ij. iris Illyricæ. *. p^o. ij. balsami seminis. *. p^o. duum, rutæ syluaticæ. *. p^o. ij. gētianæ. *. p^o. ij. anesi. *. p^o. trium, thlaspis. *. p^o. vi. & uictoriati, rosæ aridæ. *. p^o. iiij. mysi. *. p^o. iiij. acaciæ *. p^o. trium, commis. *. p^o. duū, cardamomi. *. p^o. ij. schoeni floris. *. p^o. vi. & uictoriati, opopanacis. *. pondo sex, opobalsami. *. pond. sex & uictoriati, galbani. *. pond. sex, & uictoriati, resinæ terebinthinæ

*. p^o. sex & uictoriati, rubricæ lemnisæ
 *. p^o. viij. melle attico & uino chio con-
 spergito, donec habeat spissitudinē mel-
 lis. Reponitur uitreo uase. Dandū au-
 tem est his qui malum medicamentum
 sumpserunt, fabæ ægyptiæ magnitudi-
 ne, ex uini meri, si poterit, cyathis sex:
 sin minus, mixti meracius cyathis qua-
 tuor cotidie. Et à serpente læsis danda
 erit. Ex mulso autem, quorum iecur du-
 rum est, aut arquati sunt, & quibus alio-
 quin urinā mouere studemus. Sed fabæ
 nostratis magnitudinis tussietibus, ocu-
 lis laborantibus, latus dolentibus: cæte-
 rum magnitudine ciceris celiacis. Pro-
 dest enim & his uiciæ magnitudo ante
 accessionem febrilium, tetanicis, opisthoto-
 nicis, spasmo correptis. Adiuuat enim
 eos lupini magnitudine, sed cum aquæ
 cyathis tribus.

Antidotus Apulei Celsi.

CLXXI.

Antidotus Apulei Celsi præce-
 ptoris, quam quotannis compo-
 nebat, & genere quodam publicè mitte-
 bat Centuripas, unde ortus erat, quia in
 Sicilia

Sicilia plurimi fiunt rabiosi canes. Facit enim ad horum morsum protinus quidam data per dies triginta, ita ut aquæ, id est, liquoris timore nunquam tentetur: qui cum accidit, summo cruciatu ad mortem eos compellit, quos ob antea dictam causam ὀφθαλμοφόνους Græci appellant. In ipsa autem correptione uti oportet ea, data cum rosæ cyathis tribus & exigua aqua .p°.i. Hoc proficit, ut aquam postea sine timore sumant, & minus quidem liberati hac difficultate cruciantur. Ceterum nemo adhuc correptus hoc malo, quantum ego scio, expeditus est. Quamquam peruenit ad me opinio, esse in insula Creta barbarum quendam naufragio appulsum, maiorem natu publicè mercedem accipientem. Quinetiam cum liquore timet, & latratus edunt, spasmodicè uexatur: remedium, brachio sinistro alligato efficere, ut & potionem accipiant, & liberentur uicio: quod adhuc antea antidotum Celsi inter omnes quasi insanabile constitit.

CLXXII.

Hoc ego cum quærerem ab hospite

meo legato inde misso, nomine Zopyro, Gordiense medico, qd esset pro magno munere accepi. Dixit autē hyænæ corij particulā esse panno inligatam: qd ego adhuc non sum expertus, quamuis ptinus magna cura hyænā inuenerim, & pellē paratam habeā: quia nō incidit ex eo quisq̃, & opto quidē ne incidat: sed quia id nō est in nostra potestate, si casu inciderit, remediū habere oportet ad tantæ rei experimentum. Antidotus autem Celsi hæc recipit. CLXXIII.

Nardi syriaci, croci, myrrhæ, costi, cassiæ, cinnami, schoeni, piperis albi, piperi lōgi, castorei, galbani, resinæ terebinthinæ, opij, singulorū, *.p°.iij. alterci albi, *.p°.ij. aneli, *.p°.i. apij feminis, tragacanthi, singulorū, *.p°.sex, mellis atticī sextariū unum, uini falerni uncia. In hoc maceratur tragacanthū & opiū pridie: postero die cōtusis cæteris, miscent in melle galbanū & resina, fictili patella super carbones imposita resoluuntur: deinde arida asperguntur, & si opus est adiicit mel: & ut cerati teneri spissitudinem habeāt, & rursus patella super ignē

imponit, moueturq; quæ sunt in ea, spatha fraxinea. Coquitur medicamentum, donec crocinum habeat colorē: ultima quæ sunt uino macerata adiungunt; uase uitreo antidotus reponitur. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine ex aqua. Facit aut etiā ad stomachi omne uitium, et præcipue quod cū fluore consistit. Facit & ad oculorū epiphoras, & ad tormina, & ad colī inflationē, iecinoris, pectoris dolorem, tussienteis, aduersus mala medicamenta omnia, serpentium morsus uel ictus. Oportet aut locū morsum à rabioso cane, uel à serpente diu tenere in exulcerationem: neq; pati cicatricem ducere, ut uirus illa pertrahatur. CLXXIII.

Extra itaq; ea sunt imponēda, quæ etiā sana corpora exulcerant, ut alliū, lepidiū, celidoniū, batracium, sinapis, scylla, cepa cū aceto. Optime facit & per se caprifici liber per se cōtritū & impostus hulceri. Itē laser per se.

Compositio emplastri. CLXXV.

Emplastrum antidotum, sed multo magis emplastri huius uis facit, quo Augusta propter huiusmodi casus

habuit compositum, & multis profuit.
 Accepimus à Triphone præceptore no-
 stro: Iris Illyricæ. *. p°. v. castorei Ponti-
 ci. *. p°. v. caprificus lactis aridi. *. p°. v.
 canis nigri adipis. *. p°. viij. eiusdem san-
 guinis. *. p°. x. resinæ terebinthinæ. *. p°.
 viij. leporis coaguli. *. p°. iij. salis ammo-
 niaci. *. p°. duum, laseris syrenæici. *. p°.
 duum, aut syriaci. *. p°. iij. ceræ ponticæ
 *. p°. xxxvi. olei ueteris cyathi duo, ace-
 ti scillitis cyathi tres. Arida ex aceto te-
 runtur: quæ liquefieri possunt, oleo ad
 ignem liquefacto miscentur, mortario
 tritis & temperatis in mellis spissitudi-
 nem. Vitreo reponitur.

Antidotus Cassij. CLXXVI.

Antidotus Cassij medici facit ad-
 uersus toxicum potum. Eadem si
 quis uenenato telo percussus est. Præ-
 terea ad omnis serpētis morsus aut ictus.
 Præcipuè ad canis rabiosi morsus, bis
 die sumpta. *. p°. unius, ex aqua mulsa.
 Facit ad pectoris & lateris dolorem, &
 tussim, & omnia interanea inflatiōe, a-
 liōq; dolore, aut quouis correpta. Nar-

Antidotus Cassij. CLXXVI.

di spicæ syriacæ. *. p^o. iij. costi. *. p^o. iij.
 cinnami, gērianæ, casia, myrrha, singu-
 lorum. *. p^o. trium, croci. *. p^o. triū, uuæ
 passæ purgata. *. p^o. duum, schoeni. *. p^o.
 duum, opobalsami. *. p^o. duum, mysis,
 dauci, singulorū. *. p^o. duū, cumini æthio-
 picī. *. p^o. duum, acori. *. p^o. iij. & uicto-
 riati, asari. *. p^o. unius & uictoriati, pe-
 troselini. *. p^o. unius & uictoriati, pipe-
 ris longi. *. p^o. i. & uictoriati, piperis al-
 bi. *. p^o. unius & uictoriati, phu pontici
 seminis. *. p^o. trium, rapæ seminis. *. p^o.
 iij. nardi folia. *. p^o. iij. scyllæ uictoriati
 *. p^o. pondus, feniculi seminis. *. p^o. iij.
 mellis attici quod satis erit, ad uenenum
 & ad serpentes, ex uino: ad cæteros do-
 lores interaneorum, ex aqua.

Antidotus Marciani medici. CLXXVII.

Antidotus Marciani medici, cui
 quia nihil deest, τέλεια dicitur græ-
 cè, id est perfecta. Facit ad omnia hæc
 uitia, ad quæ superiores antidoti omnes.
 Hoc Augusto Cæsari componebatur.
 Cinnami. *. p^o. viij. amomi. *. p^o. yi. casia
 nigra. *. p^o. xxv. croci. *. p^o. xvi. schoeni

*.p°.v. thuris. *.p°.v. piperis albi. *.p°.v.
 duo. myrrhæ. *.p°.x. piperis lōgi. *.p°.x.
 nardi indicæ. *.p°.x. S. nardi celticæ. *.p°.xvi.
 rosæ aridæ. *.p°.vi. costi albi. *.p°.duū.
 opobalsami. *.p°.iiij. laseris cirenaici
 uictoriati pōdus, uel syriaci. *.p°.i. stœcados.
 *.p°.sex. gentianæ. *.p°.v. trifolij acuti
 radicis. *.p°.iiij. uel eiusdē seminis.
 *.p°.triū. scordij. *.p°.x. polij. *.p°.v.
 asari. *.p°.duum. acori. *.p°.iij. phu.
 *.p°.iij. misy. *.p°.duum. dictamni. *.p°.xij.
 ammoniaci guttæ. *.p°.trium. agarici.
 *.p°.duum semis. balsami seminis grana.
 p°.xx. petroselini. *.p°.vi. et uictoriati.
 rutæ syluaticæ. *.p°.trium semis.
 feniculi seminis. *.pond. trium semis.
 dauci cretici. *.p°.iiij. anesi. *.p°.duum.
 cumini æthiopici. *.pond. duū. rapæ
 seminis. *.p°.v. & uictoriati. napi syluatici
 seminis. *.pond. trium. anatis fœminæ
 recentis. *.p°.ij. anatis masculi sanguinis
 aridi. *.pond. iij. hoedi masculi sanguinis
 aridi. *.p°.iij. testudinis marinæ sanguinis
 aridi. *.p°.vi. S. anseris masculi sanguinis
 aridi. *.p°.iij. mellis

mellis atticī qđ satis erit. Facit ad om̃ia:
hac ego cōposita habeo. CLXXVIII.

Quoniam antidotos, quas optimas
sciūmus, posui in facientibus ad omne
malum uitiū: aliud medicamentum
etiam ex multis rebus, simplicia quo-
que medicamenta, & propria remedia
monstrauī. Interdum enim hæc melius
aduersus quædam, quàm antidotos fa-
ciunt. Trademus autem singulorum ma-
lorum medicamentorum epotorum si-
gna, quò facilius intelligatur, qđ quis-
que sumpserit, & qua ratione adiuuari
debeat.

Ad cicutam. CLXXIX.

Cicutam ergo potā caligo, mētisc̃p
alienatiō, et artuū gelatiō insequi-
tur, ultimoq̃p præfocātur qui eam sum-
pserunt, nihilq̃p sentiunt. Adiuuari au-
tem debēt in initijs uīno mero subinde
quamplurimo caldo, & per se, & cum
pipere, & cum styrace poto. Atqui ma-
ximè prodest lac asininum datum: si mi-
nus, uaccinum, aut quodlibet. Opor-
tet autem & aluum acri clustere ducere.

eorum, & extrà super uētre[m] imponere
farinam ordeaceam, uel triticeam coctā
ex uino caldam.

Ad opium. CLXXX.

O Pium potum, quod quidam me-
conium uocant, ab odoris graui-
tate intelligitur: papaueris enim uiridis,
cuius succus est, qualitātē repræsentat.
Facit autem capitis grauitatem, gelati-
onem & liuorem artuum, sudoresq; fri-
gidos manare. Præterea spirationē im-
pedit, mentem soporat, sensus' que aba-
lienat. Adiuari porrò debēt qui bibe-
runt, aqua cum oleo in uinū admixtis,
sæpius datis, & frequenter reiectis per
pinnam aut lorum uomitoriū. Prodest
& uini cyathus, & passi & olei cyathus
eadem ratione datus. Item uinū & ace-
tum pari mensura datum ex aqua mulsa
cum rosa eius mensuræ, ita ut ista subina-
de cogatur reſc̄ere. Præterea caput ro-
sa & aceto sine intermissione curet, eo-
rumq; pedes assiduè fricentur manibus
siccis, aut linteo aspro inuolutis. Pro-
dest & sinapi ex aceto tritū, circumdatū
pedibus

pedibus cruribusq; , & à somni tempore prohibere ne obsopiantur.

Ad altercum.

CLXXXI.

ALtercum, quod Græci ὕσκηλα μὲν vocant, qui biberūt, caput graue uenisq; distentum habent, mente abalienabuntur cum quadam uerborū alteratione, inde enim hoc nomen herba trahit altercum: postea sopiuntur, & omni sensu carent, liuiscētibus membris eorum. Adiuuantur autē lacte poto asinino quāplurimo, uel quolibet alio recentī per se, uel decocto. Sed ij prius aqua mulsa sæpius pota cogātur per pinā reijcere. Opio læsi similiter curent.

Ad gypsum.

CLXXXII.

GYpso poto stomachus, ueterq; dolore uasto urgetur, frigidus sudor subsequitur, oculi sanguilentī conspiciuntur, urina alba redditur, concrescit in aliqua parte uentris quod potum est, & tactu quasi saxum percipitur. Adiuuari autem debent qui his malis uexantur, lixiuio ē sarmentorum cinere facto quamplurimo poto. Item aqua thymū,

k

aut origanum decoctum habente.

Ad spumam argenti.

CLXXXIII.

S Puma argentea pota, quam Græci *λίθαργυροῦ* dicunt, uentris infert grauitatem, inflammationem, postea dolorem cum urinæ difficili exitu procedente tempore: coloris quidem quasi plumbei sunt: præcipuè hæc deformitas circa faciem deprehenditur. Suppurât autem plurimæ partes eorum. Adiuuâtur secundum reiectionē aqua mulsa, acriq; curatione, pipere, myrrha, apij semine, pōdere pari in unū mixtis, ex eoq; medicamēto. .x. p°. unius dare cum uini cyathis tribus quatuor uel cotidie potis.

Ad cerussam.

CLXXXIII.

C Erussa, quam Græci *ψιμύθιον* uocant, qui biberunt, facile deprehenduntur, linguam enim albam habent, commissurasque dentiū albicantes. Præterea nauseant, reiiciunt potum medicamento, caligant, magis magisque uertigine quadam urgentur. Postea spiritus uia intercluditur, & præfocantur. Adiuuantur autem post uomitum ab oleo,

leo, uel ab aqua mulsa, cremore ptisanæ caldo largiore accepto, sed bene uncto. Item lacte cū melle poto. Facit & malua discocta, concisa, sale & oleo pipeæ reque condita, & pro sorbitione data per se, uel cum urtica, herbaque mercuriali. Profunt & nucleorum persicorum interiora ex uino trita atque pota quamplurima. Item lixiuia calda ex cinere famentorum facta.

Ad coriandrum.

CLXXXV.

Coriandrum datum apparet quidem ab odore spirationis totiusque corporis. Redolet enim & hoc herbam ut infectum. Intelligitur autem ex gustu. Facit porro raucitatem, & mentem mouet. Adiuuari autem debent qui biberunt, ex uino mero atque plurimo, uel aqua marina, uel muria dura pota. Item ouis anserinis sorbilibus plurimum salis habentibus, uel iure gallinaceo, agnino uel quampinguissimo, & salissimo per se poto.

Ad leporem marinum.

CLXXXVI.

Leporis marini gustus non absimilis

illotis piscibus, aut etiā putentibus: qui
sumpserunt autem, stomacho uesicâq;
adficiuntur, ita ut urinam quidem diffi-
culter, & cum dolore, purpureiq; colo-
ris reddant. Stomacho item tento & do-
lenti sunt, auersoq; ab omni esca, præci-
pue pisce, Nauseant præterea & subin-
de reiiciunt spumosa, interdum biliosa
aut sanguilenta, & maximè cum simula-
uit, aut nominauit aliquis piscem. In so-
mnis littoris pulsus fluctus uidentur sub-
inde audire. Oculi eorum exulceran-
tur, genæ inflantur. Coloris mali, & ue-
luti plumbei fiunt, minutatimq; per ta-
bem quasi phthisici consumuntur. Adiu-
uari autem debent hoc malo circūuen-
ti, lacte muliebri, uel equino, uel uaccia-
no, aut asinino quāplurimo cotidie per
se, aut cū melle sumpto. Prodest & mal-
uæ sorbitio benè uncta & salsa. Itē pro-
sunt malorum punicatorū grana adsidue
data. Benefacit & pix cedria, si quis in-
de bina, ternæue cochlearia eius sumpse-
rit per se, uel ex passi cyathis duobus tri-
bus ue. Item benefaciunt iuniperi tritæ
quama

quāplurimo cū passo, aut per se datæ.

Ad salamandram. CLXXXVII.

Salamandra quibus data est, lingua
exasperatur, corpus inualidum fit:
præter hoc torpet rigoribus quibusdam
& liuoribus quasi maculis uariat. Adiu-
uari autem debent quibus impacta est,
melle quamplurimo per se, uel cum resi-
na ex pinu, cuius etiam tenera folia cū
herba quam Græci χαμαιπύθου appel-
lant, decocta ex aqua mulsa profunt.
Item lini seminis farina ex aqua mulsa
sumpta quamplurimum bene adiuuat.

Ad aconitum. CLXXXVIII.

Aconiti gustus est auster atq; sub-
amarus. Potum autem protinus fa-
cit corpus graue & displicens. Mordet
autem stomachum & cor adficit: itaque
sudor euestigio insequit, multus & fri-
gidus, maximè circa oculos & frontem
apparet. Inflantur intestina, & uēti plu-
rimum emittunt, qui biberunt, capitisq;
dolorem habent cum uertigine quadam
adsiduè quidem, sed præcipuè cum se è
lectulo leuare conantur. Proprium est

autem huius mali medicamēti protinus
 liuidos articulos & artus facere. Sed ad-
 iuuantur facilē qui id sumpserunt, ruta
 quamplurima pota cum uino; item iure
 gallinæ pinguis uel bubulæ. Prodest &
 his uinum chamæpythyn decoctam in
 se habens, item acetum melle mixtum,
 in quo ferri stercus, quod σκωρίαν Græ-
 ci uocant, ustum, prius inferuescat sæ-
 pius, & ita detur. Item proficit abroto-
 ni pondo sextans ex uino datum, & ori-
 gani pondo sextans eodem modo datū.
 Præcipuē autem adiuuabit, si quis coa-
 gulum leporis, hinuli, & porci in unum
 miscuerit, & dederit ex uini hemina aut
 cyathis tribus, *. pond. i. uel uictoriati
 pondus.

Ad cantharidas.

CLXXXIX.

C Antharides gustum & odorē si-
 milem picī ē cedro factæ habent.
 Potæ stomachi dolorem, morsusq; ex-
 citant, præcipuē uesicæ. Quamobrē qui
 biberūt eas, difficulter urinā & cum san-
 guine reddunt, exulcerata scilicet uesi-
 ca; præterea animo subinde linquuntur
 deficiunt

deficiuntq̃. Adiuuantur autem cum sæpius reiecerūt, passo cum oleo poto uel omni lacte, sed debent plurimū eius sumere. Itē profunt eis nucleī pinī per se sumpti, uel ex aqua mulsā, aut ex passo criti & datī. Item cucumeris semen purgatum, & linī semen ex passo datum. Adiuuat bene & ius pingue agninum, uel ex bubula factum, & farina triuicea pultis more cocta, plurimū anserini adipis habente. Prodest & samīæ cretæ. *. p^o. iij. cū passi cyathis quatuor mixtisq̃ aqua datum. Item oleum irinum ex ruta tritum & potum.

Ad buprestim. C X C.

BVprestis gustus est nītri similis. Facit autem tumorem stomachiq̃ infinitum dolorem, & inflat totū corpūs in speciem hydropici. Adiuuatur aqua ficus aridæ decoctæ, & ipsa ficu plurimum sumpta. Item passo plurimum & lacte muliebri, & iure suillo pingui accepto, & nītri. *. p^o. iij. cum aqua hemina dato, & cæteris quæ supra ad cantharidas scripta sunt.

museo

k 4

Ad dorycnion.

CXCII.

DOrycnion gustum quidem habet lactis, potum uerò singultus crebros facit, & uomitus frequenter concitat. Reijciunt autē ab stomachoamenta, quæ etiam simillima torminosis, sub indecōp animo deficiuntur. Adiuuari autem debent læsi eo, lacte asinino, equino, bubulo, conchilijs omnibus crudis atq; decoctis.

Ad Ixiam.

CXCIII.

IXia, quam quidam chamæleonta uocant, odorem habet, cū sumitur, oculi; pota autem linguæ tumorem facit. Mentem abalienat, uentremq; & omnes naturales exitus supprimit. Adiuuatur autē læsi ab ea, absinthio poto cū uino. Item castorei, *. p°. ij. dato ex uino cyathis quatuor, & rutæ fruticibus quinque uel sex. Facit bene & chamælea, *. p°. triū, ex uini cyathis tribus aqua mixtis, nec minus radix laseris ex uino data. Tragoriganum eodem modo datum.

Ad ephemeron.

CXCIV.

Ephemeron potū protinus quidem totum

totū os prurire facit uelut scylla tactū,
 postea etiā adurit quasi pipere mandu-
 cato, secundum hæc quoq; stomachum
 mordendo exulcerat: atq; qui id bibe-
 rint, primum ab ore sanguinem expu-
 unt, deinde ex stomacho cruorem rei-
 ciunt, postea per sellas, & iam abundan-
 tius eundem deiciunt. Adiuuabuntur
 autē læsi ab eo, polygoni succo quam-
 plurimo per se poto, uel arido trito pon-
 do libræ, dato cum aqua. Præmaceran-
 tur autē mala cydonia, aut uitis capreo-
 li, aut myrti bacca, aut eiusdem folia.

Ad toxicum.

CXCIII.

TOxicum cuius sit gustus haud faci-
 le quīuis dixerit. Verum cum potū
 est, euestigio ciet dolorem omnium in-
 teraneorum infinitum, & uelut telo tra-
 iectorum, concitatq; mentis furorem,
 cogitq; exululare, & palpitare lingua si-
 militer decollatorū capitibus: nihil em̄
 potest intelligi ex uoce eorum. Adiu-
 uantur autem qui id biberūt, rosa pota,
 aut oleo irino, coactiq; frequentius rei-
 cere. Item aluo acri clysmo sæpius du-

cta, postea passo, lacte, & antidoto mi-
thridatio.

Ad pharicum. CXCV.

Pharicum & ipsum dicitur ex com-
pluribus componi, gustumq; habe-
re nardi. Potū autem facit spasmon, ci-
tō exanimat. Adiuuant uerò læsi ab eo
saliunca, id est, nardo syluestri quamplu-
rima ex uīno sæpius data. Item olusa-
tri radice aut semine ex uīno dato. Be-
nefacit & hoc medicamentum: galbani
puri, *. p^o. duum, myrrhæ, *. p^o. unius cū
passi cyathis quatuor datū. *. p^o. i. et hoc
etiam ad omne medicamentum facit.

Ad tauri sanguinem. CXCVI.

Tauri sanguinis potum quamuis
quis difficilè cælauerit, hūc tamen
uestigia cruoris relicta inter dentium
commissuras produnt. Nauseant autem
& præfocantur qui biberunt, cum gela-
tur. Sed adiuuātur aceto calido sæpius
poto & iniecto per se, uel cum nitro la-
seris uel radice.

Ad lac potum. CXCVII.

Lac potum & gelatum odore spira-
tionis

tionis (si non confitebitur qui laborat) cognoscetur : præfocant autem & hoc homines. Adiuuari autem debent qui ab ea laborant, menta quàm plurima sæpius sumpta. Item coagulo agnino, leporino, porcino, uictoriati pondere ex aqua bis ter ue dato. Prodest & laseris radix cum posca, & alius acri clysmo ducta.

Ad fungos.

C XCVIII.

Fungis uenenatis cum quis laborat, primum nauseat, nec quicquam magnopere reijcit : postea stomachum uentrisque & præcordiorum infinitos habet dolores, manant sudores frigidi per artus, qui & ipsi gelantur celerrimè, nisi citè succurratur. Adiuuantur autem radice ea quam nos edimus, acri quam plurima per se, uel cum sale manducata, eiusque semine, si ipsa non fuerit, poto ex uino. Item ruta ex aceto trita & pota proficit. Nec minus lixiuia cineris ex sarmentis pota. Adiuuat & nitrum aceto dilutum & datum : eodemque modo aris flos datus, & mel cum aceto dilutum quamplurimum deuoratum.

Oportet autem & oleo antè multo pos-
to cogere eos reijcere quātumcunq; po-
tuerint, & eodem caldo subinde artus
perunctos expressius fricare.

Ad Irudinem.

CXCIX.

IRudinem, quā quidam sanguisugam
uocant, deuoratam, & adhærentem
faucibus, eoq; ipso molestiam, titillatio-
nemq; quandam præstantem, excutere
oportebit aceto quāplurimo epoto per
se, uel cū sale, aut nitro, aut lasere. Idem
faciunt & niuis glebulæ quamplurimū
deuoratæ.

Medicamentorum malorum non no-
cet nomīnum, aut figurarū notitiā, sed
ponderis scientiā: hanc porrò medicus
nec quærere, nec nosse debet, nisi dijs,
hominibusq; inuisus meritò esse uult,
& contra ius, fasq; professionis egredi.
Illas autē figuras, dico, & nomina ne-
cesse est ei scire, ut & ipse deuītet, ne per
ignorantiā aliquam sumat, & alijs idem
præcipere possit: hoc enim propriū est
Medicinæ, & illud execratissimi phar-
macopolæ contrario oppositi uirtuti
eius.

ciua, ut & in cæteris artibus animaduertitur: nulla enim est, quæ nō habeat aduersantē sibi sua specie similitudinis malignam professionem.

Ad suspicionem mali medicamenti.

C C.

QUoties autem suspicio mali medicamenti accepta fuerit, primum assumere oportet quæ nauseam faciūt, uel oleū per se, uel cum aqua, & reijcere: deinde ea quæ uentrem molliūt, tanquā lac, album ius pingue & salsum, chamæleam non cessantem inijcere clystere. Postea remedia propria ad singula quoq; & antidotos sumere.

Implicitas Medicinæ partes inter se & ita connexas esse constat, ut nullo modo diduci sine totius professionis detrimento possint. Ex eo intelligit, quod neque chirurgia sine diætetica, neque hæc sine chirurgia, id est, sine ea parte quæ medicamentorum utilium usum habet, perfici possunt: sed aliæ ab alijs adiuuantur, & quasi consumantur. Itaque quamuis ex magna parte ad diæteticos pertinētes compositiones iam exhibue-

rimus, tamen quasi claudicat & uacillat hic liber, nisi eas quoque compositiones, quæ ad chirurgos pertinet, posuerimus quarum initium ex emplastris faciemus.

Emplastrum Triphonis. C C I.
EMplastrum chirurgi Triphonis sub uiride quod facit cum uulnus ita actum est, ut os lædatur, uel frangatur, præcipuè caluariæ, κεφαλὴν ἰκνῆ ideo à Græcis dicitur. Idem si os scabrum, aut putre uetustate uitij factum est, expurgat & educit, quantum eius alienum est. Facit præterea ad canis morsum, & ad hulus recens molle. Squama æris cyprij .x. p. .xij. thuris. .x. pond. vi. ammoniacæ guttæ. .x. p. .sex, resinæ pitiuinae, id est, ex picea arbore. .x. pond. x. S. resinæ terebinthinæ. .x. p. .vi. adipis uituli pond. quadrans, ceræ pond. triens, olei p. .se. mūcia, acetī cyathus unus & dimidiū: acetum intritum consumatur ad omnia quæ teri debeant, dum leuia habuerint mellis spissitudinem: cera, & utraque resina cum adipe purgato & oleo lique scāt, & incoquant, donec habeant spissā
 si cera

si cerati temperaturam, feruentia superfundent rebus quæ sunt in mortario minutatim, & pistillo subinde dū calet, & permiscebunt. Atq; ita dum desinit feruere, emplastrum manibus subigetur, et redactum in rotundas ampliores, quas magdalidas dicunt, reponetur.

Emplastrum Megetis chirurgi. C C II.

EMplastrum Megetis chirurgi sub uiride ad eadem facit, componitur similiter, accipit hæc: Squamæ æris cyprij. *. p^o. xxv. ammoniaci guttæ. *. p^o. xxy. terræ mali, quod ἀριστολοχία Græci dicunt. *. p^o. xx. iris. *. p^o. xx. aluminis fissi. *. p^o. xx. myrrhæ. *. pond. xxij. resinæ terebinthinæ. *. p^o. iiij. pituinæ resinæ. *. p^o. iiij. adipis taurini. *. p^o. iiij. ceræ. *. pond. iiij. olei ueteris sextarium unum, aceti acris sextarios, iiij. Componitur hoc medicamentum cum Canicula sydus oritur, teritur in sole donec acetum omne consumatur. In quibusdam hoc emplastrum efficacius, in quibusdā superius positum inuenitur.

Emplastrum uiride Triphonis chirurgi. CCIII.

EMplastrum uiride Triphonis facit ad uulnera recentia, quo utebatur etiam in gladiatoribus, coloris boni ^{et uiridis} ~~et uiridis~~ ^{ideo} etiam appellabat. Recipit hæc: æris usti p°. sextantem, aluminis rotundi p°. sextantem, salis ammoniaci pon. sextantem, thuris pollinis p°, sextantē, æruginis rasæ p°. trientem. Hæc teruntur ex aceto aliquot diebus, postea ceræ p°. dua, resinæ frictæ p°. dua, cū olei ueteris p°. dextante, liquefacta ab igne mortario superfunduntur, & mixta manibus subiguntur.

Emplastrum uiride Traseæ chirurgi. CCIIII.

EMplastrum uiride Traseæ chirurgi ad recentia hulcera minus acre: æris usti. *. p°. duodecim, salis ammoniaci. *. p°. nouē. Hæc terere aceto per aliquot dies oportet, donec uiridis color appareat, postea adijcere aluminis fissi. *. pon. vij. Vbi iam omnia leuia facta fuerint, & mellis liquidi temperaturam habuerint, ceræ pondo libra, resinæ frictæ pondo libra, cū olei cyathis quinque liquefacta

liquefacta super ea adiiciuntur, & rursus mortario subiguntur. Refrigeratumq; manibus subigitur ac reponitur.

Emplastrum Triphonis chirurgi uiride. C C V.

EMplastrū uiride Triphōis facit ad recentia uulnera, morsus hominū, sed præcipuè ad uetera hulcera, quæ nullo modo cicatricē ducunt, & callos eminentes circa se habent. Oportet autem tunc nō linteolo, ut cætera, inlinere, sed dilatatum magis manibus in magnitudinem uulneris satis crassum imponere, superque linteola carpta plurima, deinde spōgiā nouam, ex uerbenis murto oleacq; factis. Constat ex his: æruginis. *. p°. iij. squamæ æris. *. p°. sex, thuris polinis. *. pond. vi. galbani. *. p°. iij. aluminis rotundi. *. p°. iij. resinæ pituinæ. *. p°. xxv. ceræ. *. p°. xxv. olei pon. sextante, terebinthinæ p°. selibra, acetī quod satis est. Cōponitur eodem modo quo & superius scripta uiridia emplastra sunt.

Emplastrum uiride Gliconis chirurgi. C C V I.

EMplastrum uiride quod sui generis, meo iudicio, superat omnia, uo

catur Isis. Accipit hæc: æris usti, æris cyprî, æruginis rasæ, salis fossiti, guttæ ammoniaci, thuris masculi, mali terræ rotundi, quæ ἀριστολογία σπογγύλη Græcè dicitur, mali terræ sarmetorum, quibus unguentarij utuntur, dicitur autem aristologia clematidis, aluminis rotundi, singulorum pond. unciam, myrrhæ, galbani, aloës, singulorum p^o. sextantē, ceræ p^o. trientem, resinæ colophonix p^o. iij. uel dua & bessem, olei sextariū unū. Hæc em galbano, resina, cera, et oleo super ignē liquefacta, miscetur mortario, præterea cæteris ex aceti sextario uno. Facit hoc emplastrū ad detectam membranam tegentem cerebrū: de industria à medicis cū terebratu exciditur, quod lædit eam os, uel alioquin detectam, rosa dilutum & impositum. Item facit ad capitis diutinum dolorem, quem κεφαλαλγία Græci appellant, dolenti loco raso superpositum, nec minus dies viginti. Item facit ad oculorum imminentes epiphoras, superpositum frontibus. Cæteras eodē modo sanguinis eruptiones ē

nes è naribus adiuuat. Et hulceribus factis eiusdem partis rosa dilutū prodest. Nec minus angina correptis faucibus, extrā superpositum, & toto collo. Parotidas initia habentes discutit, suppurationes iungit. si quis emissarium collectionis apto loco, id est, infra sinum ubi collectio est, fecerit, quod ὑπόχυστρο Græci dicunt. Eadē ratione suppurationibus in mammis mulierum futuris, aut factis prodest, iūgit omnem partem diuisam, & fibulis arctatam. Præcipuè cum intestina prolapsa & reposita sunt, atq; fartū uulnus, quod à Græcis dicitur γαστροσφία. Lateris, stomachi, uētris, iecinoris, lienis dolorē sedat. Adiuuat coeliacos, torminosos uētri toto circundatū. Item uesicæ tumētī prodest. Eodē modo lumborū dolorem leuat. Ad luxatum omne & eiectū, & repositum articulamentū benefacit. Et ad podagrā præter quoduis aliud medicamentū satis cōuenit, & huic mirificè prodest. Fistulas rosa dilutū sanat. Ad carbūculos & cancer imponendū est; purgat em̄, nec patitur latius

serpere: uetera hulcera cicatricē ducere cogit. Punctus neruorū musculorū, qui periculosissimi sunt, quos *νύγματα* Græci dicūt, sine incisiōe aut diuisione sanat cyprio oleo dilutum. Ad neruorum uitia omnia acopo melius facit.

Eiusdem nigrum.

CCVII.

EMplastrum nigrum eius Barbara dicitur, facit ad omne recēs uulnus & contusum, hoc pleriq; in gladiatoribus utuntur. Picis brutiæ. *. p^o. centum, resinæ frictæ. *. p^o. centum, bituminis iudaici. *. pon. centum, ceræ. *. p^o. centū. Hæc cōcisa in minima frusta, coquantur cum olei sextario uno donec spissentur: quibus depositis ab igne, & desinentibus nimis feruere, adiicitur spuma argenteæ. *. p^o. x. cerussæ. *. pond. x. æruginis. *. p^o. v. Et hæc autem cum acetī hemina terere oportet, & minutim aspergere, ne efferuescat medicamentū. Vbi his adiectis & intermixtis intepuerit medicamentum, opopanax oleo dilutus exiguo. *. p^o. duum adiicitur: deinde refrigeratū manibus, & subactum

actum medicamentum, & in partes diuisum, reponit. Huic ergo emplastro, cum ita compositum est, dum adhuc modicè calet, adijcito thuris pollinis pond. trientē: & mirum, quantum efficacius est, sine dolore atque tumore conseruat uulnera, & celerius sanat.

Emplastrum nigrum Traseæ chirurgi. CCVIII.

EMplastrum Traseæ chirurgi facit ad omnia recētia uulnera. Propriè autem ad neruorum musculorum punctus, contusiones, luxa: & in totum, tumorem non patitur fieri, articulos incisos iungit. Idem & gladiatorum, & omnium hominum ad periculosa uulnera mirificè facit: sinus ueteres, & fistulas iungit: interius iniectum primū, & postea extrà positum. Cerae p^o. iij. picis brutiæ p^o. iij. resinæ frictæ p^o. iij. bituminis saguntini, quod est natura liquidum, p^o. iij. cerussæ, æruginis, chalcitidis, misys, aluminis fissi, aluminis rotundi, melanterias, quæ creta sutoria dicunt, qua ligulæ calceolorum denigrant, gallæ syriacæ, singulorū pondo libra. Hac

aceto teruntur donec leuia fiant : quibus mellis habentibus spissitudinē, cera, atq; alia quæ igne liquefiunt, bitumenq; super ignem solutum, superfunduntur his quæ sunt in mortario, postea medicamentum manibus subigitur, & reponitur uase fictili acetum habente.

Emplastrum nigrum Aristi.

CCIX.

EMplastrum nigrū Aristi chirurgi facit ad omne recens uulnus mirifice, ad punctus neruorū & ad musculorum. Item ad contusum, luxum, præcipuè ad ossa fracta. Sine alligatura enim interdū dimidiō celerius sanat ea, & sine dolore feruat; iungit sinū. Habet autem hæc: Spumæ argenteæ, *.p°. ducentorum, aluminis fissi, *.pond. xxx. picis hispanæ, *.p°, centum, bituminis iudaici, *.pond. centum, propolis, *.p°. xxx. æruginis, *.p°. x. ceræ, *.p°. centum, amoniaci guttæ, *.p°. xxv. terebinthinæ *.p°. l. olei ueteris sextarios quatuor. Olei inferuescit spuma argētea trita curiose : deinde adiicit bitumen, & ipsum contusum & tritū, Vbi hæc cerati molis ha-

lis habent temperamentū, pīx adijcienda est: deinne cera & propolis, postea ammoniacum, à quo ærugo, ultimū alumen aspergitur. Oportet aut ubi tumor suspectus est, lanam succidā ex uīno sine oleo superponere.

Emplastrum Triphonis.

CCX.

EMplastrum nigrū Triphonis, Basilicon appellatur, facit ad cōtusa, & canis morsum, & furunculos. Idem rosa dilutum explet concaua uulnera. Picis brutiæ. *. p°. xl. resinæ. *. p°. xl. galbanī. *. p°. ij. olei cyprei. *. p°. fescūcia, cū oleo cōmuni. *. p°. ix. liquefiet, & coquitur donec coeat, post hoc resina adijcitur: deinde emplastri habens temperamentū, deponitur cacabus, & tepente medicamento galbanum dilatatum, ne uno loco subsidat, adijcitur.

Emplastrum Aristichirurgi.

CCXI.

EMplastrum nigrū, quod τετραφάγεμακον dicit, facit ad eadē. Recipit hæc: Cerae, picis, resinæ frictæ paria pōdera, adipis taurini dimidiū: unā omnia coquuntur, donec emplastrum fiat.

Emplastrum nigrum Dionysi chirurgi. CCXII.

EMplastrum Dionysi chirurgi facit ad mediocria uulnera, & in teneris corporibus puerorum. Idem iungit belle uulnera, & sine tumore seruat. Spumæ argenteæ. *. pon. cxx. olei sextarios duos. Hæc super ignem mouentur, donec cerati habeant temperaturam; post hoc adiicitur aluminis. *. p^o. xlv. & decoquitur usque dum rufum medicamentum fiat; post hæc adiicitur resinæ colophonæ. *. pond. xlv. ceræ. *. p^o. xlv. ubi emplastri omnia habuerint spissitudinem, deponitur cacabus, & tepente medicamento, & cum desierit feruere, adiicitur galbanum minutatim dilatatū, quò facilius soluatur. *. p^o. iij.

Rursum eiusdem.

CCXIII.

ALterum rubrum medicamentum, quo uenatores utuntur, facit ad canis morsum & omnium quadrupedum. Item & ad offensionē in stirpe, & cætera uulnera mediocria. Spumæ argenteæ p^o. quinque semis, olei ueteris p^o. dua. Hæc coquantur donec coëant; deinde
adijcia

adijcitur æris squamæ p^o.uncia, & co-
quitur donec colorem rufumumat: po-
stea adijcitur ceræ p^o.triens, resinæ fri-
ctæ p^o.duo, ammoniaci guttæ, deposito
paulisper cacabo, pond. quadrans, gal-
bani item diuisi in minimas partes, &
rursus reposito ad breue tempus, atque
iterum reposito & non feruenti, galba-
ni pondo sextans.

Coloris incerti.

CCXIII.

EMplastrum coloris incerti facit ad
omnia mediocria uulnera, quadru-
pedum morsus, contusa uel incisa articu-
lamenta (ut fit) cum ad dētem peruenit
pugnis. Idem ad furunculos mirè facit,
& strumas omnemq; duritiem discutit,
si id quis perseueranter imponat. Item
cicatricem ducit diutini hulceris, & in
totum ad omnia leuia in quotidianos
usus mirificum est: tumorem non pati-
tur fieri neq; pus. Hæret, ut fascia nō sit
opus. In balineo non excidet. Hoc ip-
sum est quod tu desiderasti. Olei uete-
ris pondo quinque, spumæ argēteæ p^o.
quinque, Hæc coquuntur donec coeāt,

postea adiicitur his resinæ pítuinæ p^o. quinque. Vbi emplastri habet temperamentum, adiicitur propolis inalienatæ synceræ & bonæ, qualis est attica, p^o. se libra, deinde in cacabo deposito uisci de quercu lecti p^o. quadrās; hoc semper habeo compositum.

Emplastrum Euelpisti chirurgi. CC XV.

EMplastrum luteum Euelpisti chirurgi facit ad tenera corpora mediocriter læsa et abraſa, quæ ἀπὸ σὺν μαλα Græci dicunt. Spumæ argenteæ p^o. selibra, olei hemina, coquunt dum coeant deinde adiiciuntur ceræ p^o. duo, resinæ pítuinæ p^o. duo.

Emplastrum Epispasticum. CC XVI.

EMplastrum quod aperit & educit pus, uel si quid aliud subest, ἐπιωασ σικὸν dicitur, ceræ p^o. libra, resinæ terebinthinæ p^o. libra, nitri rubri pondo libra; hoc teritur ex cinere lixiua, donec leue factum habeat mellis spissitudinē, postea supradicta cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignem, quibus adiicitur thuris pollinis selibra, & ita quæ in cacabo sunt,

sunt, mortario superfunduntur & commiscuntur. CCXVII.

Emplastrū albū ex sale, *διαλῶρ* Græci dicunt, facit ad omnem duritiē & ditinum dolorem, et ducit sudores, idem hulcera uetera & callosa renouat, & facilius alijs medicamentis quæ hoc pollicentur, cogit cicatricē ducere. Salis marini, cerussæ, olei ueteris paria pondera. Coquitur cū oleo cerussa donec coëāt, & postea sal admiscetur. CCXVIII.

Emplastrum aliud ex sale nigrū efficacius, idem ad omnia facit, sed recipit singulorū p°. libram similiter, olei autē ueteris triplex adiicitur. CCXIX.

Emplastrum album ad combusta & perniones: cerussæ p°. libram, olei myrteī p°. librā, spumæ argenteæ. *. p°. xxiiij. ceræ ponticæ p°. libram. Cerussa & spuma argentea coquuntur cum oleo donec coëant: postea adiicitur cera.

Emplastrū album Pacchij Antiochi. CCXX.

EMplastrum album Pacchij Antiochi, quo uti oportet cum in mammis mulierū, alio ue quouis loco duritia

fuerit, quæ ad omne medicamentū exasperatur, quam Græci καρκίνωμα aut κακοῦθες uocant. Facit autem ad combusta & uetera omnia, quæ non facilè cicatricem ducunt. Item ad hulcera ex frigore, uel per se facta. Præcipuè uerò ad ani uitia difficilia & uetera, rosa dilutū. Cadmiæ botryitis. *. p°. viij. pompholygos cypriæ. *. p°. vij. molybdenæ lotæ. *. p°. v. thuris masculi. *. p°. iij. cerussæ. *. pon. lxx. spumæ argenteæ. l. ceræ ponticæ. *. p°. viij. resinæ terebinthinæ. *. p°. yij. olei murtei. *. p°. centum. Quæ sunt dura, teruntur ex uini ueteris sextario uno in quo die & nocte macerentur. Alterci albi, iridis, fertulæ campanæ, terræ malī, papaueris syluaticī capitum corticis, singulorum. *. pond. vi. Cū leuia facta fuerint, & mellis spissitudinem habuerint, tunc murteū oleum minutatim in mortario adiiciatur: & cum fuerint temperaturæ liparæ. medicamentum coniiciatur in nouo fictilī cacabo, & coquatur pruna non nimis acri, moueaturq; sine requie ne aduratur: cum emplastrī temperaturam

peraturam habuerit, resinæ cera adi-
ciatur.

CCXXI.

Emplastrum ad combustum mirifi-
cè facit: cum multis usus sim, nullū ma-
gis probo, protinus enim impositū mi-
tigat: postea tollit dolorem, statimq; in-
finita celeritate per sanat. Spumæ argen-
teæ p°. selibram, adipis suilli purgati p°.
selibram, ceræ ponticæ p°. selibrā, ouo-
rum afforum uitellos sex, quos terere o-
portet, & miscere spumæ argenteæ &
tritæ, ceram cum adipe liquefacere, de-
inde pati coire, postea in unū miscere.

Lipara ad intertrigines & exaspe-
rationem.

CCXXII.

Lipara ad intertrigines & exaspe-
rationem, tumorē anī mirifica. Spu-
mæ argenteæ p°. triens, cerussæ p°. triēs,
thuris pollinis p°. triens, aluminis fissi
p°. quadrans, adipis suilli curati p°. qua-
drans, uini austeri ueteris hemina tres,
rosæ sesquilibra, olei acerbi selibra. Te-
runtur spuma, cerussa, alumen ex uino,
deinde adijcitur thus minutum & cre-
tum; & cum primum hæc læuia parue-

rint, cum oleamentis ex uino adipem liquefactum cum rosæ p^o. quadrante misce-
scere in unum oportet.

Lipara rufa.

CCXXIII.

Lipara rufa facit ad fissuras ani diutinas, quas *ῥόγας* dicunt: eadem & eiusdem partis exulcerationes, & uitia diutina benefacit. Spumæ argenteæ *. p^o. xxxvi. cerussæ. *. p^o. vi. chalcitidis uisæ. *. p^o. vi. mysios. *. p^o. vi. resinæ terebinthinæ. *. p^o. xij. ceræ. *. pond. vi. olei murtei sextarios. S. ij. aquæ p^o. sextans.

Cum aqua teruntur quæ prima posita sunt & olei pōdo dimidio, cū reliquo oleo cera & terebinthina liquefacto mortario superfunduntur.

Ad condylomata.

CCXXIIII.

Ad condylomata facit bene elateariū siue cera: qd' est succus cucumeris syluatici, cōpositus, ratione cū in pastillos redactus, ex aceto dilutum & perunctum. Itē propolis per se subacta & more emplastri imposita. CCXXV.

Facit bene & resinæ terebinthinæ. *. pondo. vi. ceræ idem in uinum cocta igni,

igni, quātum possunt gagatis lapidis tri
ti recipere. Multis & iris contusa & ex
uino mixta, cocta & posita uelut farina
ordeacea profuit. Facit & androniū me
dicamētum, qd' initiō posuimus, ad con
dylomata uino dilutū bene. CCXXVI.

Hoc medicamentum mirificè pro
dest. Aluminis melini. *. p^o. centū, chal
citis. *. pond. l. fæculæ. *. pond. l. Te
ritur aceto, cum opus est uino aut aceto
diluītur.

Ad hæmorrhoidas. CCXXVII.

Hæmorrhoidas sic curare oportet
medicamento. Perungatur cen
taurij succo p^o. duum. Hæc herba latinè
fel terræ dicitur, & ubiq; in agris nasci
tur. Est autem tenuis multorum ramo
rum in rectum surgentium, florem ha
bet exiguum purpureum. Absinthij suc
ci. *. pondo duum, aluminis liquidi. *.
pondo. ij. herbæ pedicularis. *. pondo
duum, misyis. *. pondo unius, mellis
quātum ad comprehendenda ea satis erit.

Hoc peruncto interius ano, aut lana
tincta & interius trusa, cum defederint

ad sellam, & apparuerint totæ, medicamento rursus bene tangendæ sunt undique, & præcipuè radices earum carbassus ducūt, specilli latitudine, subinde hauriente, medico cumulante medicamentum, & adstruente, imprimētēq; donec combibant: totum enim in ea est, ut ab omni parte saturentur. Est autem hoc medicamentum: Chalcitidis ustæ. *. p°. iij. æris floris usti. *. pond. iij. misyis usti. *. pond. trium, æris squamæ. *. p°. duum, disphrygis. *. p°. duū, foreos usti. *. p°. duum, auripigmenti. *. pond. duū. Hæc omnia teruntur, & sicca (ut dixi) hæmorrhoidibus imprimūtur undique: post hoc tenue, simplex, rarum linteolum imponere oportet, & super hoc panem autopyron ex aqua maceratum & tritum, rosaceo oleo adiecto. Hoc medicamentum sine magno labore circa septimum diem cadere cogit hæmorrhoidas. Oportet autem bis die panem imponere, nōnunq; in nocte si circumtensionem senserint aquario, die auriscalpio auerso, quam partem *κυσθίσκος* Græci uocant

ei uocant, sensim tentare, mouere ab alie
 natam oportet, quò celerius excidât hæ
 morrhoides. Hoc medicamētum omnē
 carnē, & omni parte corporis exhulce-
 ratam, & excrescentem, & eminentem,
 sine magno morfu tollit. CCXXVII.

Si quando non exhulceratas eminen-
 tias tollere sine ferro uoluerimus, ut uer-
 ucas, neuos, aliæue eius generis, hoc me-
 dicamento utimur. Calcis uiuæ. p^o. sex,
 sæculæ. *. p^o. trium, uitri usti. *. p^o. triū.
 Hæc terere oportet ex cinere lixiua, ex
 caprifico uel sarmētis, donec leuia passi
 habeant temperamentum, deinde adij-
 cere rubricæ aut atramenti quod possit
 colorare ea: deinde patella fictili coque-
 re ad mellis spissitudinem, atq; puxide
 nigri plumbi reponere. Melius autē re-
 cens facit, cuius usus est talis, quod de-
 stinātū erit tollere, id ipsum specillo ob-
 linetur crassius, ex interuallo penicillo
 absterget: & cum satis nigrū quasi per-
 unctum uisum fuerit, desinere oportet
 bit imponere res, & abstergere, & panē
 ex aqua imponere & rosa. Hoc & stru-

mas sanat antequàm suppurent. Oportet autem, cum hoc medicamentum causam fecerit in strumis, nullum aliud medicamentum adhibere, sanæ enim ita fiunt. *utitur de strumibus.* CCXXIX.

Cum uerò aliqua pars suppurauerit, & timidus fuerit ad sectionē cui id acciderit, uiscum quamplurimum colligere oportebit: eumq; cum cinere lixiui diutius terere, & aluta inductum imponere, ita formata, & in tantum spaciū circumsecta, quantū et quale uolumus hunc, id est, emissariū uomicæ fieri, & ea parte scilicet imponemus, quantum necesse erit aperire. Hoc eodem medicamento sæpe dolores diutinos pectoris, lateris, lumborum sustuli, cum ad nullum malagma aut auxilium cedebant: exulcerata em̄ minima parte cuiusq; dolentis loci, humoribus postea uitium ueluti eijciebatur. *utitur de strumibus.*

Ad eadem uitia. CCXXX.

MElior triphera, hoc enim nomen superius positū, medicamentum appellatur: facit ad omnia quæ ferro debent

bent tolli sine magno dolore. Idem hæc
 morrhoidas productas medicamento,
 quod suprà positū est, tollit. Vñ nimis
 iacētem sine periculo per auriscalpium
 lana inuolutū perunctam, ex parte qua
 tollenda est, amputat. Oportebit aut po
 stea aqua mulsea gargarizare, & lentis
 atq; rosæ aridæ aqua decoctæ. Eadē res
 & palpebram pilosam remediat, si quis
 radices aduersus naturā pilorum natas
 oblinierit, donec locus earū niger fiat.
 Recipit hæc: aris floris. *.p°. triū, calcis
 uiuæ. *.p°. sex, tapsiæ radicis. *.p°. sex, fe
 cula. *.p°. triū, nitri. *.p°. duum, auripig
 menti. *.p°. duū, fellis taurini, *.p°. sex.
 Teruntur ex cinere lixiua qua culinarij
 utunt, donec habeat mellis liquidi tem
 peramentum. Reponitur puxide nigri
 plumbi. Hæc puxis in ampliorem sta
 gneam mittitur, habentē cinerem lixiuā
 usq; ad operculū minoris. Oportet autē
 & hoc medicamētum colorare rubrica
 uel atramēto. Huic medicamento si ana
 tis sanguinis quasi duæ ligulæ adiunctæ
 fuerint, minus mordebit. C C X X X I.

Quatenus acrium & exhulcerantiū medicamentorū habita est mentio, ponemus qua stygmata tollūtur in dignis, & in multis. Hæc calamitas ex transuerso accidit, ut dispensatori Sabini Calui naufragio in ergastulo deprehenso, quē Triphon multis delusum, & ne casu quidem literas confusas ullo medicamento habētem, liberauit. Alij candidi spicæ capitis tritæ, cū cātharidibus uiginti alexandrinis (sunt autē uariæ & oblongæ) sulphuris uiui. *.p°.i. & uictoriati, chalcitis. *.p°. as semis, ceræ pondo triens, olei pondo triens, ceram cum tritis cæteris admiscuit & imposuit.

Intestini extremi prolapsio. CCXXXII.

In testinum extremum quibus prolabitur & excidit, quoties prodierit, toties uino calido, uel uerbenis, uel cinere lixiua lauari oportet & reponere. Prodest & pice liquida perungere & cedria. Interdum uel Andronio perungere, & sicca reponere. Facit & cinis ex famentis cribrata aspersa, alumen fissum tritum bene, & eodem modo aspersum,

atq;

atq; intestino reposito. CCXXXIII.

Ad testiculū tumorem cupressus bac-
cæ ex uino coctæ conueniunt, ex faba
quasi cōcha multo cum cumino cocta.
Item uua passa cū cumino cōtusa in mo-
dum malagmatis, melle quantū satis est
admixto. Idē uua passa, nucleata, contu-
sa ac mixta eiusdē mēsuræ uel pōderis.

Ad ueretri tumore & dolorem. CCXXXIII.

AD ueretri tumorem lens ex aqua
cocta, & trita, rosaceo oleo mi-
xta prodest. Si maior tumor erit, mali-
granati corium ex aqua coctum & tri-
tum, lenticulæ parī pondere admiscere
oportet. CCXXXV.

Si hulus sordidū erit, aut cancer ten-
tauit, aut iam occupauit, Andronios ex
uino benefacit. CCXXXVI.

Si cicatrix ducenda.

Desideratur. CCXXXVII.

Omne hulus in omni parte corpo-
ris sordidū (id aut est cum candicat, &
quasi crustam perductam albam habet)
purgat mel per se, iris arida contusa, uel
cum melle. Eadē ratione & terræ mali,

& panacis radix purgat sordida hulcera. Mirificè & hoc medicamentū purgat, etiam si cancer tentat, est autem leue: auripigmēti quod Græci ἀσθενικόν dicunt. *. p^o. sex, æris squamæ. *. p^o. trium, elaterij. *. p^o. i. chartæ combustæ cinis. *. pond. iij. cū opus est, cochlearia tria rosæ cyatho permiscuntur, inde linteola carpta continguntur, atq; ita hulceri superponuntur. Hoc medicamentū citò, & sine ullo morfu expurgat sordidissima hulcera. C C X X X V I I I.

Omne purū hunc & concauum replet Basilice rosa diluta, ut superius dixi, propè aut hoc medicamentū. Medullæ uitulinae. *. p^o. iij. adipis anserini. *. p^o. duū, butyri. *. p^o. duum, medullæ ceruinæ. *. p^o. duū, ceræ. *. p^o. iij. terebinthinae. *. p^o. ij. mellis. *. p^o. fescūcia, rosæ. *. p^o. fescūcia, resina cū rosa liquefcit, cui miscentur calenti mel & cera, cū cera præcalfacta in feruētī aqua cōtundunt, atq; ita superioribus miscent. C C X X X I X.

Omne hunc luxurians & crescens carne cōpescit chalcitis per se trita, uel
arīs

æris flos uſtus. Bene aut & propriè hoc
medicamentum facit, quo Meges ute-
batur: Calcis uiuæ. *. p°. duū, thuris. *.
pond. unius, æris squamæ. *. p°. unius.

Triphonis medicamentum. CCXL.

T Riphon chirurgus carnē eminē-
tem hoc medicamento compesce-
bat: æris floris uſti. *. pond. vi. chalcitis
uſtæ. *. p°. iij. myſis uſti. *. pon. iij. æris
uſti. *. p°. iij. Hoc acre eſt, & quaſi cau-
terium cruſtam altam facit: quāobrem
cancer non patitur impoſitū ſerpere, o-
mnem eruptionem ſanguinis uelutī cau-
terium ſiſtit. Et hoc autem, & quæ di-
xiſmus imminuit. Cicatricem quoq; du-
cit, ſi quis tincto, extractoq; ſpecillo, qd̄
ei quaſi puluis adhæſerit, exiguo oras
hulceris tetigerit. Sed propriè cicatri-
cem medicamenta hæc ducunt:

Triphonis ad cicatricem. CCXLI.

E Mplaſtrum efficax ad cicatricē du-
cendam: Spumæ argenteæ. *. p°. quin-
quaginta, myſij uſti: chalcitis uſtæ,
aluminis fiſſi, ceruſſæ, ſingulorum. *.
pond. iij. reſinæ terebinthinæ. *. p°. xij.

cerae. *. p^o. v. Cera & resina liquefiunt, deinde cum refrixerunt, raduntur, sicca & bene trita adijciuntur et cōmīscuntur.

Emplastrum diacadmias. CCXLII.

Emplastrum διακάμιας Græci dicunt, quod cicatricem ducit, cadmiæ p^o. libra, chalcitidis ustæ pondolibra. Hæc teruntur ex uini falerni heminis tribus, donec liquefacta mellis habeant spissitudinem: postea fit ceratum ex cera p^o. iij, resinæ frictæ p^o. iij, olei murtei p^o. iij. Cum refrigeratum est, raditur et misceat his quæ in mortario sunt. Sunt qui liquefacta hæc ipsa dum calêt, mortario superfundunt, et ita subigunt.

Ad papulas & porriginem. CCXLIII.

Ad papulas in capite efferuescentes, uel qualibet parte corporis totius porriginē, staphisagria trita, et nitrū decoctum tritum pari mēsurā, in mixto oleo & uino austero, ante desudationē corporis ac postea. Item alumen liquidum ex aceto staphide agria adiecta. Ad epiphoram uerò toto corpore efferuescentem medicamentum prodest.

Ad

Ad ignem sacrum. CCXLIII

Ad ignem sacrum benefacit medica-
mentū: rutæ uiridis p^o. triēs, spumæ
argenti p^o. bes, aceti sextarius unus, olei
uiridis sextarius. Cum aceti parte in spu-
ma & ruta teruntur donec leuia fiant, po-
stea quod superest aceti, uicibus cum o-
leo adijcitur. CCXLV.

Ad ignem sacrum coriandrum per
se tritum benefacit, est enim res uirosa:
uel cum pane eodem modo & menta
prodest, & cinis de filice facta, aqua cō-
spersa, oblinita. Item cīmolīa creta suc-
co solani diluta. Et per se solanum, uel
cum pane prodest. CCXLVI.

Facit & ad hoc medicamentum be-
ne: sulphuris uiui, opij, singulorum p^o.
semuncia, spumæ argenteæ pond. una-
cia, passo miscentur. Item hoc satis pro-
dest, cerussæ, *. p^o. viij, aluminis fissi, *.
p^o. trium, thuris, *. p^o. trium, croci, *. p^o.
duum, sulphuris uiui, *. p^o. duū. Terun-
tur hæc solani succo, cum opus est uino
diluuntur.

Ad zonam. *CCCCXLVII.*

AD zonam, quam Græci *ζώνη* dicunt, faciūt quidem ut supradicta omnia, præcipuè cicuta uiridis, bene trita & imposita. Item hoc medicamentū: cerussæ. *. p^o. xxxviij. aluminis fissi. *. p^o. xij. croci. *. p^o. i. thuris. *. pond. duū, acaciæ. *. p^o. viij. dyphrygis. *. p^o. duū, opij. *. pond. duum. Ex aqua teritur, & cum opus est, ex eadem dilutum perungetur. *Ad eam melius.* *CCCCXLVIII.*

Ad idem melius facit, gallæ, aluminis rotundi, chalcitidis, cretæ futoriæ, singulorū. *. p^o. duum, mysus, corticis malorum, acaciæ, singulorum. *. pon. iiij. calcis uiuæ. *. pond. xvi. Mali cortex in aceti sextario uno decoquitur donec madda fiat: deinde teritur acacia aceto eodem, macerata nocte & die admiscetur & unā teritur, Postea cætera adiunguntur, & fiunt pastilli: cum opus est diluantur aqua. *Ad utrumq; autem genus uitij.* *CCCCXLIX.*

Ad utrumq; autem genus uitij, mirificè medicamentū Andronicum facit.

Ad

Ad impetigines. C CXLIX.

AD impetigines uua aminea, quæ sic dicitur, bene facit. Est autē ruberrima, & in uepribus nascitur, qua fricari oportet impetiginem, quoad curetur & non appareat; hoc autem diebus sit paucis.

Ad suggillationes. C CL.

Benefacit huius radicis recentis succus, ad suggillationes & liuores perunctus. Scabiem tollit sulphur nigrum oleo mixtum communi, atq; in cerati spissitudinem redactum. Hoc etiam lepram, & quam Elephantiam dicunt, sanat: & omnia quæ efferuescunt per se cum inueterauerint.

Ad scabiem. C CLI.

AD scabiem halica ex aceto macerata, & trita benefacit, exiguo thure adiecto. Item picis liquidæ libra, ceræ, *. p°. semis, sulphuris uiui p°. sextās, aluminis fissi, *. p°. unius. C CLII.

Benefacit oliuæ æthiopica commi, quod græcè ἐλαία ἀιθιοπικὴ δάκρυον uocant, aceto dilutum. Item salicis libri

ex aceto cocti, atq; ita triti & impositi tollunt scabiem. Facit & eiusdem cinis ex aceto ad scabiē. Prodest & farina or-
deacea cocta ex posca, si tenerū corpus erit: uel ex aceto, si durū, per dies qua-
tuor aut quinque; deinde ceratum ex rosa adiecta cerussa, imponere oportet, do-
nec cicatrix ducatur. C C L I I I.

Facit bene & hæc compositio: Thu-
ris masculi p^o. triens, sulphuris p^o. uncia,
caparum p^o. sextās, rumicis erraticæ ra-
dices aceto quoq; tritæ p^o. —. Omnia te-
runtur; miscetur aceto quod satis erit, id
est, dū mellis crassi habeat spissitudinē.
Cum opus est, scabiei nitro ex aceto lo-
cus fricat diutius & pressius, deinde hoc
medicamentū superliniē. C C L I I I I.

Alia cōpositio ad idem: Scammonia
*. p^o. trium, myrrhae. *. p^o. unius, æris flo-
ris. *. p^o. unius, astulae regia, quā ἀσφόδιον
λόν Græci dicunt, radicis. *. p^o. duū, glu-
tinis taurini. *. p^o. duū, nitri. *. p^o. unius,
& uictoriati. Teruntur omnia aceto præ-
ter gluten, hoc enim pridie maceratum
cæteris iam tritis miscetur. Cum opus
autē

autē est, antē nītro & aceto locus exaspe-
ratur, deinde hoc oblinitur.

Vt consummetur liber, malagmata,
& acopa adiiciemus.

GENERA MALAGMATORVM

ad omnē corporis ualitudinē, CCLV



MAlagma ad ὀπιόδοτον, id est
cū ceruix reflexa est in poste-
riorem partē, aut rigida cū in-
tensione oculorū & maxilla-
rum. Facit & ad κυνικὸν πάσμιον, cum in
utramlibet partem deprauata est facies.
Idem ad omnem tensionem, & contra-
ctionem neruorū, & ligationē, ἀγκύλην
quod Græci uocant. Item ad dolorem
omnis partis, quāuis ueterem. Bdelli. *
p°. xvi. opopanacis. *. p°. viiij. galbani. *.
p°. viiij. adipis uitulini. *. p°. xvi. piperis
grana numero. clx. ammoniaci guttæ. *
p°. octo, cachryos. *. p°. octo, iris. *. p°.
xvi. ceræ. *. p°. lv. terebīnthinæ. *. p°. l.
Arida quæ sunt, contunduntur, cribran-
tur: succum habentia, cum resina subin-
de admixta cōtunduntur, cera in frusta

concisa aqua feruēti demittitur, & sub
acta manibus miscetur cæteris in pilam.
Oportet autem pilum ligneū frequen-
ter cypreo oleo perungere. Hoc mala-
gma cypreo oleo liquefactum acopi u-
sum præstat. CCLVI.

Malagma alterum, stomachū, aluum,
intestina soluta habentibus & choleri-
cis prodest. Cōfirmat omnē partem &
adstringit, quæ hæc desiderat. Aluminis
fissi. *. p^o. sex, rus syriaci. *. p^o. sex, gallæ
*. pond. sex, acaciæ. *. p^o. sex, ceræ. *. p^o.
xl. picis spanæ. *. p^o. xl. olei melini aut
rosæ. *. p^o. triētem. Acacia uino exiguo
macērata terit: cætera et pix oleo alteru-
tro mixta inferuescunt, quibus tempe-
ratis adiūciuntur cribrata sicca: njs aca-
cia miscetur, atq; in unum omnia subia-
guntur. CCLVII.

Malagma pectoris & lateris dolorē,
& quicquid ex perfriktiōe est, benè cal-
facit. Idem ad omnem dolorē prodest.
Sansuci contusi sextarius unus, iris con-
tusæ sextarij. xv. cyperi cōtusi sextarius
unus, resinæ terebinthinæ pōdo bes, ce-
ra pona

ra pondo quadrans, olei cyperi pondo
selibra, uini aminiaxi sextarius unus.

In uino arida contusa macerantur una
nocte & die: oleo, cera, & resina lique-
fiunt: deinde superfunduntur uino, mis-
centur manibus. Hoc medicamentum
efficacius est secundo, post dies trigin-
ta efficacius prodest: initiū enim hu-
mīdum ualde est, & uix inlitum re-
manet.

Malagma ad omnem dolorem, præ-
cipuè iocineris. Spicæ nardi. *. p°. v. cel-
ticæ, id est, salūncæ. *. p°. x. iris. *. pon-
yij. melliloti, quod à nobis sertula cam-
pana dicitur. *. p°. xxv. cyperi. *. p°. viij.
ammoniaci thymiamatis. *. p°. viij. car-
damomi. *. p°. vij. croci. *. p°. duum uini
falerni sextarius unus. In hoc omnia su-
prà scripta contusa uno die & nocte ma-
cerantur, præter ammoniacum: hoc em̄
aceto diluere oportet, & quasi ceratum
facere: postea ceræ p°. dua bes, & resi-
næ frictæ p°. iij. rosæ p°. libra, leuia sunt
& refrigerata, quæ rosæ & cæteris mi-
scent. Hoc & ad præcordiorū tensionē

benefacit, & uesicæ dolorem. CCLIX.

Malagma ad lienosos & ad iocineris dolorem. Ammoniâci guttæ p^o. i. ceræ pond. i. & sextans. Ammoniâcū ex aceto terit, admixto crocomagmate quantum colorare possit, ammoniâcū quod teritur usq̃ dum leuefactū mellis crassi habeat spissitudinem: postea cera liquefacta, rosa adijciunt mortario, & bene pastillo mixta, manibus utraq̃ subiguntur. Facit hoc malagma ad luxum, & ad capitis dolorē fronti superpositū. CCLX.

Malagma ad præcordiorum tensionem, uentris, stomachi duritiem cū dolore. Item ad secur & lienem prodest. Ceræ. *. p^o. quinquaginta, ammoniâci guttæ. *. pond. l. iris. *. p^o. xxv. panacis *. p^o. xx. anesi. *. p^o. xxv. nitrî. *. p^o. xxv. adipis taurini. *. p^o. xxv. fœni græci seminis. *. p^o. xxv. resinæ terebinthinæ. *. p^o. l. aceti acris sextarius unus, mellis p^o. triens. Mel aceto diluendum est, atque arida omnia his maceranda die ac nocte, ceram, terebinthinam, adipem liquefactam in unum cæteris miscere oportet, &

& manibus subigere.

Malagma ad lienosos.

CCLXI.

MYROBALANI. *.p°. I. aphronitri. *.p°. xxx. capparidis radicis. *.p°. xx. cardamomi. *.p°. xxy. ammoniaci guttata. *.pon. xxx. ceræ p°. selibra, irini olei p°. selibra. Cera irino soluitur, quibus ammoniacum aceto dilutum miscetur, & postea arida quæ sunt commiscetur. CCLXII.

Malagma ad omnem dolorem ueterem, & qualibet causa factum, præcipue ad lumborum dolorem, qui antè leniter scarifiant. Recipit hæc: bdellii p°. trientem, styracis p°. trientem, hyssopi p°. trientem, ammoniaci p°. trientem, piperis albi p°. trientem, thuris p°. trientem, baccae lauri aridæ p°. dua, terebinthinæ p°. trientem, opopanax p°. trientem, adipis taurini p°. trientem, medullæ ceruinæ p°. trientem, propolis p°. selibræ, olei ueteris p°. libram, ceræ p°. duo, thuris pollinis p°. libram. Oleum, cera, resina, propolis liquefiunt: deinde thuris pollinis p°. superius dictum adijcitur, & cætera minutatim, uel in unum contusa: opopana

cem oleo diluere oportet. CCLXIII.

Malagma quod discutit strumas, parotidas, panū, quod Græci φύγεθλον uocant. Idem omnem futuram suppuratio-
nem dissipat, factam aperit. Facit & ad
dolorem articulamentorū, uel cuiusli-
bet partis: præcipuè ad lumborū dolorē,
atq; inflationem stomachi uel coli. Picis
hispanæ, aphronitri, resinæ pituinæ, ce-
ræ, laurus baccharum, singulorum. *. p°.
xxxv. adipis taurini. *. p°. xv. ammoni-
aci guttæ. *. p°. iris Illyricæ. *. p°. xv. gal-
bani. *. p°. xij. piperis albi. *. p°. xv. Quæ
debēt liquefieri, soluuntur igne et oleo,
cætera cōtusa temperatis asperguntur:
ultimo loco tepente medicamento lau-
rus baccae miscentur. CCLXIII.

Malagma ad omnem dolorē corpo-
ris articulorum. Facit & ad podagram.
Idem discutit uomicas, aut aperit, præci-
puè in pectore & interaneis. Prodest &
lumborū doloribus. Ceræ. *. p°. viij. am-
moniaci. *. p°. x. bdellij. *. p°. x. iris. *. p°.
vi. galbani. *. p°. iij. terebinthinæ. *. p°.
v. Contundunt ordine quo scripta sunt,
pilo ligneo, cyprino oleo qd' in uino sub-
sidit.

fidit, peruncto: cera in aquam feruētem in minimas partes cōcisa dīmīttit, & sub acta manibus in pilam cōijcit. CCLXV.

Malagma item ad contusionē lateris. Idē facit ad suspectas uomicas aut iam factas. Præterea ad iecinoris, præcordiorū duritiā uel dolorē benefacit. Proderit & in omni loco dolentī impositū. Cyperi, ammoniaci guttæ, cardamomi, bdellij, thuris, resinæ terebinthinæ, singulorū p^o. bes: thus & bdelliū macerantē pridie uinī hemina una: cætera contundunt, cera p^o. libra & triēs, & olei cyprini sextarius unus cū terebinthina liquefiūt, cæterisq; cōmiscēt. Quidā adijciunt myrrhæ partē, croci partē sextantē, cinnamomi partē sextantē. CCLXVI.

Malagma ad luxum, cōtusum, canis morsum, parotidas, strumas, podagrā. Cerae p^o. dua, resinæ frictæ p^o. dua, picis hispanæ p^o. tria, ammoniaci p^o. libram, thuris pollinis p^o. semis, galbani p^o. semis, aceti sextarios duos. Ammoniacū tritū cum aceto soluit igne: deinde resina, cera p^o. ix. adijcit, & coquitur usque dum spissetur: postea thus admiscetur.

Vbi emplastri habuerit temperamentum, medicamentum tepentē galbano adiicitur.

CCLXVII.

Malagma ad podagrā, & omnem do-
lorē & tensionē neruorū, recipit hęc:
ammoniaci guttæ p^o. i. ceræ p^o. i. axunga-
giæ ueteris selibrā, olei ueteris p^o. triena-
tem, olei cedrini p^o. unciam, rosæ pond.
sextantem, cyprini p^o. sextantem, croci
p^o. sextantem, asij lapidis pondo uncia,
myrrhæ p^o. unciam, aphronitri p^o. sem-
unciam. Patella noua liquefit axungia,
cera cū oleo uetere: quibus adiicitur am-
moniacum tritū, & mouetur usq; dum
soluatur: postea oleum cyprinum, rosa,
& cedria in unum miscent: & tunc sub-
ducitur flāma, ne feruescat medicamen-
tum: secundum quæ adiicitur crocū tri-
tum ex aceto, deinde myrrha trita per se
aspergitur, ultimū nitrum, & asius lapis
foenicio inducitur.

Acopi genera & compositiones. CCLXVIII.

A Copum ad perfrictionem, lassitu-
dinem, tensionem neruorū. Idem
hyeme non patitur perfrigescere artus:
hoc,

hoc Augusta utebat̃. Sanfuci florís sextariũ unum, foenigræci sextarium unũ, rosmaríní foliorum sextarium unum, uíní falerní congiũ, olei ueríafri sextarios quinq;. Præter oleũ om̃ia in unum triduo macerare oportebit, quarto die oleum adiungere, & coquere in pruna nõ acrí medicamentũ, donec uinum cõsumatur: postea recolare per linteum duplex oleum, cui adhuc calenti ceræ ponticæ bessẽ miscere. Reponitur medicamentũ fictili uel stagneo uase. CCLXIX.

A Copum quod per uindemiã componitur, antequam mustũ deferuescit: musti recentis congiĩ quinq;, in hoc & olei ueríafri p^o. l. macerantur: res quæ infra scriptæ sunt cõtusæ, & percribratæ grandioribus foraminibus cribri. Iris illyricæ. *. p^o. xl. cyperi. *. p^o. xl. foenigræci. *. p^o. xl. piperis nigri p^o. xl. xylobalsamí. *. pon. xl. calami odorati quounguentariĩ utuntur. *. p^o. lxxx. spathæ quounguentariĩ utunt̃. *. p^o. lxxx. schœní. *. p^o. lxxx. saluincæ. *. p^o. lxxx. casia nigra. *. p^o. xxiiĩ. cardamomí. *. pond.

xxviij. styracis. *. p°. xxviij. costi. *. p°. xxviij. myrrhæ ammineæ. *. p°. xxij. cassiæ daphnitidis. *. p°. xxiiij. fertulæ campanæ. *. p°. xij. aspalathi. *. p°. xl. Hæc cum musto & oleo macerantur uase stagneo aut fictili per dies triginta. Oportet autē uas bene clausum & alligatum diebus his soluere, inuisere omnia: deinde rursum operire & signare ne uires euanescant: post dies triginta cōficiuntur macerata: deinde oleū purum excipiet, quod reponitur fictili uaso: cuius oleaminis uires ad omnem contractionem neruorum tantæ sunt, ut sit uix credibile.

CC LXX.
Acopum ad perfrictionem, lassitudinem, neruorū dolorem, grauioris odoris (superiores enim boni sunt odoris) Ammoniaci guttæ. *. p°. xv. galbani. *. p°. iij. resinæ terebinthinæ. *. p°. lvi. ceræ. *. p°. xxviij. mellis. *. p°. triens, olei ueteris sextarius unus, hyssopi p°. uncia, medullæ ceruinæ p°. uncia, opopanacis *. p°. vi. Sunt qui hunc nō adiiciunt. Ceram, oleum, terebinthinam liquefacere oportet,

oportet, deinde cætera adiungere, nouissimum ammoniacum tritum curiose. Hoc qui perunctus erit, etiam à serpente tutus erit.

CCLXXI.
Acopum, quo ferè Augusta & Antonia usæ sunt, facit ad perfrictiones & neruorum dolorem. Idem perunctum non patitur pfrigescere artus, & refrigeratos calfacit. Cõponitur hyeme hoc modo: Sumere oportet adipis porcinae sterilis trepondo, uel anseris adipis idem pondus: deinde aqua frigida bene lauare, atque in nouo uase adiungere uini ueteris congiũ unum, aut sextarios tres, nõ nimis confusa ponderis huius. Xylocinnami p^o. quadrantem, cardamomi p^o. quadrantem, cyperi p^o. quadrantem, schoeni p^o. quadrantem, rosæ aridæ foliorum pond. unciam, sertulæ campanæ coronas decem. Hæc omnia inferuescunt super carbones, deinde perfrigerata eodem cacabo reponuntur: posteroque & tertio die cum inferuescunt, reconduntur, quæ eodem modo die rursus recalsiunt, & colantur per linteum,

uel ex iunco factū de industria colum:
 uinum atq; adeps quæ superest in nouo
 uaso coniicitur: deinde cū gelauerit se
 adeps, oportebit fundum cacabi perfo-
 rare, & uinū omne emittere, atq; in prio-
 rem cacabum adipem eandem coniice-
 re, & uini eiusdem recentis eandē men-
 suram adiicere, res que nō nimis contu-
 sas nec cribratas. Nardi syriaci spicæ p°.
 sextantem, saluincæ p°. sextantē, amomi
 pond. quadrantem, casia p°, quadran-
 tem, myrrhæ p°. trientem, cumami pon-
 trientem, rosæ aridæ foliorum p°. sextan-
 tem, Deinde semel manè, & in nocte
 semel inferuefacere oportet; idem in po-
 stero die cum inferuefacta fuerint, per-
 colanda erunt, in cacabum priorē perfu-
 sum; sed antè diligenter & spisse obtura-
 tum: atque ubi se congelauerit adeps,
 extrahendum erit spissamentum, quod
 cum uinum omne fluxerit, quod super-
 est adiice. Vase stagnæ uno, uel pluri-
 bus, diligenter operto & adplumbato
 reponitur.

P E R O R A



Harum compositionum (si qua fides est) ipse composui plurimas; & ad ea quæ scripta sunt facienti scio paucas; sed ualde paucas ab amicis, quibus æquè ac mihi credo, acceptas adieci: quas cum iureiurando adfirmauerunt sese ipsos expertos esse, ut beneficientes scire ad uitia quæ scripta sunt. Illud autem te meminisse oportet, mi Calliste, quod initio dixi, eadem medicamenta in iisdem uitis interim melius, deterius uel respondere: propter corporum uarietatem, differetiamque ætatum, temporum, aut locorum. Eadem enim res non dissimiliter dispositis corporibus, non possunt eosdem effectus exhibere. Sed adfirmo ex magna parte prosperos euentus (si quando opus fuerit) has compositiones habéaturas.

SCRIBONII LARGI DE
Compositione medicamen-
torum libri finis.

bonij libro frequens est pon-
derum mētio, nō ab re
fuerit pauca hęc
subijcere.

P O N D E R A.

Duodecima pars asis	Vncia.
Sextans	Vnciæ duæ.
Quadrans	Vnciæ tres.
Triens	Vnciæ quatuor.
Quicunx	Vnciæ quinque.
Semis, quæ & selibra dicitur,	Vnciæ sex.
Septunx	Vnciæ septem.
Bes	Vnciæ octo.
Dodrans	Vnciæ nouem.
Dextans	Vnciæ decem.
Deunx	Vnciæ undecim.
As	Libra, unciæ duodecim
Pondo dua	Libræ duæ,
Trepondo	Libræ tres.
Sicilicum faciunt drachmæ duæ.	
Sextulas senas habet unciæ.	
Duella sextulæ duæ uocantur.	
Sescuncia	Vncia una & semis.
Semuncia	Vncia semis.

dam apud ueteres inueni-
untur notae.

S

÷

I

vv

2

Z

*

significatur

Semis uel selibra.

quarta pars semissis.

octaua pars semissis.

duella.

sicilicus.

pars unciae octaua.

Denarius.

Victoriatus argenteus erat nummus uictoriae nota signatus: pro quo in cōpositionibus à Scribonio re-
latis, Galenus duos obolos ponit, hoc est, scrupulum.

Sestertius & ipse argenteus nummus erat, duos
asses & semissem ualens.

M E N S V R A E.

Ligula cochlearis est mensura. Cyathus, Plinio au-
tore, pendet per se drachmas decem. Sesquicyathus
acetabulum implet. Acetabulum eidem Plinio hemi-
nae quarta pars est. Hemina sex impletur cyathis.
Dimidium sextarij hemina est. Congius senos capit
sextarios, ut Amphora octo Congios. Duplex Am-
phora Modius est.

De morbo, quem vulgò Gallicum uocant.	Cap. 1.
Vermis uomitu proiectus.	2
Lapides in tunica hepatis reperti.	3
Fluxus sanguinis ex poro.	4
De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina.	5
Umbilicus prominens.	6
+ Ex ano euacuata urina.	7
Mulier à spiritu malo oppressa.	8
Sanatum genu miraculo euidenti.	9
Miraculo liberatus.	10
+ Mulier uulua carens, uixit annis decem.	11
Aqua inter cutem.	12
Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua inter cutē liberatur.	13
Struma ingentis magnitudinis & ponderis.	14
Ex frigidissimo emplastro stomacho admoto mors subsequuta.	15
Ex frigidissima aquæ potu uir interimitur.	16
Defectio ex frigidissimo uini haustu.	17
Erosum capitis os.	18
+ Lapis ex intestinis eiectus.	19
Acrea acus pforato stomacho extrisecus truditur.	20
Ob incuriam à lepra liberatus.	21
Hulcus menti sanatum dentis euulsione.	22
Attoniti fulmine.	23
Lapis tussicula expulsus.	24

Magna suræ ossis parte rescata, puella cōualuit.	25
Sagitta carminibus euulsa.	26
Hulcerat æ nares.	27
Naturalia clausa incisione curantur.	28
Emortuus fœtus unco extrahitur.	29
Natus ano clauso.	30
Naturalia erosa & clausa.	31
Intestino tenuiori clauso, uita finitur.	32
Ex abscessu mesenterij mortuus.	33
Monialis intestinorum dolore mortua.	34
Tuberculum supra cordis arteriam.	35
Stomachum obcalluisse.	36
Callus in uenis mesaraicis.	37
Angina incisa.	38
Soluta umbilici unitas.	39
Elcuatio stomachi.	40
Menses uomitione proiecti.	41
Cordis pars patefacta.	42
Pure per urinam deducto, sanatus est pleureticus.	43
Ex tabe sanata solâ sanguinis missione.	44
Fluxus solâ oratione sanatus.	45
Gelatus in comitialem incidit morbum.	46
Amisâ atque iterum recuperata memoria.	47
Ex distentione neruorum mors subsequuta.	48
Ex incisa arteria ferè mortuus.	49
Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua.	50
Epoto ueretro iugulatus.	51

Vomitū ex albo ueretro mors subsequuta.	53
Represso sudore sanatus.	53
Pestilenti febre arreptus.	54
Claudus ex loco eminentiori cadens liberum recipit gressum.	55
Scorpione ictus, glacie se opprimi querebatur.	56
Fames ualida.	57
Mulier ferè mortua ex sanguinis missione.	58
Ex quartana malè curata sanitas, tum & mors sub- sequuta.	59
Molesta tussis sola sanguinis missione curata.	60
Difficultate spirandi mortuus.	61
Ex horrore flammæ in febrem incidens.	62
Puer horrore mortuus.	63
Tussi scissa est tunica intestinorum.	64
Ictus in cordis tunica conualuit.	65
Vitium stomachi curatum.	66
Melicera pro carbunculo iudicata.	67
Incisus coles sanari nequiuit.	68
Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola san- guinis missione sanatur.	69
Abscessus sola theriaca apertus.	70
Gangrænam mortem asferre, si à digito pedis ince- perit.	71
Ex carcinomate exagitato mors subsequuta.	72
Ramice curatus interiit.	73
Puella oculo perforato uisum recuperauit.	74

Yocineris uitio laborans, sola sanguinis missione sa-	75
natur.	75
Scisso intestino graciliori uita fruitur.	76
Vermis ex pectore propulsus.	77
Calculus ui sua decifus.	78
Os foeminiis erosum.	79
+ Calculo euulso sanata est mulier.	80
Ex solo uento mors subsequuta.	81
Brachium ab humero deductum.	82
Cor pilis refertum.	83
Ex stata febre uita sublata.	84
Multitudo uermium eiecta.	85
Recrementa ex naturalibus deiecta.	86
Vermes eiekti.	87
Frustulum carnis eiectum.	88
Quæ in inciso mortuo notatu digna inuenta sunt.	89
+ Urina ex alienis locis emanans.	90
Ex noxa illata neruis uox deperdita.	91
Lumbricis uexatus puer quiescere non poterat.	92
+ Mulier ex lapsu urinam continere non poterat.	93
+ Calculus in tunica fellis.	94
Ex præcedentibus torminibus erosi uilli, quibus uis retinendi fulcitur.	95
* Ex iisdem torminibus erosa uiscera.	96
Morbus comitialis.	97
Elephantia.	98
Ex calidiore materia caput impetente furit ac mori- tur puella.	99

Vermis e nare proiectus.	100
Spasmo Cynico mortua mulier.	101
Gelatus.	102
Tensio neruorum ceruicis.	103
Ex abscessu gula hominem penè iugulatum	104
Vitio lienis curatus.	105
Morbo coeliaco curatus.	106
Ex tenuioris intestini morbo sanatus.	107
Morbo uulue inedia liberata est mulier.	108
Aqua inter cutem eliso utero propellitur.	109
Alapa mortuus.	110
Gemini pueri.	111

F I N I S.

ANTONII

BENIVENII DE ABDITIS

nōnullis ac mirandis morborū

& sanationū causis liber.

HIERONYMVS BENIVENIVS

Ioanni Rosato, Medico &

Philosopho, S.



Vm post insperatam aman-
tissimi fratris mortem (qua
propterea quod quicquid
in me fugiētis uitæ ex tam
multis miserijs & languori-

bus supererat, uno illo niteretur, nihil
mihi in terris potuit accidere. grauius)
eius perquàm sanè honestam, & omni
doctrinarum genere locupletem biblio-
thecā euoluerem, incidi in pleraq; eius
ingenij monumenta: quæ ille, ut erat uir
doctrina & ætate prouectior, ac multa-
rum rerum usu & experientia pollens,
eudebat quotidie. Lectitātī igitur ea mi-
hi, ac sapius ob memoriā illius reuol-
uenti, obtulit sese interea libellus quidā,
in quo uir summo & studio & diligētia
præditus, quæcuncq; trigessimū supra ses-

cundū iam annū medēti illi admiratiōe
digna occurrerant, & ex quorū cognitu
usus aliquis posset existere, studiosissi-
mē prout quēq; acciderant scriptitabat.
Delectatus sum, fateor, nouitate ipsa re-
rum, & uarietate lectionis: measq; pa-
tes esse duxi, ea quamlibet impolita, &
quæ tumultuaria quadā, ut uidebant, fe-
stinatione ex tēpore potius effusa, quā
à cura diligentius exarata, iterū autor re-
lecturus esset, utcūq; colligere, & in pu-
blicū dare: ne si qua in his utilitas, poste-
ris inuideret, & unā cū autore periret.
Nam cætera quæ de reliquis Medicinæ
partibus paulò accuratius scribebat, nō
mihi uisa sunt ita maturuisse, quæ in pu-
blicū ueniant. Sed ne hæc quidē quæ de
pluribus mutilis alioquin ac uariè inter-
litis uix eruere potuerim, sine te, hoc est
sine cuiuspiā excellentis ingenij & do-
ctrinæ uiri cōsilio et autoritate publica-
re ausim. Ne mihi indies exprobrent te-
meritatem meā, qui fratris mei, uiri alio-
quin creditissimi, informem abortiuum
pro maturo & undequaq; consummato
foetu

foetu tollens, in patris dedecus & ignominia prodere festinauerim. Feci igitur quod meum erat, quod fraternus postulabat amor, quod publica suadebat utilitas. Verum nisi ad hoc nostrum officium accedat cura & diligentia tua, quibus & errata mea, si qua forte in his colligendis retractandisque admiserim, sedulo dispugas, & fratris festinata celeritate, sicubi opus fuerit, tempestiue matures, feci nihil. Vale.

IOANNES ROSATVS MEDICVS
& Philosophus Hieron. Beniuenio, S.



Egi amantissimi fratris tui libellum de abditis nonnullis ac mirandis morborum & sanationum causis, opus uarium, elegans, eruditum, & ut uno me uerbo expediā, dignum tanto uiro. Magnum profecto detrimentum, magna, ut mihi uidetur, iniuria fieret, cum praesentis, tum futuri seculi hominibus, si tantae utilitatis & eruditionis liber illis inuideretur. Ego quantum ad me attinet, officio functus sum. Reliquum est, ut nunc tandem per te liber ipse prodeat in publicum: ne si domi contineatur diutius, magni criminis reus fias. Vale.

ANTONII

BENIVENII FLORENTINI,

Medici & Philosophi, de abdi

tis nonnullis ac mirandis

morborum & sana

tionum causis

liber.

De morbo, quem uulgo Gallicum uocant. Cap. I.

NOVVM morbigenus,
 anno Salutis nonage-
 simosexto supra mille
 quadringentos à Chri-
 stiana salute, nō solum
 Italiā, sed ferē totam
 Europam irrep̃sit. Hoc ab Hispāniā in-
 cipiēns, per Italiā ipsam primum, tum
 Galliā, cāterasq; Europæ prouīncias
 latē diffusum, mortales quamplurimos
 occupauit. Incipiēbāt enī pustulæ ge-
 nere diuersæ in genitalibus membris, li-
 cet interdum, sed rarenter, in capite: &
 inde per totum corpus diffundebantur.
 Alijs quidem planæ minimæq; extātes,
 sed scabræ tamē in superficie, & colorē
 subalbidae

subalbida: à quibus squamæ resoluebantur, & caro sub his corrofa apparebat. Alijs uariis similes, figura rotundæ: & ab his item squamis leuioribus resolutis prominebat caro rubicundior, ex qua uirulētia foetēs & grauioris odoris profluebat. Nonnulli uerò latioribus corripiebantur pustulis, sed quæ supra cutem non intumescerent, crassiores squamas habentes: ex quibus etiā uirulētia copiosior emanabat, & amotis squamis caro apparebat obscurior ac subliuens, quæ in hulcerata roderetur. Quartū genus erat, quod subalbidis squamis amotis cicatrici simile remaneret, à quo profluens interdum sanguis difficultatē sanationis ostenderet, & similitudine siccam scabiē repræsentaret, cæteris omnino deterius: & licet minus eroderet, serpendo tamen uarijs & intentatis insidebat locis. Hoc autē morbi genus plebem plurimū seruosq; afficiebat, ex nobilioribus uerò paucos. Subsequebantur huiusmodi pustulas, licet etiā interdū præcederent, artículorū dolores,

qui nō minori cruciatu torquerēt, ac se-
nescētibus iam pustulis plurimū inuale-
scerent. Quōd si medicamentis compin-
gentibus intrinsecū quis conaretur ex-
trudere humorem, continuō exorta pu-
stulæ in gula & ore ægrotos malè habe-
bant. Ex quo etiam nonnulli ob incu-
riam medentis, mortem obibāt: aut, qđ
proximum est, erosio faucibus difficilli-
mè sanabātur. Has aut nos impetiginis
esse genera, quas Græci λευχῆνες vocāt,
iudicauimus. Quem etiam morbum Plī-
nius, quōd ex accepto osculo mentū ue-
naretur, mentagram appellauit. Huius
uerō & Celsus quatuor species esse di-
xit, rubricā scilicet & nigrā: tum et quæ
serpēdo procedit, & quæ item bullulas
uaris similes habet. Materiam autem ha-
rum pustularum diuersam quidem, sicuti
& diuersa sunt genera, iudicamus. In-
terdum enim acuta humiditas sanguini
mixta & erodens dominatur. Interdum
crassior, tenuiori parte absumpta, & ad
atrā bilem uersa. Nōnunquā etiam atra
ipsa insurgit bilis, quæ ab acutiori humi-
ditate

ditate non absoluitur, & cutem perforans carnem erodit. Parí quoq; modo exulsi humores ad naturā atræ bilis inclinantes efficiunt; qui si densioribus occurrāt mēbris, quæ perforare nequeāt, figuntur ibidem, & dolores excitant uehementiores donec resoluantur, aut tandem erumpāt in pustulas: quæ etsi alioquin fœdæ & ad sanescendū difficiles, sine ullo tamen dolore, ut atræ bilis natura est, infectos premunt. Ex quo fit, ut qui eiusmodi afficiuntur pustulis, imperitis sese medicis nōnunquam curandos tradant. Quibus ægritudinis huius causas penitus ignorantibus, dum inter mali initia compingentibus unctionibus illis mederi festinant, sæpe eos aut in mortē, aut saltem in deteriorem, uel etiam penitus in insanabilem compellant morbum. Nam cum huic malo causas insint difficiliores, & quæ uix remoueri queant, ut non sine magno labore, ita nec sine diuturnioris tēporis spatío sanescere potest. Quare qui ex his festinam sanitatem quærunt, mortem

plurimum, ut iam dictum est, aut saltem diuturniorem morbum nanciscuntur. Si quis igitur huiusmodi malo vexatus, sibi ipsi citra omne discrimen consulere, ac certam salutem acquirere cupit, his utatur medicamentis atque consilijs, quæ à nobis infra ponentur. Afferunt peritissimi medici, si huiusmodi morbus toto diffundatur corpore, ipsdem medicamentis curationem suscipere, quibus & lepra curatur. Quare cum iudicaueris sanguinem his misceri humoribus, deducique eos cum sanguine posse, optimū præsidium erit sanguinē illico de uena media, quam Nigrā medici uocant, mittere. Contrā uerò si ineptos, & qui cum sanguine minimè fluere possint existimaueris, æquare eos ac deducere medicamento debes. Non inutile tamē erit hircinam, quam sanguisugam uocant, aut cucurbitulas ea parte affigere qua æger magis urgetur. Præsidiū indigentiam indicat, habitus corporis, rubor in loco, tumor uenarum, & si pustulæ sanguinolentæ sunt. Postea uerò ad ea medicamen

dicamenta cōfugiendum, quæ materiæ partē deponāt: quod certè felicius fiet, si aluū duxeris eo medicamēto, quod habet Myrobalanorū omniū partes duas, Radicis barbari partem unam: Agarici, Polypodij, singulorum partem mediā: succi fumi terræ, senæ, et uuæ passæ, singulorum partem quartam. Quæ tuidicula attrita bulliant in aquæ libris sex, donec quarta defecerit pars. Tum decolata comprimantur, & additis mellis libra, scamoneæ unciola, & siliquæ ægyptiacæ uncijis duabus, paruo igne in unam redigantur compositionem. De qua deuoret æger unciolam mediā. Demū aggredi debemus potiones materiam æquantes, ut ex fumo terræ, endiuiā, aceto, saccaro, limonum citrique acidofucco. Aut eam, quæ habet Myrobalanos omnes, fumum terræ, endiuiā, buglossam, melissam, boraginem, uio-
las, absinthium, thamerindum, epithimum, et rosam. Quibus additis succo fumi terræ atq; saccaro, bulliant, & ad positionis formam redigantur, Materia tan-

dem æquata deducat aliū medicamen-
to potentiori, quod deponat humorem
quē excernere uolueris: sicuti sena, po-
lypodio, albo ueratro, lapide stellato,
scammonio, compositione filij Amech,
Inda, et alijs multis quæ doctores extol-
lunt: dummodo non obliuiscaris nutri-
re ea in lactis aqua: quæ siue in potione
siue buccella accipies, optimum & ex-
cellens auxiliū inuenies. Verū quia
humor non una tantum uacuatione se-
cernitur, iteranda sæpius hæc erunt.
Ultimo loco ea sunt aggredienda præsi-
dia, quæ extrinsecus adiuncta etiā con-
ferre possint: ut in crassiori & glutinosa
materia, quæ incidant: in tenuiori, quæ
resoluant: in mediā, quæ utrāque ope-
rationem cōcilient. Mollire interdū &
dolores remittere opportunis præsi-
dijs conuenit. Hoc autem malum tollit aci-
da pars citri, gummi arabicum, gummi
nucis plurimæ, storax liquens, & sina-
pis, si aceto liniant. Salīua quoq; homi-
nis ieiuni, præsertim quæ dētibus inhæ-
rescit, præsentaneū remediū est. Aqua
sulphur

Sulphurea, aqua salita, & maris spuma, succus psillij, oleū ex frumēto & ex uio-
lis, storax, et pix armoniacus, helleborū
gūmi rutæ, litargiriū, tutia, resina pini,
spuma argenti, & cerussa. Serapion autē
nitri partes duodecim, sulphuris partes
xiiij. excipiebat resina copiosa, eaq; ute-
batur. Alij minio sinopio cerā & oleū
ex rosa addunt, & eo inungūt. Nonnulli
uero resinā terebinthinā, argentū ui-
uum, masticem, litargiriū, cerussam thy-
miamaq; excipiunt myrtino oleo, atq;
larido: & eo inungētes sudare ægros co-
gunt. Nec postremò defunt qui fatean-
tur se ex solo potu medicamēti, quod ha-
bet laccam lotam, aloēn ac myrti co-
ctionem, ex eiusmodi ægritudine sanos
euasisse.

Vermis uomitu proiectus.

II.

IOannes quidam faber lignarius, an-
num agens quadragesimū, cū à cor-
dis dolore ferè ppetuo duobus iam an-
nis grauius urgeretur, ac ppterea quòd
eo sapius in mortis discrimen adductus
fuerat, peritissimos quosq; nostri seculi

NE. *Considerem
morb.*

medicos, sed frustra, cōsulisset: tandem
ad nos uenit oratū, ut si quo modo pos-
sem, tanto malo succurrerem. Mouit
me fateor cum res ipsa, quæ satis per se
miranda uidebatur: tum uel maximè ui-
ri lachrymæ, ac nimium miserabilis ob-
secratio. Cœpi itaq; mecum cogitare an
id forte ex malo habitu uentriculi, seu
cordis, siue ille calidus frigidus ue esset,
an siccus, simplex aut mixtus. Sed horū
nullus certis indicijis ostēdebatur. Cor-
dis enim natura nobilis præstansq; tan-
to tempore huiuscemodī iniuriā non
tolerasset: Cum nullum ægritudinis ge-
nus imprimi in corde possit, quin homi-
nem ad festinam mortem deducat. Opi-
nanti igitur mihi malignam aliquam &
noxiam materiam in uentriculo detine-
ri: quæ, quod uicinus locus sit cordi, ad
eius ceruicē ascendens hominē afflicta-
ret, uisum est eam quoquo modo pro-
pellere. Quare medicamento uomitio-
nem fieri iubeo. Eo etsi corrupta ac pu-
treus materia expellitur, nō tamen do-
lor remittit. Consulo igitur ut iterū uo-
mitum

mitū experiatur:quem nihilofecius una
intermiſſa diecula ualidiorem exhibeo.
Expulſaꝑ eo eſt craſſior pituita, & cum
ea uermis longitudinis digitorum qua-
tuor ſatis plenior, capite rubro, leui, ro-
tundoꝑ, quod piſi magnitudinē nō ex-
cederet: cætero corpore lanugine qua-
dam contecto, cauda furcata ad ſimilitu-
dinem nouæ lunæ: pedibus nixus qua-
tuor, duobus in dexterioſem, totidē in
ſiniſterioſem partem coaptatis. Admi-
ratus uermis formam medicis eruditio-
ribus oſtendo. Nullū inuenio qui mon-
ſtrum ſimile uidiſſe ſe unquam fateret̃.
Aderat tamen ſenior quidam, ſed medi-
cæ artis imperitus: qui teſtatus eſt ſimi-
lem ſe uidiſſe uermem uomitu quoque
propulſum ab Alexandro quodam co-
nobita: qui ſtatim, ut ille aiebat, proie-
cto eo, mortuus eſt. Vocitabat aut̃ hoc
monſtrum cordis uermem. At contrā
æger ille noſter ut primum uermem ip-
ſum euomuit, ad priſtinam reuerſus eſt
ſanitatem.

Lapides in tunica hepatis reperti. III.

Mulier quædam nobilis dolore exorto circa iecinoris partes cū diu multumq; angereſ, ac propterea quā plurimos medicos conſuluiffet, effugeret tamen id malum nullo præſidio poterat. Quare opem noſtram unā cum alijs experiri placuit. Cōuenimus igitur plures medici, & quænā eſſent huius morbi abditiæ cauſæ hinc inde plurimo ſermone diſcuſſimus. Verū ut contingere in rebus dubijs plerunq; ſolet, ſententia non cōuenimus. Cū pars iecinoris abſceſſum, pars malum habitum iudicaſſet: nos uerò uitiū in membrana contegente ineſſe credebamus. At illa cū inualeſcente morbo paucis poſt diebus, ut nos etiam ex certis indicijs pari conſenſu prædixeramus, è uita migraret, mortuæ corpus incidendum curauimus. Et inuentæ ſunt in iecinoris membranulæ parte decliuiori congeſti lapilli figura & colore diuerſi. Alij enim rotundi, alij angulares, quadrati alij, prout poſitura & caſus effecerat, maculis etiā rubeis,

rubeis, cœruleis albisq; distincti. Hi sua gravitate ex tunica sacculum longitudine palmi, latitudine uerò duorum digitorum effecerant. Hanc autē nos mortis causam arbitrati, disputare de obscuris uanum & inutile iudicauimus.

Fluxus sanguinis ex poro. IIII.

NOuī hominem robustum admodum, qui trigesimum & sextum agens annum, saepe mecum conquestus est de certo sanguinis fluxu, quo singulo quoque mense grauiter affligeretur. Interroganti mihi qua parte corporis flueret, id se nescire respondit. Admiratus hominis uerbū, detege, inquam, locum unde fluat. Deposito pallio ilia dextra ostētat, ubi subiacet iecoris pars ima. Diligenter locum oculis lustro, si foramen aut cicatrix in parte sit: omnia æquabiliter posita, lenem et mollem carnem, nullam asperitudinē cicatricis uenotā inspicio. Ab homine decipi suspicor. Quod ille aduertēs, paucis, inquit, diebus hunc tibi scrupulum demam. Instat enim tempus quo sanguis fluere

confuevit. Reuersus perendie uno superposito digito locum fluxus contegebat: quo amoto, non secus emanauit sanguis, ac si ex incisa uena proflueret. Nec prius fluor ille cessabat quàm sanguinis libra emitteretur. Quo euacuato nullus discernere poterat, unde euacuatio facta esset. Existimaui uenulam foraminibus cutis sua ceruice inhærescere, indeq; statò tempore sanguinẽ euacuari. Curaui igitur hominem sola sanguinis missione ex uena iecoris singulo quoq; mense. Curiosoq; uictu iniuncto, protracta cura est ad sextum usq; mensem, & tandem conualuit.

De uena umbilici, & ex uulua prolapsa intestina. V.

Mulierem uidimus sexagenariã, cuius intestina ex uena umbilici subito prolapsa sunt, nullo præsidio conferente tertía die uitam finisse. Vidimus & aliam, de cuius uulua pariter disrupta intestina omnia profluxerãt, paucis item diebus occubuisse. Insuper & tertiã nouimus, cuius intestina, perfracta eorum tunica, à summa umbilici
cute

cute tanquā in sacco dependebant inuoluam. Hæc autem miseram quidem, sed tamen longiorem uitam ducens, unā cum hoc malo consenuit.

Umbilicus prominens.

VI.

Commune omnibus, umbilicū ad decorē prominere. Monstruosum, si promineat ultrā quā decens sit. Ioannes Bīnus filium habuit octimestrē, cuius umbilicus digitis quatuor excreuerat ad penis similitudinem. Coles em̄ testiculorū tunica iunctus uidebatur: à quo etiam spiritus erumpebat interdū. Hūc cū plures medici inuississent, & ex his alij intestinū eò erupisse iudicarent, alij omentum, alij humorem, nos carnē in loco increuisse dicebamus. Cui sententiæ cum pater inhæsisset, puerum curare cœpi. Sed quod autoritate eorum mouebar, qui propter spiritū quem inde erumpere interdum diximus, intestinum illud esse dicebāt, resecandāne mihi esset caro illa, & idipsum ferro ne an igne potius faciendum, plurimum ad dubitabā. Verum certa tandem ratione

subnixus uincire carnē decerno: singulisq; diebus arctius deligans non prius desisto, quàm ea ipsa præmorta penitus exciderit, ac puer subinde integram ualeitudinem recuperauerit.

Ex ano euacuata urina.

VII.

Q Vis mireſ si audierit quod & nos uidimus, puerum ſcilicet duodecimū agentem annū, cum urinam ſeptimo iam die non redderet, propterea quòd concretum quid ex pītuita & ſanguine, urinæ ipſius canaliculos obſtruxerat, eam tandem ex ano euacuaſſe? Præſertim ſi nouerit & ueſicā ipſam ceruicemq; eius minimè foraminulentam aut fungoſam exiſtere: & inteſtinū qd penetrari debuīt, ſolidæ & cōcretę eſſe naturæ, ut decet tunicas om̄es quæ neruoſæ ſunt. Oportuit em̄ aut inciſam ueſicam inteſtinumq; quod citra mortem fieri nequit, aut naturam cui impoſſibile nihil eſt, huiuſcemodi aperuiſſe uias: ut inde urinam redderet, puerumq; ſeruariet. Nouimus em̄ miranda eius opera: nam & purulentū quid etiā oſſi ſubſi-

dens

dens extrinsecus trudit, & hominē cerat
tis indicijs moriturū sæpius liberat. Vnde
& militem uidimus, cui illatū uulnus
in coxam, uesicæ ceruicem inciderit: ac
subinde incuria medici adeò cōglutinaa
tum obcalluit, ut penitus iter urinæ ob
struxerit: sed ea nihil osecius carne pau
latim erosa, coxa altera extrinsecus eru
pīt. Indeꝑꝫ quoad uir ille uixit, ritè pro
fluens reddita est. Sed Pauli Bonini fi
lium nouimus, qui glande colis clausa
natus, paulò infra eam itinere patefacto
urinam reddebat.

Mulier à spiritu malo oppressa. . VIII.

Accidit his tēporibus nouū & ad
mirandū morbi genus: qđ etsi ui
derim curauerimꝫ, scribere tamē uix au
sim. Mulier sextumdecimū agens annū
ab ima uētris parte dolore exorto, cōuel
lere manibus nitebat̃. Cumꝫ in horren
dum clamorē erumperet, intumescibat
illico totus uēter, adeò ut uterū gestare
crederes octīmensē: & uoce exhausta
ubi toto cubili hinc inde reiectās sese, et
plantas pedū interdū ceruici connectēs

resiliebat in pedes, iterū pcidēs ac resili-
ens: isthuc ipsum idētidē factitabat quo-
ad paulatim ad se reuersa quoquo modo
recrearet. Interrogata quid egisset, peni-
tus ignorabat. Nos uerò eiusmodi mor-
bi causas disquirentes, arbitrati sumus
hoc malum ex uulua ascensu & uapori-
bus malis sursum elatis, ac subinde cor
& cerebrum impetentibus prouenire.
Quare idoneis medicamentis adhibitis,
cum nihil omnino profecissent, non pa-
rum mirati sumus. A recta tamen uia mi-
nimè desistendum putauimus, donec fe-
rocior facta ac toruis oculis circūspiciēs
tandē prorupit in uomitū, quo lōgiore
& recuruos clauos æneas que acus unā
cum cera et capillis in globū mixtis euo-
muit: & nouissime ientaculi frustū tan-
tæ magnitudinis, ut deuorare integrum
nullus potuisset. Cumq; idipsum sæpius
etiā uidēte me factitasset, teneri eam ar-
bitratus sum spiritu malo, qui dum hæc
ageret, spectantium oculos perfringeret.
Quare spiritalibus medicis cōmen-
data, manifestioribus dein signis & ar-
gumen-

gumētis rem comprobauit. Nam et nos sæpe eam uaticinātem audiuius: & ea præterea agentē uidimus, quæ omnem uim morbi supergressa, humanū etiam captum excederent.

Sanatum genu miraculo euidenti.

IX.

R Obertus Saluiatus Bernardi filius & diui Dominici fratrum consortio iunctus, dum in monasterio sancti Marci Florentinæ ciuitatis uitam degeret, geniculi dexterioris abscessu grauiter affligebat. Quare me familiari medico accersito, malum ostendit. Intumuerat enim genu, tantumq; eleuabatur, ut humani capitis magnitudinē æquaret. Notæ pituitosum & uapore plenum ostendebant. Hic chirurgica manu curatus, bis iam sanitatem fuerat consequutus. Reuertebatur tamen id malū priore peius. Quare iudicauimus huiusce modi ægritudinē ubi iam inueterasset, nullo modo citra uestionem finiri posse. Territus ille iudicio nostro, ac propterea medicæ artis spe deposita, ad diuinū confugit auxilium. Erat eo tempore in

codē monasterio uir simplex & bonus,
fide et charitate pollēs, Dominicus Pi-
sciæ oppido ortus, et eiusdem religionis
professor: per quem Deus plurima iam
signa fecerat. Hūc igitur Robertus ipse
conueniens miserabilibus primū lachry-
mis & precibus orat, ut sese suis apud
deum orationibus liberet: quod cū ille
pro sola humilitate abnueret, instat ite-
rum Robertus: nec prius à lachrymis
& importunitate desistit, q̃ Dei hominē
flectit atq; exorat. Celebratis itaque ex
more ac peractis missarū solennibus, cū
ad Robertum ipsum qui solus celebra-
ti illi ministrauerat, cōuersus fuisset, ge-
niculū detegit: & signo Crucis sup ma-
num impresso, fiat, inquit, tibi secundū
fidem tuam. Quibus uerbis omnis pror-
sus intra pauculos dies delituit ægritu-
do. Quod & nos nō solum uidimus, sed
& proprijs (ut aiunt) manibus attrectan-
tes, geniculum ipsum detumefactum ac
penitus sanescēs inuenimus. Et ne quis
nō omnino uirtute diuina factū putet,
hic septimus iam est annus ex quo ille sa-
nitatem

nitatem adeptus, eam seruauit & seruat
ope & auxilio illius, qui solus omnia po
tens, uiuit & regnat in secula.

Miraculo liberatus. X.

IVuenis quidā Florentinus nomine
Gaspar, dum circa præcordia sagitta
uulneratus spiculū educere nititur, reli
cto mucrone arundinem tantū euellit.
Quē cum chirurgici, omī licet ingenio,
omniq; præsidio nixi, auellere minimē
potuerint (in intima em̄ costa adeò inse
derat ut reuelli nullo auxilio posset, nisi
costa ipsa perfracta, & uulnere amplio
ri factō) mortem potius quamlibet mise
rabilē, quā tale genus curationis sub
ire malebat. Quare tandē in desperatio
nem uersus, laqueo suspēdere se, aut pro
fluētī Arno, uel alto puteo præcipitem
dare cogitabat: quod & fecisset, nisi assi
stētes amici illū diligentissimē custodis
sent. Inter quos erat uir qdā Marioctus
nomīe, fide & pbitate pollēs: hic homi
nem iugiter deprecabāt, ut desperatiōe
reiecta, in manus potius Dei, à quo est
oīs salus, tā grāde malū tradere conarēt.

Huius tandem precibus flexus Gaspar totus ad Deū conuertit̃, non die, nō nocte ab oratione cessans ; donec in uaticinium prorumpens, nonnullos interim, qui ad eum uisendi gratia accederent, dum adhuc procul essent, paulopost ad futuros prædiceret. Quinetiā & ignotum quemlibet proprio quoq; nomine citans, admonebat astantes omnes ut Deum timerent, & de salute sua considerent. Se enim non modò de ea, deq; die & hora qua illam consequi deberet, certiolem factū esse, sed multa præter ea eodem lumine præuidisse aiebat : ut professionem suam Romam & mortē, exilium Petri Medicis & fugam, ciuitatis nostræ Florentiæ angustias & calamitates, Italiæ subuersionē, & alia quā plurima : quæ breuitatis causa silentio præterimus : quæ'que ferè omnia magna ex parte iam impleta uidemus. Nam & quæ prædixerat die atque hora mucro ipse ex uulnere sponte sua profiliit : quo eiectione etiā uaticinari destitit, & Romā tandē peregre proficiscēs mortuus est.

Mulier

Mulier uulua carens uixit annis decem. XI.

Ingeniosus nostri seculi medicus Volginus Pisanus me licet iuniorē aduocandum censuit: ut unā cum illo mulierem quandā curaremus, quæ uulvæ pernicioso hulcere uexabat. Huius nos malitiā omni studio, & diligentia tollere, sed frustra, conati sumus: nam corrupta interim uulua, & frustulis comminuta descendens, non prius fluere destitit quàm tota putrescēs decideret: ac sic mulierem ingenti malo liberauit, quæ licet uulua carens, sana tamen superuixit annos decem.

Aqua inter cutem. XII.

Aqua inter cutem cū uehementius urgeretur puer: tantāq; intus contracta esset, ut alium nullam in partem mouere posset, omni auxilio medicorū destitutus, temerariam sibi libertatē uendicauit. Quare aqua quantum poterat epota, in ultimum sese mortis discrimen malè sanus præcipitauit. Verum siue id aquæ contractæ impulsu, siue opē naturæ factū sit, soluta est umbilici unitas;

indeq; tãto impetu aqua pfluere cœpit,
ut supra uentrẽ cubitos tres ascenderet.
Quo sane uitã finisset, nisi circũ assisten
tes opposita manu aquã fluere non pmĩ
sissent. Hinc medico accersito, & aqua
paulatim educta, ac curioso uictu & cæ
teris quæ ad rẽ facerẽt iniũctis, breui tẽ
pore in pristinã redactus est ad sanitatẽ.

*Rusticus per annum nihil bibens, ab aqua in
ter cutem liberatur.* XIII.

Rustico, quẽ aqua inter cutem ma
lẽ habebat, opem nostrã expostu
lanti, sanari illum cum iam morbus in
ueterasset, minimẽ posse respõdi. Instan
ti tamen ut aliquod saltem consiliũ ei
præberemus, subridens inquam, amice
si curari desideras, opus est ut non ultra
bibas quàm ut uitã sustineas. Discessit:
& anno peractõ iterũ interrogat an ip
sum nouerim. Nego me hominẽ nosse.
At ille, tua ope curatus, inquit, ad te re
uertor, scire cupiẽs an adhuc mihi liceat
aliquid bibere: cum hactenus per an
num nihil biberim. Admiratus interro
go quare, & cuius cõsilio. Cui ille, tuo,
inquit:

Inquit: & rem omnem ab initio narrat. Iussi igitur paulatim uino assuescere: sed mero potius quam lymphato, & eo ipso austero ac tenuissimo. Discessit: et curiosa potione usus, ad pristinumque reuersus statum, quam mecum familiaritatem primum contraxit, eam adhuc in hanc usque diem officiosissime seruat & colit.

Struma ingētis magnitudinis & ponderis. XIIII.

Mulierē Oliuā nomīe, struma coxæ innata multos annos miserabiliter uexabat. Ad eam enim iam magnitudinē excreuerat, ut occupāte ea coxā ipsam ac crus, ambulare non posset. Quo factū ut iam quinquēnio misera in lecto iaceret. Nec ex medicis ullus inueniebatur, qui aut ferro aut alio quouis medicamēto tollere tam ingēs malū auderet. Quare omni spe destituta, me cum iunior adhuc essem, ad se uocās, operā nostram deposcit. Lachrymis urget & precibus, ut quālibet miserabile, aliquod tamen ei præsidiū afferam: mori se malle quā in tanta miseria & calamitate uitā ducere. Mouerunt me, fateor, infelicis

muleris lachrymæ; ac propterea rem sanè arduam, & quam nullus qui saperet attentasset, aggressus, strumā ipsam ea potissimū parte, qua coxa pēdebat, uínculo deligo. Et quoniā ressecanda crassitudo palmo plenior erat, singulis quibusq; diebus uínculū ipsum arctius necō, donec pars mediā ressecaretur. Tū candēti ferro quod superest scindo; sanguinem supprimo, & mulierē ferē mortuam resumēs molli cubiculo recreo; ac curiosa dein obseruatīōe, idoneisq; medicamentis rite procedēs, diuino tandē auxilio eam in pristinā sanitatē reduco. Tanta autē fuit præcisæ carnis moles, ut pondus sexaginta librarū excederet.

*Ex frigidissimo emplastro stomacho ad-
moto mors subsecuta.*

XV.

NOui medicū, qui uel incuria, uel magis ut arbitror inscitia, emplastrum frigidissimū stomacho cuiusdam uiri, dum illū uentriculī dolor satis mordax urgeret, superposuit. Putabat em̄ hoc auxilio dolorem ipsum tolli posse. Verū ille dolore ferē amoto, grauem
tamen

tamen noxam percipiens, redeuntí me-
dico exponit dolorem quidē remissum,
se tamen inspirandi difficultate uexari.
Quod inscius medicus paruifaciēs iterū
emplastrum admouit: & ne tollatur etiā
iubet. At æger, dum assistētes imperata
faciunt, paucis interim horis singultu
premit: quo grauius grauiusq; hominē
afflictante, inhorrescūt illi membra: ex
quo etiā paucis interceptis diebus mors
subsequuta est: quam medici omnes ex
incusso stomacho frigore prouenisse iu-
dicauerunt. Ignorabat enim bonus ille
medicus, nullum princeps aut principí
subseruiēs membrum solis frigidis esse
curandum.

Ex frigidissimo aquæ potu uir interimitur. XVI.

ANtonius Parmensis iuuenis ad-
modum robustus cum sub feruen-
tissimo sole, & magni æstus tempesta-
te pluribus diebus in itinere fuisset, ar-
dentissima tandem feбри correptus est:
quare cum uehemens eum sitis urgeret,
frigidissima aqua epota intra paucas ho-
ras mortuus est.

Defectio ex frigidissimi uini haustu. XVII.

BLasius Senensis familiaris noster & condiscipulus, dum lōgiusculo tempore sub ardētissimo sole pilæ ludo incaluisse, nec sudore adhuc aut fatione remissis in subterraneū locū, ubi uinaria erat cellula, descendisset, frigidissimi uini calicē haurit: quo epoto statim deficit: indeq; ut erat ferè præmortuus ad cubile delatus, ac calidis utcūq; fomētis, sed non sine graui noxa tandē licet ægrè refocillatus, conualuit. Frigidissima em̄ potio altius cordi insederat.

Erosum capitis os.

XVIII.

Quidam monachus ordinis beati Augustini ex his quos canonicos regulares uocāt, dum in monasterio diui Donati, quod urbi nostræ prominēs Scopetū dicūt, uitā ageret, semel mecū conquestus est, affirmās capitis eius os paulatim indies erosum iri: qđ miratus, caput detego, manu diligentius controcto, frontē ferè totam ossē denudatā inuenio: & quod maius est, nullā in cute
summa,

summa, nullam in carne noxam aduersus rei causam queritans, iudico acutissimo humore hoc fieri, qui foraminulenta carne demissus nullam in ea uim faceret. Os uerò, quod densius ac propterea magis obsistens eroderet, non secus ac fulgur, quod aurum illæsis interim loculis nonnunquam liquare solet. At monachus ille cum maior iam ossis ipsius pars esset erosa, & nullo proficeret auxilio, paucis annis uitam finiuit.

Lapis ex intestinis eiectus. XIX.

MAriottus Palla pharmacopola cum intestinorum dolore uexaretur, eiusque uenter nihil ferere & id quidem ægrè atque liquatum redderet, pluribusque hominem medicamentis aluum ducen-
tibus & clysteribus curassent medici, & morbus nihilominus inualesceret, ad aliud auxilij genus conuersi, totam ipsius aluum humidis fomentis emolliunt: nec prius ab incepto desistunt, quam ille sic fœtus lapidē instar columbini oui aluo proijcit. Qui quidē lapis intestino subsistens, & iter magna ex parte obstruens.

licet ideo deduci non posset quòd intestino tunicisq; eius deligatus esset, uel qd' ipsius crassioris intestini aliqua fortè inhæresceret cellula, medicamentorum tamen præsidij & expultrice adiuuante uirtute tandem propulsus est.

Acra acus perforato stomacho extrinsecus truditur.

XX.

Deuorauerat mulier quædam æneam acum, & nulla inde noxa percepta, integrum annum ita ut erat, sana permansit. Quo peracto cœpit dolor satis acutus mulierem ipsam circa uentriculum urgere: qui dum eam magis magisque indies affligeret, plures consuluit medicos: nihil tamen de deuorata acu, quam penitus obliuioni tradiderat, referens. Variæ fuerunt hinc inde sententiæ. Alij enim ab acutiori humore, alij à ueto inter tunicas stomachi recluso, cæteri uero ex malo habitu excitari hoc malum putabant. Cumq; omni quo poterat studio & diligentia curata, sanitatem nullo modo consequi posset, medicæ artis spe deposita, tolerare id malum
fatius

satiſ duxit, q̃ perpetuis medicamentis inaniter uexari. Sicq̃ annis iam decē tali urgente dolore, miſeram uitam trahebatur, cum ecce acus illa terebrato uentriculo è paruo demiffa foramine proſiliit. Nos autem & acum uidimus, & mulierem curauimus: quæ paucis poſt diebus unitate uulneris facta, in priſtinam ſanſtatem reſtituta eſt.

Ob incuriam à lepra liberatus. XXI.

M Emini Onofrium Tedaldū pro mortuo à medicis derelictum incidiſſe in manus noſtras, non quidē ut curaretur (id enim factu impoſſibile uidebatur) ſed ut ſatis amicorū opinio ni & agro ipſi fieret. Lepra hominem malè habebat: & febrícula inſuper urgebat. Quam, quòd ſolitas animalis partibus occupās quaſi habitū inducat, Græci ἐθικὴν uocant. Tantumq̃ inhæſerat ſolidis membrīs hæc febrícula, ut macie & tabe conſumpta carne, nihil niſi pel- lis & oſſa ſuper-eſſent. Quin et in neruis crurium tanta item cōtractio facta erat, ut calces natibus inhæreſcētes extendi

nullo modo possent. Indulgēs itaq; ho-
 minjs uoluntati, permitto ut omnibus
 omissis legibus suo arbitrio uiuat. Ad-
 uentāte igitur uere cū iam nux plurima
 tenuiori cortice uestiretur, his uesci cœ-
 pit. Et cum omne aliud cibi genus fasti-
 dīret, non una alterāue cōtentus, etiam
 supra centū singulis diebus comedebat,
 pane licet modico adiecto. Quo factum
 ut & uenter fluere cœperit, & stomas-
 chus nihil continere: sic'que frustula in-
 tegra deijci, ut concoctio nulla in eis ap-
 pareret. Hoc itaq; incurioso & licentio-
 ri uictu usus, ad æstatem usq; processit.
 Quo tempore citrullos, angurias, pepo-
 nesq; comedēs, nullū præterea cibi ge-
 nus deuorabat: sed & ea cruda & inco-
 cta omnia deijciebat. Peracta autē iam
 ferè æstate refici cœpit, & corpus quo-
 quo modo resumptum ad habitum suū
 reuertitur, quoad sicco & calido morbo
 humidis & frigidis præsidijs superato,
 quem ratio & diligētia curare nō pote-
 rat, incuria & temeritas ad pristinā redi-
 geret sanitatē. Qua biēnio feliciter usus,
 incurio

incurioso postmodū uictu, & inutili libertate in eundem recidit morbu. Quod demum absumptus, paucos post annos è uita decessit.

Hulcus menti sanatum dentis euulsione. XXXII.

IVuenis quidā Angenius nomīe, annis iam tribus mentī hulcere uexabatur: qui licet opera complurium medicorum usus fuisset, tantum abfuit, ut non deprehendentibus illis morbi causam sanitatem cōsequi potuerit, ut penè omnē recuperandæ uoletudinis spem amiserit: dum scilicet ex his nōnulli, quòd altum & callosum hulcus uiderent, citra uestionem nequaquā tolli posse affirmarent. Atq; item alij, quia callosa haberet ora, Chironeum hulcus crederent, & ob id curatu difficilimum arbitrarentur. Nos uero ut primū hominē uidimus, & hulcus cōspicati sumus, nullis id malū medicamētis uinci posse prædiximus: nisi eo prius eruto dēte, ad cuius radicem hulcus ipsum ascēderet. Id quod res planè indicauit: nā dente ipso euulso, erosam eius radicem cernimus, unde scilicet ma

lum illud, fomentum ac pabulum capiebat. Quo sublato, nō multis pōst diebus etiam domesticis medicamentis sanatū est hulus.

Attoniti fulmine. XXIII.

ATtonitos fulmine patrem & filiū uidimus, quorum corpus & mens stupore quodam tenebātur, adeò ut dissolutione neruorū, quā Græci ἀπ'πληξίῳ uocant, affici eos crederem. Cumq; ad septimū usq; diem ferè absq; cibo & potu, quinetiam muti & sine sensu uitā miseram traherent, ex uena demum, quam medici Nigram uocant, sanguis emittitur, aluus ducitur, corpus plurimis frictionibus distringitur, ac tenuissimis interim cibis utcunq; alitur, donec paulatim resecti ad pristinam tandem sanitatem reuersi sunt.

Lapis tussicula expulsus. XXIII.

HEnricus quidam Alemanus cū laterum doloribus triennio iam uexaret, & ob id opera & cōsilio multorū interim medicorum, sed frustra, usus fuisset, ad nos tandē uenit oratū, ut si quo modo

modo possem, laboranti illi opem ferrē. Interrogo igitur hominē an initium morbi causam uel teneret, utrum scilicet ex frigore, uel ex ictu aliquo, aut nimio cursu, uel distillatione à capite, siue etiam ex præcedente aliqua alia ægritudine hoc illi cōtigerit. Respondit se nullam procatarticam scire causam, sed tantum ex occulto initio paulatim increuisse morbum illum, adeoque auctū ut eum ad mortem duceret. Anxius igitur & tanti doloris causam minimè deprehendēs, nesciebam quò me uerterē. Neque enim uisus uel materiei, uel malī habitus erāt indicia, cum tussicula quædam sicca hominem urgeret, neque item excrementa aliqua uidebantur. Et medicamēta etiam, quibus curatus fuerat, intentiones ferè omnes euacuauerant. Quare autorū tandem sententijs nixus, quibus doceat medicus, cum causæ morbi abdite sunt, his præsidijs uti, quæ conferre quidem possint, nocere non possint: cœpi primum lenire pectus, mollire guttur et asperam arteriā, donec calculo ad auellana mae-

gnitudinē de pectore propulso, & sicca illa tussicula, & omnis præterea dolor amotus est.

XXV.

Magna suræ ossis parte resecata, puella conualuit.

Hieronymi Corbinelli filia octauū agens annū elephantico morbo affecta est, ita ut & suræ os uitiari cœperit. Sūma enim cutis maculas crebrosque tumores habebat, & rubor paulatim in atrum eleuari ac conuerti cœperat, adēd ut faciliē iudicares uitiū in osse cōsurgere; præsertim quodd & ingēti dolore afficeretur, & nullū in carne puris signum appareret. Quare soluto uentre & sanguine cucurbitulis misso, detegere os decernimus: quo detecto, quicquid putrēs & cariosum inerat abscindimus. Sicq; magna ossis parte resecata, puella (quod multis impossibile uidebat) tandem rite curata conualuit.

Sagitta carminibus euulsa.

XXVI.

Nihil tam faciliē in corpore q̃ sagitta conditur, & eadē sapius altissimē: qd' & in milite uidimus, cui telū dextra parte pectoris illatū, sinistrae scapule ossi

læ ossi usque adeo inhæsit, ut & multi mucronē euellere frustra conati sint. Nam redire tam lōgo spacio minimè poterat absq; carnis & uenarum neruorumq; laniatione, propterea quod utrinq; spicula ipsum cingerent; nec etiā cōtrā carne incisa euelli telū poterat, cum os scapulæ, cui infederat, magnū amplumq; obstaret. Quare medicæ artis præsidio destitutus, cū id citra mortis periculum fieri nō posset, aduocat ariolū: qui duobus digitis plagæ superpositis, & carminibus nescio quibus insusurratis, telū ex osse redire iubet: quo etsi absq; ægri corporis noxa, non tamen sine utriusq; animæ dispēdio obtēperante, miles ille paucis post diebus ritè curatus cōualuit.

Hulceratæ nares.

XXVII.

HUlcerari nares intus cōsueuerūt, eiq; malo uix succurri potest, cum inueterascit. Mihi nubilis puella nobilisq; ostenditur, quæ eiusmodi morbo diu tenebatur: nec inuentus est medicus, licet plurimī puellam curandam suscepissent, qui id malū tollere potuisset.

Erant enim hulcera circa nares crustis pluribus fœda: è quibus etiã malus con- surgebat odor, quod genus Græci ὀζῶνα vocant. Curam itaq;, orâte patre, qui unicè filiã diligebat, aggredior, his auxilijs fretus, quæ ad hunc morbũ conducibilia uisa sunt. Primò igitur aluũ duco, humores æquo, & cucurbitulis scapulís affixis, carneq; ferro incisa sanguinem mitto. Tum & frictionibus diuertētibus usus, nares calida aqua spongia expressa cõfoueo: deinde cerussam & argenti spumam oleo myrtino & omphacino excipiens, ad crassitudinẽ mellis reduco, eocq; illiniri nares sæpius iubeo, quo auxilio crustis om̃ibus excisis, cerussa demum, olibano, cadmía, syllicq; interiori parte diligēter attritis & melle addito medicamentum conficio, quo specillum lana obuolutum intingēs huleribus admouebam: & his repletis linamentum, eo quoque medicamento illitum demittebã in nares. Idq; bis die uel ter faciendum curabam: quoad his præsidijs & auxilijs malo, qd' plurimos medicos.

medicos diu multumq; frustra fatigaue-
rat, paucis etiam mensibus sublato, puel-
lam pristinae reddidimus sanitati.

Naturalia clausa incisione curantur. XXVIII.

Naturalia foeminarum interdum clau-
di certum est. Id autem aut proxi-
mus in utero matris fit, aut h ulceratione
illarum partium: dum scilicet ex incuria
medici sanescendo oris inter sese cōglu-
tinatis iunguntur. Incidit in manus nos-
tras puella quaedam iam matura uiro,
iam plenis nubilis annis, cui naturalia
ipsa clauderent. Quae cum ego huiusce
modi malum curaturus inspicio, uideo
membranulam quandam, quae ipsius
uulvae ori opponeretur. Quare duabus
lineis inter sese transuersis eam incido:
statimq; tanta ac tam ingenti impetu ni-
grior materia profluxit, ut grande lu-
men, quod tunc minister admouerat, ex-
tinxerit. Menses enim praeteriti intus te-
nebantur: qui & dolores etiam singulis
mensibus excitarent. Incisa itaq; mem-
branula ipsa, quicquid ex ea intus super-
fuit, hamo apprehendo amputoq;. Tum

reliquū curæ ex aliorum hulcerum more prosequutus, haud multis post diebus puellam ipsam sanam, ac coniugio aptam relinquo.

Emortuus foetus unco extrahitur. XXXIX.

MAturo partu intus emortuo periclitabatur uxor pistoris mei, quare euocatum me rogat, ut deficienti illi quoquo modo opem feram. Ego uerò reputās huiusmodi curationē inter difficillimas annumerari, & summam prudentiā ac moderationē desiderare (præsertim & quòd ita foetus transuersus iaceret, ut ne manu quidem intra uulvam iniecta dirigi in caput aut in pedes posset, & quòd imus uēter iam frigesceret) de salute eius dubitare cœpi. Verū hortante me coniuge ac cæteris assistentibus, ut nullum intentatum relinquerem auxilium, uncum uertebri dorsi infantis injiciens paulatim extrahere nitor. Sed obstabat oris uulvæ compressio, & ceruix toto corpore replicata augebat extractionis difficultatē. Quare calido oleo naturalia foueo, quo paulatim hiantem uul-

te uulua foetum educo. Mulieremq; ferè mortuam molli cubili recreo, & opportunis demum praesidijs curatam pristinae sanitati restituo.

Natus ano clauso.

XXX.

VIdimus duos pueros ab utero matris natos naturalibus clausis: horum alteri caro quaedam in ano altius increuerat, adeò ut intestini exitus percipi nullo modo posset, quo factum ut paucis diebus uitam finierit. Alteri uerò membrana quaedam ipsius tantum ani ori opposebatur: sed ea acutiori scalpro praecisa, statim sanatus est puer.

Naturalia erosa & clausa.

XXXI.

Mulierem etiam uidimus, cui morbus quem uulgo Gallicum appellant, totam uuluam eroderat, et incuria medici quicquid erosum fuerat, oris inuicem iunctis obcalluit. Indeque sola urina, & ea ex paruo quidam foramine reddebatur. Huic nos (propterea quod callus ipse altior esset, quam ut citra mortis discrimen incidere posse extimaremus) consulimus ut

incurata potius uiuere, quàm tãto se periculo exponere uellet.

Intestino tenuiori clauso uita finitur. XXXII.

S Tomacho longa & plura uitia cum Sex alijs mēbris, tum humoribus sibi innatis accidere consueuerūt. Vnde & nos uirū nouimus quinquagenariū, qui ex praterita ægritudine, quam χόλερα Græci uocant, in qua simul & deiectio & uomitus accidūt, intestinaq; torquentur, & bilis atra supra infraq; erumpit, in perpetuum, & ut experientia docuit, penitus insanabilem inciderat uomitū: unde & stomachus paucis admodum horis cibum cōtinebat, & alius præterea nihil omnino reddebat, siue his leuibus siue etiam acris medicamentis urgeretur. Assumebat enim cibos leuiiores, & ad concoquendum faciles: quos ubi aliquot horas continuerat, quicquid ex his supererat euomebat. Alebatur autē parte tenuiori, quam uenæ à uentriculo attrahebāt: sicq; miseram quidem, sed tamen longiusculam uitam duxit. Huius uero nos morbi causam indagātes, putauimus

uimus eam intestino tenuiori figi: eoq̃
adeo obcalluisse, ut cum incoctus cibus
ad iecur totus penetrare non posset, re-
trocederet & uomitu tãdem expelleret:
id quod mortuo eo, experimento com-
probare uolētes, corpus incidere tenta-
uimus. Sed nescio qua superstitiōe ne-
gantibus cognatis, uoti compotes fieri
nequiuius.

Ex abscessu mesenterij mortuus. XXXIII.

Iulianus quidã iuuenis alioquin opti-
mus, alui torminibus uexabatur: inc̃p̃
dies magis magisq̃ dolor uim capiebat:
tantumq̃ aberat ut huiuscemodi dolo-
ris abditiæ causæ deprehendi possent, ut
nullis unq̃ præsidijs tolli aut saltem le-
uari hoc malum potuerit. Omnia enim
uiscera sana uidebãtur, iecur, lien & in-
testina omnia nullã doloris notã osten-
debant. Sed ille nihilominus magis ma-
gisq̃ indies quàm ut tolerari posset ur-
gente dolore ipso, tandem è uita disces-
scit. Quare mortui corpore inciso, ut sci-
licet tanti mali causas dignosceremus,
& sanis omnibus, ut putabamus, inuen-

tis uisceribus, iubeo intestina amoueri. Quæ dum gladio discindit minister, in abscessum magnū incurrit. Quo præciso materia multa nigrior foetescq; profluxit, encausto sutorio similis. Ex quo manifestā eius mortis causamprehendimus. Atra em̄ bilis eò cōfluēs huiusmodi abscessum paulatim effecerat.

Monialis intestinorū dolore mortua. XXXIIII.

IN cœnobio diui Donati quod in agro Puluerosæ est, religiosa mulier & eius cœnobij professa fuit: quæ intestinorū doloribus multis iam mensibus urgebatur: & aluus nihil nisi ægrè & durum, idq; tantum decimo quoq; die reddebat. Cumq; nullis cōferētibus auxiliis diu multumq; hoc malo uexata, tandē naturæ concesserit, mortuæ corpus incidendum curauimus, & inuenta sunt intestina altiori callo constricta: adeoque iter angustum relinquebat, ut deiectiones ægrè transmitti possent. Hoc tamen nos malū, propterea quòd aluum prementi nescio quid durum renitebatur, etiam ea uiuente præsenferamus.

Tubercu

Tuberculum supra cordis arteriam. XXXV.

Mulier Clara nomine & genere, cordis dolore interdū uexabat̃, quē medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabant̃. Sed cum pluribus iam annis connubio iuncta non cōciperet, & sterilitatis causam quæreretur, ac tollere conaretur multis præsidijs, ita demū dolor ille cordis increbrescere occepit, ut perpetuus fieret. Ex quo sapius etiā mulier ipsa deficiens, recreari uix poterat, donec eo iam magis magisq; inualescente è medio sublata est. Cæterum mortuæ corpore inciso, et frustulum nigrioris carnis in sinistro cordis uentriculo supra arteriam, quod mespiliij formam haberet, & uulua à medio infra uersus imam eius partem iunctis oris obcalluisse reperta est. Quare ut tuberculum illud mortis, ita hoc sterilitatis causam fuisse cognouimus.

Stomachum obcalluisse.

XXXVI.

Antonius Brunus affinis meus, cū emanducatum cibū breuiori

quàm par fuerat temporis spatium contineret, & ita ut erat incoctum reijceret, omnibus medicamentis, quæ stomachi uitijs adhiberi possunt, diligentissimè fatus est. Verùm cum ea nihil omnino proficerent, & corpori ob inopiam alimenti iam absumpto uix pellis & ossa superessent, gradatim tandem ad mortem deductus est. Quare defuncti cadauere publicæ utilitatis gratia inciso, inuentum est hominis uentriculum ita iunctis oris ad imam eius partem obcalluisse, ut cum nihil inde ad inferiora transmittere poterit, necessariò mors subsequuta est.

Callus in uenis mesaraicis. XXXVII.

Petrus Aldimarius filiū habuit, qui cum octauum iam ageret annum, in corruptum incidit appetitum, quo calculos ruderatq; comedens in lentam tandem febriculam deuenit. Indeque procedente tempore & uentriculus non continere & uenter fluere cœpit. Adeoque duobus his malis uexatus est puer, ut paucis etiā diebus à uita decesserit. Huius nos cum annuente patre emortuum corpus

corpus incidissemus, repertus est callus inter uenas, quas mesaraicas appellant, à quo cum uenæ ipsæ adeò obstruerentur omnes, ut ferri inde sanguis ultrà nō posset, necesse fuit puerū è uita migrare.

Angina incisa.

XXXVIII.

ANgina laborabat Nicolaus Rota, sed nullus tamen rubor aut tumor uel intus in gula uel extrà uidebatur. Et ipse nihilominus uix spiritū trahens, quicquid præterea edendū sumeret, per os statim & nares reijciebat.

Quare cum arescente corpore, pallente iam facie, ac uertētibus oculis, spes omnis sublata esset, & medici quibus cura demandata fuerat, ægrum amplius non audirent: me licet iuniorem cōuocant, ægrum ostendunt, & quæcuncq; acta fuerant exponunt. At ego cum & ægrum ipsum ad mortem tendere, & medicos quæcuncq; opportuna fuerant præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi ipse me cū cogitare, satius ne esset ægrū ipsum Deo & naturæ, ut cæteri medici, incuratum dimittere, an aliquod licet insolitū,

utile tamen auxilium experiri. Verum
 adhortantibus his qui ægro assistebant,
 cōsilium capio, & locum altioribus pla-
 gis sub ipsis maxillis, ac etiam supra col-
 lum incido, ex quo cū sanies multa pro-
 rumperet, adeò morbus leuatus est, ut
 faucibus ipsis spiritum simul & cibū ca-
 pientibus, facilis dein ad bonam ualetu-
 dinem ægro ipsi daretur regressio.

Soluta umbilici unitas. XXXIX.

Virum nouimus, quem dolor in ple-
 niori intestino exortus adeò cru-
 ciaret, ut nullo interim spiritu erumpen-
 te mediū hominem disiectū iri putares:
 cumq; frustra multa auxilia adhiberent,
 & non solum clysteria ut in aluū demita-
 tebātur, eadem prorsus eiicerentur, sed
 & medicamenta quoq; tam nihil ex ipsa
 aluo deponerent, ut iter hinc inde clau-
 sum crederes. Tandem cucurbitula um-
 bilico affixa (solet enim huiusmodi ma-
 lum tali præsidio nōnunquam minui ac
 leuari) soluta est umbilici ipsius unitas:
 indeq; spiritus crassior erumpens, & cu-
 curbitulam ipsam disiecit, & hominem
 omni

omni amoto dolore pristinae sanitati restituit.

Elevatio stomachi.

XL.

ANnum sextumdecimū agentī Petri Guicciardini filio, ita ceruix uentriculi sine ullo doloris sensu eleuabatur, ut magnitudinem pomi cydonei aquaret; nec manifesta causa ostendebatur, cum omni nukumēto careret. Quare rem admodū diligenter uestigare cōplī, admiratus quānam abditæ huius mali causæ esse possent. Sed cū nullā prorsus præter uētum inuenīrem, à quo, uentriculi capite paulatim eleuato, ita eiusdemodi fieret tumor, ut & ossa etiam talem situm adepta, nec ultra ad pristinū statum reuersa, figurā iam illis impressam tanquam naturalem custodirēt; ferrea demū lamīna, quæ ex cingulo quoque surgebat ferreo, stomachum comprimī iubeo, quo paulatim ad sedem suā retrocedere cogeretur: quod factū est. Nam haud multò post hoc uno tantum præsidio ita repressus est tumor ille, ut ad pristinam ac naturalem formam ipse

sius uētriculi ceruix penitus reuerſa ſit.

Menſes uomitione proiecti.

XLI.

VRgebatur mulier acerbiffimo capitis dolore, propterea quòd menſtrua non prouenirent; uerùm his demùm uomitione propulſis illico ſublatus eſt dolor. Sed cum id iterum iterumq; ac ſæpius factitaſſet, abhorrens tandē mulier ab huiuſcemodi uitio, auxiliũ noſtrũ expoſcit: qui ſola ſanguinis miſſione ex uenula quæ ſub talo eſt, & mēſtrua ipſa ex naturali loco rite pfluere coëgimus, & quod ſequēs eſt, mulierem ipſam priſtinæ ſanitati reſtituimus.

Cordis pars patefacta.

XLII.

INciſo abſceſſu, qui ſupra ſeptimam uertebraſſe innatum longo temporis interuallo ſinũ fecerat, intimamq; membranam ſua ſanie prorſus eroſerat, minima ipſius cordis pars oculis cernētium patefacta eſt. Verùm cum hominē ſumma & diligentia & ſolicitudine curaremus, in priſtinā redactus eſt ſanitatē.

Pure

Pure per urinam deducto sanatus est
pleureticus.

XLIII.

O Ritur sæpe in lateribus morbus, qui *πλευρητικός* à Græcis nominatur: huic ruffis & febris accedit, & excreatur cū pituita sanguis, graue profectò ac penè intolerabile malū. Hoc cū affligeretur Antonius quidam, & morbus iam ad maturitatē peruenisset, euacuato per urinam pure, quod rarò contingere solet, penitus sanatus est æger.

Ex tabe sanata sola sanguinis missione. XLIIII.

A Nno integro remorantibus menstruis mulier ad summam deducta est maciem: et uenæ eius ob nimiam plenitudinem nigriores factæ, admodū extendebantur. Cumq; nullum cibi genus desideraret, consequens fuit, ut totum tabesceret corpus. Quare præsentaneum auxiliū iudicauimus sanguinem mittere: qui cum primo die nigrior effluxisset, iubeo & altero id ipsum fieri. Quo longè clariore emanante, factum est ut profluentibus dein mensibus, mulier quæ per annū macie & tabe afficie-

batur, idoneis tandem medicamentis resumpta ad pristinam facile redierit valetudinem.

Fluxus sola oratione sanatus. XLV.

Accidit interdū vētrem fluere: & si diu negligas, difficilior plerumque sit eius curatio, quin & nōnunquā impossibilis. Quod & nos nuper experti sumus. Iohannina Bencia affinis mea, mulier quidem & animo & genere nobilis, cum diu ventrem fluere permisisset, eò tandem deuenit, ut nullis medicamentis, nullis auxilijs, nullis etiā balneis eiusmodi fluxus sisti potuerit: augente interim hoc malum iugi & inuincibili humore, qui ex eius infirmo alioquin & imbecillo capite in vētriculum destillabat. Et licet interdum cōualescere uideretur, haud multò tamē post reuertebatur id malū, & quidē priore deterius. Quare omni spe medicæ artis deposita, fratrem Dominicū Pisciensē ordinis prædicatorū, de quo etiā suprā mentionē fecimus, adit: morbū quo tenetur exponit: se omni humano auxilio destitu-

destitutam affirmat: lachrymis & precibus orat, ut laboranti sibi sua & fide & oratione opem ferat. Quod cum ille se facturum pro uiribus annuisset, admota manu mulieris caput comprimit. Tum fusca oratione, ac signo Crucis ibidem impresso, abire iubet. Reuersa domum, cum eo ipso atque item altero die ueter nihil ex consuetudine præterquam sanum redderet, me conuenit, rem ordine narrat, seque penitus liberam affirmat. Quod etsi Deo, cui possibilis sunt omnia, factum facillimum scirem: uerebar tamen ne quod habebat inuotis mulier, id iam se adeptam persuaderet: cum nihilominus morbus ipse paulò post uel etià deterior reuersurus esset. Sed cum ita tertius peragat annus, ex quo fluxus ipse suppressus est, nec ulla interim apparuerit uel etià appareat regressiōis nota, ingenuè & fate mur & prædicamus, hoc solo nutu Dei per fidem & orationem sanctissimi illius uiri factum fuisse, ad laudem & gloriam nominis sui, quod est benedictum in secula.

Gelatus in comitiales incidit morbum. XLVI

Hieronymus Benciſ, cum è diui
Laurentij æde, ubi declamatis ad
populum concionem audierat, domum
ſeſe recepiffet: & reſerato oſtio ad cu-
biculum uſq; in quo uxor ex partu lan-
guens iacebat, aſcēdiſſet: immotus ibi-
dem & inconniuiſ oculis ſtetit. Quem
cum uxor diutius intuita rogaffet tandē
quid ageret: & ille nihil oſecius exper-
giſceret, accerſitis famuliſ in eodē quo
illa iacebat cubili, coniugem locari iu-
bet. Qui ubi tandem ſenſum recepit, ni-
hil eorū quæ ipſe interim egerat, recor-
dabatur. Quare cōuocatis medicis, qui-
bus & ipſe interfui, plurimo ſermone
quæſitū eſt, an ille toto eo tempore ob-
dormierit, ut accidit multis: qui ea per-
ſæpe dormientes faciunt, quæ munia ſo-
lum uidentur eſſe uigilantium: an alio
quopiam morbo laborauerit. Ac tandē
conuenimus illum eo tempore non dor-
miſſe, ſed rigidum potius uel attonitum
aut gelatum fuiſſe. Quam quidem ſen-
tentiam etiā ſubſequens malum mani-
feſtiſſimè

festissimè cōprobauit, cum paulò pòst in comitiale[m] inciderit morbū: quo nul-
lis prorsus cōferentibus auxilijs multos
iam annos miserabiliter cadit.

Amiſſa atq; iterum recuperata memoria. XLVII.

EX præterito morbo conualeſcens
Antonius quidam Senenſis, quæ-
cūq; memoria fixa tenuerat, ita prorsus
oblitus eſt, ut ne rerum quidem nomina
reminiſceretur. Dumq; Florētia eſſet,
Senis ſe eſſe putabat: ſed ne amicos quæ-
dam ab inimicis diſcernebat: quos etiā
immutatis nominibus uocitabat. Qua-
re eo uelut prorsus amenti, atque deliro
naturæ dimiſſo, cum uigefimo iam die
hoc malo angeretur, cœpit uenter flue-
re, uariaq; & diuerſa ſtrigmēta, ſanguī-
nem, bilem uiridem, muccoſasq; deie-
ctiōes deponere. Quo factum ut mens
ſimul & memoria redirēt, licet nihil eo-
rum quæ ipſe interim geſſerat, recor-
daretur.

Ex diſtentione neruorū mors ſubſequuta. XLVIII.

Mittere ſanguinem ut expeditiſſi-
mum perito eſt, ſic ignaro peris

culosissimū. Iuuenem uidimus cui cum ex brachio sanguis mitteretur, & neruū scalpellum attigisset, statim sequuta est neruorum distēsiō : quæ hominē ita crudeliter afflictauit, ut paucis etiā diebus laboranti illi uitam eripuerit.

Ex incisa arteria ferè mortuus.

X L I X.

ORta, ut assolet, inter commēsales lite, cum quidam è conuiuiis arreptum calicem in Alfonsi Hispani familiaris nostri faciem proiecisset, & incisa arteria ac cute dilacerata sanguis copiosior erumperet, multa quidē sed frustra adhibita sunt medicamenta : cum ea sit arteriæ ipsius cōditio, ut incisa coire aut sanescere citra uersionē non possit. Quare cū sanguis ipse eò semper uehementius proflueret, quò plura experirentur auxilia, & homo iam uenis exhaustis prorsus deficeret, ad me tandem mittūt rogantes, ut si fieri possit, amicū à morte præripiam. Venio igitur ad eum, uulnus inspicio, uirtutem probō, nullum superesse præsidium iudico, præter uersionem solam. Quare ea qua potui diligentia in-

tia incisam arteriā candenti ferro inuro,
& statim suppressus est sanguis: quo in-
hibito, reliquū curæ facilem satis & ex-
peditū habuit ad sanitatem regressum.

Mulier ex copiosa sanguinis missione emortua. L.

Quidam nostri seculi medicus, phi-
losophiæ magis quàm medicæ ar-
tis peritus, cum uxorem Iacobi Pactij
equitis Florentini curaret, quæ duabus
tertianis uexabatur, mittere sanguinem
utilissimum iudicauit: quod & ego, cui
simul cum illo cura demandata erat, pe-
nitus non improbabam; cū bilis sangui-
ni mixta uideretur. Sed & multa tamen
pituita exuberabat. Igitur uenam inci-
dendā quidē censui: sed tentandī gratia,
ut scilicet colorem sanguinis habitumq;
discerneremus. Qui si crassus & niger
esset, taquàm uitiosus largius effunde-
retur: sin contrā ruber & pellucens, tan-
quàm integer seruaretur. Incisa igitur
uena sanguis effluxit rubicūdior. Qua-
re dimisso iam caliculo, supprimendum
censui; ille cōtrā deducendum. Verum

cum esset ipse ætate prouectior, eius magis sententiæ inhærentibus coniuge & propinquis, ad duas sanè libras sanguinis miserunt æquè lucidi ac rubri. Quare cura omni seniori illi relicta protinus discedo, palàm affirmans atque contestans iugulatam esse mulierem: quod et paulopost rei euentus facile comprobaui, cum paucis admodum diebus mulier ipsa defectis iam uiribus, ac uoce penitus exhausta in somnum inciderit grauiorem: ex quo tandem mors subsequuta est, ob nimiam scilicet humorum cruditatem, quæ ex ingenti sanguinis profusione contingere solet. Quare debet semper medicus, si diligens sit, in omni sanguinis missione considerare utrum crassus et niger, an contrà ruber & pellucidus sit. Quod si niger & crassus, ut uisiosum effundi: sin contrà ruber & pellucidus, ut integrum suppressi iubere. Tantum enim abest ut eiusmodi sanguinis rubri scilicet atque pellucidi missio proffit, ut etiam plurimum semper obsit. Sed excidit hominì documentum filij
seni:

seni: quo in missione sanguinis cum bilis accensionem, tum & pituitæ cruditatem plurimum cauendam censuit.

Epoto ueratro iugulatus. L. I.

L Aboranti cuidam Zenobio nomine quartana, imperitus quidam medicus ueratrum, quod inter cætera medicamenta periculosissimum est, temere propinauit. Ex quo statim subsequuta est cum crebra ac uehemens alui ductio, tum spiritus tam grauis ac difficilis attractio, ut cum me filij ad hominem iam in mortis articulo positum aduocassent, & nullis potuisset præsidij tanto malo succurri, intra sex tantum horarum spatium mors eum uiolenta è medio subtraxerit. Cauendum igitur est ne huiuscemodi medicamenta, quæ ueneni naturam habent, & stomachum cæteraque membra plurimum lædunt, absque eo exhibeamus quod nocuum aufferre possit: cum & alui per se sæpius ducant, & hominem non solum infirment, sed plerumque etiam mortui tradant.

Vomitu ex albo ueratro mors subsequuta. LII.

Vomitus ut interdū sanis utilis, sic aduersa uale tudine laborantibus nonnunq̃ necessarius. Verū multum interest quo modo & quare fiat. Hoc autem officium diligētis medici esse debet. Nam cum quidam medicæ artis im peritus albo ueratro uomitum ciere so litus, om̃e genus morbi tali præsidio se se curaturum polliceretur, accidit fortē ut in manus eius inciderit quidam, qui duobus iam annis uentriculi uitio laboraret, nec ullis unq̃ medicamentis sanari potuerit: utpote quod cum suapte natura difficile sit, difficillimū etiam redditur in corpore infirmo atque imbecillo, præsertim ubi licentiōri quadam libertate utatur æger. Album igitur & huic uer atrum ex more exhibente illo, plurimum bilis ac pituitæ, tum nigram bilem, postremò sanguinē eiecit: quibus ita deductis, imbecillitas primò & quidē magna, tum sudor frigidus toto capite ac thorace emanans, nouissimè & mors subsequuta est. Nō igitur ignora re dila

re diligens medicus debet huiusmodi medicamentū nō semper ægris prodesse, sanis uerò semper obesse. Nā ubi robustum corpus nactus fueris, & uentriculus sit potēs, morbusq; lōgior ac difficilis, ut comitialis & insania, aut pares his, tunc album ueratrū rite ac citra medicī culpam exhibi potest.

Represso sudore sanatus. LIII.

Cum haud postremæ notæ Medicus nobilem quendam ciuem curaret, & febribus malè hominem habentibus, uniuersum corpus in sudorem resolueretur, uiresq; omnes ita deficerēt, ut cognati plurimū de salute eius addubitarēt, me aduocant, ægrū ostendūt, curam enarrant, Inspiciēs itaq; hominem, oculos admodū graues ac pallorē faciei intueor: quin & intima eius præcordia calore uehementi affici aduerto. Quare sudorē inæqualē, qui finiri nō poterat, statim amotis uestibus, qbus ille de præcepto medicī tegebat, ut incōgruum & inutilem suppressere nitimur: præsertim qđ eo uires ægri penitus conuelli uideat

banť: tum corpus euētari, ægrumq; etiā frigidioribus potionibus uti iubeo: donec sudor, quē medicus ille omī studio ciebat, prorsus supprimeret. Quod ubi factum est, immutari statim uideas ægrī faciem, uires redire, calorem reprimi, febrem remitti, ac non multò pōst homīnem ad pristinam sanitatem reuerti.

III. *Pestilenti febre arreptus.* LIII.

Philippus Stroza & nobilitate generis, & opum affluentia insignis, lenta quadam febricula laborabat: & ex medicis, qui ægrum uiderant, alij quotidianam, sed leuem, alij ob algorē contractā febrem putabant: nec defuit qui crederet à capite distillasse materiam, quæ putrescentem febriculā gigneret. At nos cum eam ipsam diligentiori examine perpenderemus, pestilentem iudicauimus. Quam sententiam deridentes medici, cum leuatam iam febrem existimarent (latebat enim anguis in herba) familiari tantum medico curam dimitunt. At æger, qui iam cōualuisse uidebatur, aduentante die septimo, in neruo

rum

rum subito resolutionem & febrem incidit ardescens : qua exhausta voce, & corporis uiribus conuulsis, paucis etiam diebus mors subsequuta est. Magna igitur esse debet medicorum circumspectio in cognoscendis curandisque morbis : ne inscitia (ut sæpe fit) atque indiligentia eorum ægri ipsi, qui sese illis penitus tradunt atque committunt, periclitentur.

Claudus ex loco eminentiori cadens liberum recipit gressum.

LV.

Nicolaus architectus cum de eminenti turri præceps ruisset, tantum abfuit, ut ex tam ingenti casu incommodum aliquod reportarit, ut cum antea altero claudicaret pede, rectè deinceps ambulauerit. Quin & puerum uidimus, qui pestilenti morbo correptus curatus, quæ idem malum effugerit. Nam ubi prius utroque pede claudicaret, ut nisi duobus fulcitus baculis omnino incedere non posset, curatus liberè, id est sine aliquo adminiculo incedebat.

Scorpiōe ictus glacie se opprimi querebatur. LVII.

FAmulum habui, qui scorpiōe ictus tanto subito ac tam frigido sudore toto corpore perfusus est, ut argentissima niue atq; glacie sese opprimi querebatur. Verum cum argenti illi solam thyriacam ex uino potētiori exhibuissem, illico curatus est.

Fames ualida.

LVII.

CVm uniuersam penè Italiam anno salutis nonagesimosexto supra millesimum quadringentesimum tam ingēs ac ualida fames afflīctaret, ut passim multi publicis in uīs atq; plateis deficerēt: multi etiam ex malis ac noxijs nutrimentis in uarias inciderent ægritudines: uidimus ex his q̄ plurimos qui ex diutina fame escam abundantiorē nacti fuerant, dum pleniori utuntur uictu, paucis diebus uitam finisse: adeò noxia atq; perniciofa est nimia satietas, quam multa præcessit inedia. Mulieres quoq; uidimus, quæ pueris quos lactarent infestis, & se & illos ad mortem deducerēt. Plurimi tamen ex his qui ad ualitudinariam

riū deducebant, medicorū cura & diligētia ad pristinā reuertebātur sanitatē.

Mulier ferè mortua ex sanguinis missione. LVIII.

Mulierem uidimus, quæ cū pleniorī & obeso esset corpore, & in ardescētē incidisset febrem, usā cuiusdā imperitī medicī consilio, sanguinē ex uena copiosum emisit. Quo statim grauius afflicta in multo deteriorem prolapsa est ualeitudinem. Nam ut in tenuioribus magis sanguis, ita & in plenioribus magis caro abundat. Nos igitur cum ad mulierem uocati, eam summo in discrimine positam inueniremus, alias omnino obseruationes adhibēdas censuimus, eas uidelicet, ad quas dirigī curantis consiliū debet. Quare defectā dudū uirtutū omni genere auxiliij resumo, donec corporis uiribus redeuntibus materiam quam exuberare cognouerā, medicamēto deponendā censeo: quod cū ex frigidioribus rebus ægrotanti exhibuissem, illico extincta est febris, & mulier de cuius iam funere cogitabat, per Dei gratiam rite curata conualuit.

*Ex quartana malè curata, sanitas, tum &
mors subsequuta.*

LIX.

V Illicus meus annuam quartanam patiebatur, & consilio nescio cuius empirici faselum ex omphacino, & alia usq; ad satietatem deuorās, ad uiginti insuper uini meri calices ebibit: quo adeò inflatus est, ut è foco prope quem coenauerat, amoueri penitus non posset. Quare strato humi pallio quo induebatur, ibidē pernoctauit. Matutino autem aduentāte tempore, diffusus per omnia membra sudor est: quo finito, uomitu quicquid comederat reiecit, & cū eo pituitosa excrementa quamplurima. Quo factum ut ex quartana quoq; qua integrum iam annū laborauerat, extrusa, ualetudinem sit consequutus: quam quidem rem ualidioris naturæ uī acceptam referendam arbitrati sumus. Nam amota iam cruditate, & humorum concoctione longiori spacio perfecta, natura quæ sua pigritia torpebat, ab ignauia & torpore propulsa, contra morbum & causas uires excitat, quibus tandem sudore

dore ipso atq; uomitu & morbū & errorem disiecit. Quod profectò eadem febris comprobauit. Nam cum quatuor post annos hominem iterum inuasisset, & ille putaret eodem posse se auxilio febrem tollere, quo olim fecerat, statim, hoc est inter morbi ipsius initia, dū scilicet cruda esset adhuc ipsa materia atque incocta, pleniori ut cum uictu & potione abundantiori ex iisdem quibus suprà rebus abusus, ante solis ortum eodē quo decubuerat loco mortuus inuētus est.

Molesta tussis sola sanguinis missione curata.

LX.

MOlesta tussi afficiebat puella quædam quintum & decimum agēs annum: quæ tametsi per se grauis & formidabilis esset, eo tamē sese medico formidabiliore reddebat, quòd unā sepius cū ea sanguinē expuerat puella. Quamobrem cum medici ipsi, quibus cura demandata erat, & hāc paulatim tabe consumptū iri, et nullis se posse auxilijs huic malo succurrere uiderent, eam tandem Deo & naturæ dimittūt. Verum pater

(ut est amor) ne qđ omnino intentatum relinqueret, me aduocat, puellā ostēdit, & quæ hæcenus facta sunt, plurimo sermone enarrat. At ego sputū primò colligi iubeo, qđ ubi nulla pus subsequi, & sanguinē ipsum minimè etiā purulētum inspicerē, cœpi mecū cogitare quænam huius uitij causa esset, et an sanguis ipse ex ore uel ex gingiuis, aut fortè ex naribus efferret: sed cū ex his locis absq; ulla pfluat tussī, aliūde eum emanare arbitratus sum. Quæro igit si is ex gutture, aut ex arterijs hulceratis, uel ex pulmone potius, siue ex pectore, aut forte ex iecinore prūperet: sed cū nulla essent certa indicia, puellā interrogo an menses illi profluāt (solent em̄ scēminæ, qbus sanguis per menstrua non respondet, sæpe eum aut cū tussī expuere, aut uomitione propellere) Sed negante illa, sanguinem mittendū censeo ex uenis, quæ sub talo sunt: idq; singulis mensibus faciendum, donec isto atq; item alijs auxilijs, quæ sanguinē promouere consueuerūt, & menses ipsi rite profluere cœperunt,

&

& puella quæ iam macie & tabe confecta uideretur, sex tantum mensium spacio uires & corpus resumens, ad pristinam adiuuante Deo reuerfa est sanitate.

Difficultate spirandi mortuus. LXI.

MULTOS difficultate spirandi laborasse cognouimus: sed inter ceteros quendam, qui non nisi recta ceruice spiritum trahens, paulatim ex angustia deficiente uirtute toto corpore pallidus ac liuens efficiebatur: nullus tamen in pectore, nullus in præcordiis dolor erat: sed nec sibilus aliquis ob angustias, per quas spiritus euadit percipiebatur: ex quo iudicare posses ægritudinem in pectore cõcipi. Verum cum paucos post dies inualefcẽte morbo ipso, & nullis cõferentibus præsidijis, æger è uita migrasset, incidere mortuũ decernimus, ut huius mali abditas ac latentes causas deprehenderemus. Quod ubi factũ est, inuenimus non parũ atræ bilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisse: unde etiã per uenas diffusus, nõ est mirũ si corrumpente eo spiritũ ipsum, hominem ad festinam

mortem deduxerit, quod etiam auctore Galeno aliàs contigisse cognouimus.

Ex horrore flammæ in febrim incido. LXII.

IN Appiani basilica, cū adhuc essem admodum iuuenis, unā cum Peregrino Allio literis Græcis operam dabam sub præceptore Francisko Castilionensi religioso uiro. Vbi cum semel è cubili summo diluculo consurgens ædem ipsam ingrederer, uixq; limen trāsiliissem, ecce uideo flammās ab imo pavimento iterum atq; iterū sursum ferri: horresco, & pauēs ac tremēs cursim, ut poteram, cubile ipsum repeto. Me uerò Peregrinus condiscipulus meus, qui adhuc in lectulo quiescebat, cum anhelātem & ueluti lymphatum inspiceret, rogat quidnam mali mihi contigerit: uix ego trahebam spiritum, rem tamen ut potui explico. Admiratus & ipse, timere cœpit. Sed cum interim præceptor noster è cubili surrexisset, hominem couenimus, rem exponimus, causam quærimus. Ille uerò, ut erat uir doctus & in philosophia satis eruditus, uapores, inquit, ex cadaue

cadaueribus mortuorum eleuantur, qui calidissimum hunc aërem nacti (id enim accidit in ipso mense Iulij) facile inflamman-
 tur, quod & nos etiam sæpius uidimus, ac propterea nihil uobis pertimescendum est. Hoc etsi ego autoritate uiri
 suus uerum iudico, ex præcedenti nihilominus timore, ex quo spiritus ipsi cateruatim uersus cor regredientes inflammati sunt, in eam quam Græci ἐφνο-
 μέαν uocant, febrem incidit.

Puer horrore mortuus.

LXIII.

P Verū nouimus, qui dū rure pater-
 no degeret, singulisq; diebus ad uic-
 cinum sacerdotē studendi causa, ut sit,
 summo manē mitteretur à patre, accidit
 semel ut propè iam intranti illi sacerdo-
 tis ipsius ædes, essetq; cœlum paululum
 adhuc subobscurū, præstò fuerint duo
 uiri nigris uestibus obuoluti: quibus a-
 deò perterritus est puer, ut toto corpo-
 re contremiscens, altaq; uoce auxilium
 clamitans, in admirabilem sanè ægritu-
 dinem, ac demum in mortem inciderit.
 Nam statò tempore, id est, octauo quo-

que die, & eadē fermē hora in eundem
semper horrorē atq; clamorem prorue-
bat, donec tabe consumptus, uitam que
nullis præsidijis contineri potuit, misera-
biliter finiuit.

Tussi scissa est tunica intestinorum. LXIIII.

TVlli ualida urgebatur puer sextū
agens annum, dumq; uehemētius
tussiret, scissa est tunica, quæ diducere
ab inferioribus partibus intestina debet
& in scrotum, Græci ὄρχεον uocant, inte-
stina deuoluta, herniam fecerūt, qua &
in hūc usq; diem laborat. Tanta em̄ fuit
scissura, ut nec coire hæctenus ullis po-
tuerit medicamentis, nec etiam in futu-
rum nisi sola uestione coibit.

Œtus in cordis tunica conualuit.

LXV.

EX nobili familia natī fratres duo,
eadem etiam cohabitantes domo,
atq; eodē uictu uiuentes, dum inter cœ-
nandū orta (ut fit) inter eos lite, alter al-
terum gladio quo in mensa uteretur, in
ipsius cordis sede percussisset, plurimus
que ex uulnere sanguis efferretur, lan-
guescunt illico uenæ, pallet facies, su-
dor

dor frigidus toto corpore manat, arteriæ non eleuantur, omniacq; demum mortis signa apparent. Verum ne nihil omnino agerem, iubeo hominem his rebus foueri, quibus cordis vires refici possint. cumq; æger usq; ad mediã noctem eodem sese habitu haberet, & de eius potius funere quàm de uita cogitaret, cœpit paulatim spiritus reuerti. Quare sumpta spe curam prosequor, donec alijs atque item alijs præsidijs usus, hominem tandem, Deo adiuuante, ad pristinã sanitatem reduco; ex quo planè cognouimus nõ ictũ cor, ut putabamus, sed eius tantũ tunicam leuiter fuisse perstrictã.

Vitium stomachi curatum. LXVI.

INter stomachi uitia uulgatissimũ est resolutio, quæ uel calidiori, aut frigidiori, humidioriue, uel etiam sicciori habitu plerunque solet accidere. Nobilis quidam uir Ioannes nomine, ciuis Neapolitanus, cum diu eiusmodi uitio laborasset, & ex medicis nostri seculi plurimi hominem curandum suscepissent, nullum tamen inuenire

auxilium idoneum potuit. Quare cum Florentiam demum ueniens me conuenisset, & quæ hætenus ex medicorum consilio huic uitio adhibuisset, ordine enarrasset: ex his quibus usus est præsidij facile cognouimus existimasse medicos omnes eum malo habitu frigido laborare. Nos uerò & præcedenti curatione, & alijs haud sanè obscuris indicijs, longè aliter sentientes, calidiori habitu eius affici uentericulum arbitrati sumus. Quare ad ea auxilia conuersi, quæ aridum iam ac tabe penè cōsumptum corpus desiderare uidebātur, primo die solas lactuculas ex aceto & oleo cōmanducare præcipimus: quas cū utiles stomacho atq; idoneas percepisset, iubeo dimittat balneum, frictiones, exercitationes, præsertim superiorum partium, unctiones omnes & cibos calidiores, quibus hætenus usus fuerat, & ad frigidus potius ac difficilioris concoctionis sese conuertat. Vnde & ueruecem magis quàm auem aut uenationem aut piscem, nisi sit generis durioris, in hac sua ægritu

ægritudine cōlaudo. Potui quoq; aptissimum illi uinum frigidum & austerū; ineptissimū calidū & crassum esse pronuncio. Quibus cum ille auscultasset, ac diligentissimè ea exequutus fuisset, hoc tantum genere uictus & frigidioribus medicamentis usus, infra duos menses pristinam recuperauit sanitatem.

Melicera pro carbūculo iudicata. L X V I I.

H Vlcere subalbido furunculo simile, quod Græci eo quod faui speciem habeat, *μελικηρη* uocant, uir quidā nomine Paulus laborabat. Id autem cū febrem & inflammationem ingentē excitasset, medicum quidē, sed qui per imperitiā hulceris ipsius naturam minime calleret, accersit. Eo autem iudicante hulus ipsum pestilens esse (uenit enim cum dolore uehementi, habensq; foramina per quæ fertur, humor glutinosus uix maturescit) simul omnes cum consulente medico aufugiunt, uni tantum uiro ægrī curam cōmendātes. Quo factū, ut desperatis penè rebus ad me mitteret, rogaretq; aliquod pereūti illi auxilium ferrem.

ferrem. Sciscitor itaq; nuncium hulceris naturā, & an increſcat ægritudo, uel deficiat uirtus, aut fortè eo loco peſtilētes ſint febres. Refertur hulus nō nigrum, nō lucens, non pallidum eſſe, febrem lentam & penè leuatā, ſana omnia in regione illa. Accedo igitur ad hominem; cumq; contrā hilari uultu reſediſſem, faciem primò oculosq; ſano ſimiles intueor. Tum arteriā tangens, pleniorē quoq; reperio. Quare ſanitatē pollicitus hulus detego, & omni ſublato timore familiā reuocans curā aggredior: quæ licet difficilis admodum fuerit, ad integram tamen ſanitatē æger ille per Dei gratiam reuerſus eſt.

Incisus coles ſanari nequiuit.

LXVIII.

MEdium ſibi colem lino, & quidē arctè deligauerat puer inſcijs parētibus, eoque tandiu uinctus fuit, donec plagæ altitudo ad iter urinæ aſcenderet duobus locis: quibus & quòd uirna ipſa inde mitteretur, & quod utrinq; oræ obcalluerint, coire hulus atq; conglutinari nullis unquā remedijs potuit.

Monachū

Monachū etiam iisdem fermè tēporibus uidimus atque curauimus, qui ob zelū castitatis, sed indiscretū tamē ac minimè secundum Dei rationabile obsequium, colem sibi & quidē pubetenus prorsus absciderat: ex quo cum sanguis copiosus efflueret, ac propterea medicamenta omnia uinceret & exuperaret, arduum sanè ac laboriosum fuit eiusmodi profluuiū sistere atq; inhibere. Oportuit enim singulas uenas, quæ sanguinē fundebant apprehendere, atq; ita deligare, ut ora præclusa coirent. Quo facto reliquum curæ genus haud admodum difficile fuit, donec uulnus ritè curatum penitus sanesceret.

Qui ex nimia plenitudine mori uideretur, sola sanguinis missione sanatur. L X I X.

PLurimum in morbis iudicandis tribuunt uenarū pulsui: qui si imbecilli exiguiq; fuerint, mortem plerunq; denuntiāt: sin contrā magni & pleniores, salutis spem afferūt. Nos tamē Philippū quēdā uidimus, hominē sanè ebriosum & corpulentū, cuius pulsus, dū languēs

in lecto iaceret, ita parvus & exilis erat ut cū à medico percipi uix posset, facile crederes mortem instare, ni facies rubicundior, oculi, dentes & uenæ pleniores iudicio prudentis medici obstitissent.

Quare tãti malī causam diligētius p̄quirens, iudico id ob nimiam saturitatē sanguinisq; abundantiam fieri, nullum' que opportunius adhiberi posse auxiliū, q̄ sanguinis ipsius celerrimā missionem.

Sed obstabāt cognati atq; amici, uerentes ne huiuscemodī præsidiū hominem celerius occideret. Instanti tamen mihi ac certam, si id fieri permitterent, salutē pollicenti, tandem acquieuerunt. Quare accersito statim ministro sanguis mittitur. Nec mora pulsus simul & uires tam celeriter redeunt, ut festinantior affuerit ipsa sanitas, q̄ mors quæ pro foribus excubare uisa est, affutura crederet.

Abscessus sola thyriaca apertus.

LXX.

PVerulus thoracis abscessu laborabat, & cū condita et matura iam suppuratio esset, timeretq; ille hunc ulcus mucrone discindi, thyriacam superpono:
qua

qua non secus unius tantum noctis spacio abscessus ipse apertus est, ac si scalpello fuisset incisus: ex quo facile coniectari potest, quanta sit huius compositiuis: qd' & nos sæpe aliàs experti sumus.

Gangrænam mortem asferre, si à digito pedis inceperit. LXXI.

Qui hulcere nigro, quod γάγγραινα ^{vau} Græci appellant, afficiuntur, si id à digito pedis inceperit, & patiens fuerit senex, uel ex his quorum corpus mali habitus sit, celerius moriuntur. Nouimus nos Cambinum, Carolum & Thomam ciues Florētinos, necnon & alios q̄ plurimos huiuscemodī affectos uitio, paucis diebus uitam finisse. Incipit em̄ caro ipsa in hulcere paulatim nigrescere uel liuens fieri: quin & arida interim atq; sicca, & cutis circumiacens nigris impletur pustulis: tum & quæ proxima est, amisso sensu liuet palletque. Nec prius serpere id malū desinit, donec ossa etiam inficiat: quòd si quicquid aridum est, & proximum quoq; locum, uel usq; ad sanū prorsus excideris, reuertitur ta-

men & serpit. Verum cum alia corporis partes hoc malo afficiuntur, plerumque sanantur. In illiusmodi autem membris & calor est debilis, & nervi insunt plurimi, qui cum inficiuntur, facile etiam circa cumiacetia loca inurunt. Vnde & proxima his statim liuent, donec totum membrum miserabiliter occupant atque inficiunt.

Ex carcinomate exagitato mors subsequuta. XLII.

VENIT ad me Philippus quidam textor, cui in leua frontis parte tumor erat immobilis inæqualisque, ac furunculo persimilis, qui etiam tangenti renitebatur. Et uenæ, quæ circa locum erant, pallidæ quodammodo ac liuore quodam suffusæ, ultra decorum intumuerant. Cumque nostrum de hac re perquisiuisset iudicium, consulo ne id malum quoquo modo tollere præsumat, sed leuioribus tantum medicamentis illi blandiatur. Discessit, & cum in manus imperiti cuiusdam medici incidisset, tota iam intra mensem fronte & altero oculo eroso, ad me reuertitur, sciscitansque

tansq; an aliqua salutis superfit spes, uti-
nā, inquit, consulēti tibi fidē habuissē.
Moneo igit iterū hominē, ne ullis præ-
terea utatur medicamētis præterq; blan-
dis ac leuioribus. Quod si asperis et ero-
dētibus uterē, fore ut breuī reliquū etiā
ipsius faciei eroderē. Audiuit tandē ho-
mo, & cū his tantum quæ nos illi secun-
dum hanc intentionē parauimus, medi-
camentis semper usus fuisset, ut ad decia-
num usq; annū superuixit, ita certē si id
malū ex consilio nostro nunq; agitasset,
ad ultimum senectutis peruenisset.

Ramice curatus interijt. LXXIII.

RAmice uexabat Michelotius no-
ster: cumq; sacerdoti cuidam, qui
hanc artem profiteretur, sese curandum
tradidisset, duplici statim ille fascia in-
guen deuinxit, nō repulso in superiores
partēis intestino. Dūq; membrū ipsum
ita ut erat arctius obligatū in octauum
usq; diē detinuisset, essetq; interim ingēs
exorta inflāmatio, quę hominē ea parte,
qua fascia deligabat, miserabiliter cru-
ciaret, repēte omīs amotus est dolor, &

ipse delirare cœpit. Quare cum ad ægrū
ferò quidē, sed tamē uocatus accederē,
primò arteriā tango: cumq; pulsum uix
eleuari perciperē, et faciē inspectās, eam
nimio pallore suffusam, atq; ipsos etiam
oculos cauos effectos aduerterē, iubeo
sacerdotē accersant: tum fasciā illa solu-
ta, locū undiq; nigrescentē cerno: cūq;
specillum hulceri imponerem, omnia
cicumiacētia intestina iam putruisse co-
gnosco. Ex quo paucis dein horis ē
uita discedens, utile nobis documen-
tum sua morte reliquit, languentium sci-
licet corpora non sacerdotibus, qui-
bus tantum animarum cura demanda-
ta est, sed doctioribus medicis tradi o-
portere.

*Puella oculo perforato uisum re-
cuperauit.*

LXXIIII.

QVatuor annos natam puellam ui-
dimus, cui dum ea nodum in pan-
no soluere acuto gladio niteretur, resili-
ens mucro oculum dextrum percussit:
quo perforata ipsius oculi tunica, pluri-
mus statim inde fluxit humor: quare &
si uia

si uisum prorsus amiserit, ipsum tamen haud multò post rite curata recepit. Tāta enim inest uis tenellæ illi ætati, ut hūc ipsum oculi humorem (quod sæpe accidit) in integrum reficere possit.

Iocinoris uitio laborans sola sanguinis

missione sanatur.

LXXV.

IOcinoris uitio afficiebatur Antonius Brunellescus, ex quo cum uehemēs dolor à latere dextro in iugulum humerumq; transmitteretur, et bilem quoque euomentem ægrum singultus etiam penè strangularet, ad hominem uocatus accedo. Verum cum huiuscemodī uitij notæ eadem ferè sint, quæ & lateris abscessum indicant, medicus cui primū ægri cura demandata fuerat, medicamentis & cataplasmatibus eius pectori medebatur. Sed cum dolor & angustia magis magisque hominem affligeret, iubeo sanguinem ex uena, quæ ad iecur dirigitur, statim diduci: & quæ ille insuper pectori adhibuerat medicamenta, iocinori ipsi impono, donec æger ad sanitatem reuertit: quod paucis diebus factū est.

Oportet igitur medicum non solū morbum cognoscere, sed & locum etiam in quo fit, diligentius perscrutari.

Scisso intestino graciliori uita amittitur. LXXVI.

TEnuioris intestini morbo, quē Græci *ἐλεον* uocāt, urgeri cōmune est: sed urgeri, ut sic uitam tollat, inauditū.

Corpulenta quædā mulier, cum modò supra, modò infra umbilicū intolerabili premeretur dolore, nec ullus hinc inde spiritus erumperet, adeò agitata est, ut scisso tandem intestino uitam finierit: quod nisi incisa mortua pluribus innotuisset, nescio an citra mendaciū suspicio nem à me scribi potuisset. Sed & rusticum nouimus, qui cum post longiores tortiones, & uētris diuturnas inflammationes diem obisset, & mortui incideretur corpus, longior in intestino fixura inuenta est: ex qua etiā recentes uuas, quas paulò antè comederat, prorupisse conspeximus.

Vermis ex pectore propulsus. LXXVII.

LAborabat Antonius Siculus molesta quadam tussicula, et cum diu nihil

hil conferentibus auxilijs hoc malū tolerasset, ad nos tandem uenit: rem exponit: consiliū quærit. Nos uerò & quod morbus diutius inueterasset, & qd' multos expertus medicos, nihil omnino p̄fēcisset, putabamus hoc uitium ægrè elidī posse. Verū ne quid intentatum relinqueretur, marrubij succū ex melle ægrū deuorare iussimus singulis diebus: tum & interiectis tēporibus scyllā lambere, donec uermis ex eius pectore unā cum tussi propulsus hominē sanitati restituit.

Calculus ui sua decifus.

LXXVIII.

Nicolaus Rusticus calculo uexabatur, figura, ut postea conspeximus, longiore. Hic cum ab ima parte acutior & asperior esset, uesicā ipsam incidit: tum & testiculorū tunica perfracta post multos ac penē intolerabiles dolores, tandē in cōspectū uenit: quo haud magna postmodum difficultate deducto, cum multi hominē moriturum, & quidē rectē iudicarent (neq; enim uesica cum incisa fuerit, præsertim inferiori

parte, cohæret) ille tamē præter omniū opinionem conualuit: hoc solum ex tanto malo hominī incōmodo relicto, qđ inde semper quoad uixit urinā reddidit.

Os foeminis erosum.

LXXIX.

VRgebatur Rogerij Corbinelli filia in ilibus dextris dolore ferē perpetuo. Quare multis diuerso tēpore uocatis medicis, cum unusquisq; pro ingenio suo (diuersi enim diuersa sentiebāt) puellam curassent, & præsidia nihil omnino profecissent, è medio tandē sublata est. Quare cōsiliū fuit incidere corpus mortuæ, & inuentum est os foeminis erosum, maximamq; ossis partem in puluerē redactā: necnon & circa matris os quatuor quasi lutei tuberculi instar pilæ, quorum tres aqua opplebant, quartus paululum præ cæteris eleuabatur undique dentatus & superficie inæqualis atque durior, utpote qui ex carne atraq; bile genitus esset. Non igitur admodū mirandū est, si in eiusmodi morbis, quorum causæ incertæ abdita que sunt, diuersi medici diuersa sentiant &

loquan

loquatur. Nam & Antonij Iacceti filiū nouimus, qui cum ingenti coxarum dolore uexatus, in maximam primum debilitatē, tum & in mortem nihil iuuantibus medicis, nihilq; conferētibus præsidijs deuenisset, inciso corpore inuentus est pestifer humor in coxa, quo magna pars ossis erosa, etiam in cinerē uersa uidebatur.

Calculo euulso sanata est mulier. LXXX.

C Alculum non in uiris tantum, sed etiam in foeminis concrefcere certum est. Monialis quædam duodecimo iam die urīnam nō reddebat, propterea quod ipsius urīnæ iter calculo obstrueretur, quò etiam materia multa confluerat. Quare cum neq; ænea fistula, neque medicamentis alijs uinci hoc malū posset, insolitum alioquin, sed tamē opportunum consilium capiens, uncū calculo iniicio, ne scilicet concussus iterū in uesicā reuolueretur. Tum ferramēto priorī parte retuso calculū ipsum percussio, donec sæpius ictus in frustra comminuitur; & tunc omni qua potui diligen-

tia, ne quid intus omnino læderetur, un-
cum ipsum pariter ac ferramentum redu-
co: ex quo simul urina atque calculis re-
missis statim sanata est mulier.

Ex solo uento mors subsequuta. LXXXI.

L Odouicum Nicolinum generosi
equitis Othonis filiū uidimus, qui
cum solo uento uiscera & stomachū im-
petēte adeò in monoculo affligeretur,
ut dū pars parte premiſſe, exitu hinc in-
de negato, nō solum uiscera & pectus,
sed scapulæ etiam incredibili extende-
rentur dolore, & spiritus magna ac mise-
rabilis fieret angustia, tertio deniq; die
nihil conferētib; auxilijs è uita migra-
uit. Inciso autem eius cadauere, & uisce-
ra omnia uento plena conspeximus, &
in sinistro cordis uentriculo obduratum
callum inuenimus, qui nucis magnitu-
dinem æquaret. Quare ut illum, hoc est
uentū mortis ipsius, ita hunc scilicet cal-
lum aduersæ hominis ualetudinis cau-
sam fuisse arbitrati sumus.

Brachii

Brachium ab humero diductum. LXXXII.

Cohærere interdum membra ex-
hulcerata uel p̄tinus in utero, aut
etiã uisione consueuerunt. Nos autẽ
puellam uidimus & curauimus, cuius
totum brachium feruentissimæ aquæ ef-
fusione humero cohæserat. Cumq̃ ne-
mo ex prudentioribus medicis inueni-
retur, qui puellam curare auderet (peri-
culum enim erat, ne dum membra ipsa
scalpello discernerentur, neruus incide-
retur, & sanguis immodicus proflueret)
ego solus ut eram iuuenis hanc curã ag-
gressus, paulatim cicatricem ipsam scal-
pello discindo, sanguinem suppressens,
donec ad cubiti iuncturam, ubi neruus
est, deuenio: tum separatim utrunq̃ mol-
liori emplastro circundo: & quoniã ex-
tendere brachium non poterat, iubeo
ut grauiori pondere sumpto, manu id
perferat, donec paulatim extendatur.
Quod cum ipsa diuturnioris temporis
spatio obseruasset, ad pristinũ tandem
statum reuersum est brachium ipsum,

sola gratia & munere illius, qui est benedictus in secula.

Cor pilis refertum.

LXXXIII.

Iacobus latro è patibulo quo suspensus fuerat, ueluti iam mortuus, sed quatenus tamen adhuc uiueret, depositus atque curatus conualuit. Verum, ut erat homo ingenio malo prauoque, ad eadem statim scelera reuolutus, quibus antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur atque suspenditur. Quare hominis admirati nequitiam, mortui cadauer incidendum curauimus: & inuentum est cor eius ob eximiam caliditatem undique pilis refertum. Hoc idem inuentum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibet integras acies pugnando in fugam uertisse. Est ergo non tantum scelesti ingenij signum sed quandoque etiam raræ fortitudinis.

Ex stata febre uita sublata.

LXXXIII.

Ioannes architectus singulis annis statto die, hoc est quo natus fuerat, febre implicabatur: quæ ex putrescenti bile genita, suum circuitum seruans, quartum & decimum non transgrediebatur diem.

diem: Donec senio confectus, et eadem ex more cōplicitus febre natali suo die uī morbi prostratus, naturæ concessit.

Multitudo uermium eiecta.

LXXXV.

L Aurentij lanij filium uidimus, qui septimum agens annum, triduo ex nimia lūbricorū uī ferè mortuus iacuit, solo potu ex gramine, aceto & saccharo uiuens. Quarto autem die cum medicamento ex aloë, myrrha & croco ei propinaretur, duodequingenta supra centum uermibus aluo depositis, statim conualuit.

Recrementa ex naturalibus deiecta. LXXXVI.

P Vellā quoq; uidimus, quæ clauso ani meatu nata, octauoquoq; die recrementa ex naturalibus deijciebat. Cūq; hoc implicita malo usq; ad sextū decimū annum uitam duxisset, uī tandē morbi, quod *σφοδρ* Græci uocant (id autem fit cum intestina circa umbilicū torquent) miserabili cruciatu deiecta è medio sublata est.

Vermes eiecti.

LXXXVII.

I N Auinionis balneis, quæ sunt in a-

gro Senensi, mulierē uidimus quæ con-
tinuis septem diebus aqua epota, quā
plurimos tandē ex ijs, quos medici pro-
pterea quòd cucurbitæ semina imitā-
tur, cucurbitinos uocant, uermes eiecit.
Qui ita inter sese, dum scilicet alter alte-
ri mordicus inhærerent, iungebantur, ut
cum sua ipsi serie quatuor cubitorū lon-
gitudinē excederent, unum tamen cor-
pus, unum duntaxat uermem putares.

Frustulum carnis eiectum.

LXXXVIII.

Illud etiam memoria dignum uide-
tur: Mulier præfocata cum ab omni-
bus pro mortua haberetur, & de eius po-
tius funere quàm de uita cogitarent assi-
stentes, paulatim quasi grauiori somno
excitata, in molestissimā incidit tussim:
qua cum diu agitata esset, durioris tan-
dem carnis frustulū eiecit, & sanata est.

Sed & Iulianus medicæ artis profes-
sus, dum grauiter ægrotaret, & aduenia-
enti medico dolorem quo circa uentri-
culum miserabiliter cruciabatur, expo-
neret, tangente illo (ut fit) ac manib-
us locum pertractante, erupit in uomi-
tum

tum : quo & ipse frustum carnis ad par-
ua pilæ magnitudinem , in quo uermis
non secus ac brucus in siliqua reclude-
batur , eiectans , ad pristinam statim re-
uersus est ualeitudinem.

*Quæ inciso mortuo notatu digna
inuenta sunt.* LXXXIX.

NON uidentur silentio esse præter-
eunda , quæ nuper in inciso Iaco-
bi cuiusdam furis insignis cadauere ad-
notauimus : bifurcatam scilicet uenam ,
quæ à liene ad uētriculum atram defert
bilem , tum & abscessum in sinistro cor-
dis uentre pituita redundantem : postre-
mò & posteriorem eius capitis partem ,
ubi memoriæ sedes est , adeò breuem , ut
tantillam cerebri portiunculam cōtinea-
ret. Quam ob causam cum priorum sce-
lerum , & eorum quæ pro his sæpe pas-
sus fuerat , tormēta scilicet , exilia & car-
ceres minimè recordaretur , toties ad uo-
mitū tanquàm canis impudens reuersus
est , ut in laqueum tandem inciderit , uis-
taq; ac furti finem fecerit.

Vrina ex alienis locis emanans. XC.

Contrahitur etiam ex matris ute-
ro circa naturalia uitium, ut obstru-
ctio meatus, ex quo fluere urina solet.
Vidimus enim & nos puerum quendam,
atq; puellam nobilem hoc uitio laboran-
tes. Quorum alter, cum adeo meatus ip-
se clausus obstructusq; esset, ut meiere
inde non posset, ex angusto admodum
foramine, quod paulum infra glandem
urina ipsa vi sua effecerat, emingebat,
sed non absq; ingenti eiulatu & genitalis
membrum tumore. Altera uero ex loco,
qui est infra pectinem paululum supra
uulvam, urinam reddebat, nullis interim
apparentibus signis atque indicijs, un-
de ipsa naturaliter efferri debuerit. Hanc
autem nos cum parentum rogatu cura-
re tentauerimus, & nullum huic malo ido-
neum inueniretur praesidium, ita ut erat
incurata ad ultimum suae uitae terminum
permanfit.

Ex noxa illata nervis uox deperdita. XC I.

Rusticus quidam cum decliniori ca-
pitis prora percussus recidisset, &
alteram

alteram capitis ipsius partē oppositam ad terrā, ut par fuit, elideret, surrexit quidem, sed mutus: id autem siue ex percussione neruorum, qui regrediuntur ex pectore, siue ex defluenti materia, quæ neruos illos oppleuerit, tam incertum, quàm certissimum ex hoc communicatam noxam neruis ipsis, qui uocē effingunt. Nam & Galenus facile medicorum princeps in libro, quem de interioribus scribit, affirmat fuisse hominē, qui dum glandula illi abscinderetur in collo, & scalpellum neruos ipsos, quibus uox effingit, incideret, illico factus est mutus.

Lumbricis uexatus puer quiescere non poterat.

XCII

PVerum uidimus et curauimus, qui cum nullo modo quiescere posset, sed ita semp hinc inde temerario quodā impetu & inordinato motu ferretur, ut etiam stare uolēs iterum titubaret & caderet, quæsitum est à medicis quænam esset abdita causa huius malī, quod illi dīfentionem cum saltu putabāt. Sed cum

ti

nullam prorsus aliam inuenirēt quàm tī morē, in quem paucis antē diebus puer ipse nescio quam ob rem incidisse dicebatur, idoneis secundum hāc rationem medicamentis puerum curare cœperūt: quæ cum nihil omnino proficerēt, & in nostras tandē deuenisset manus, deprehensa statim morbi causa, quam solos lumbricos esse persensimus, usque adeo ad hoc malum propulsandum facilē & expeditum aditum habuimus, ut hac sola intentione curatus puer, ad pristinam breuī regressus sit ualitudinem.

+ *Mulier ex lapsu urinā cōtinere nō poterat. XCIII.*

VEnit ad me mulier quædam, quæ urinam cōtinere nō poterat: cumque aliquod à nobis præsidium plurimis iam defatigatis medicis exposceret, interrogo an aliquam huius mali causam teneat. Negante illa, iterum quæro ceciderit ne, ex quo fortē anī sedes elisa fuerit. Cumq; & ipsa faterē olīm se de ficu prolapsam, ultimam spinæ uertebra elisisse, nullo tamen inde sensibili percepto nocumēto: & nos non fugeret ori-

ri ex

ri ex ea ipsa uertebra neruū, qui cōstrin-
gendi uesicam uim habet, huius statim
ægritudinis causamprehēdimus. At-
trito enim ex eius lapsu neruo ipso, con-
sequens fuit ut relaxata uesica urinā con-
tinere non posset: quod & sæpe aliās ex
eadem causa accidisse cognouimus,
Hoc igitur nos malo idoneis eliso præ-
sidijs, mulierem ipsam per Dei gratiam
pristinæ sanitati reddidimus.

Calculus in tunica fellis. XCIIII.

DEcessit his diebus mulier nobilis
Diamantes nomine, dolore pro-
strata calculi: sed cum nullū antea ex eo
percepisset nocumentū, uisum est medi-
cis mortuæ cadauer incidere: & reperti
sunt lapides æ plurimi, nō quidem ullus
in uesica, ut putabāt, sed præter unum,
qui in tunica fellis coloris atrī & magni-
tudine castaneæ aridæ cōtinebat, cate-
ri omnes in panniculo, quo cōtegatur he-
par, unde etiā ueluti in folliculo depen-
duli sacculum effecerant. Hanc aut nos
mortis causam ratī, sapiētis uiri consiliū
esse duximus, nihil omnino de incertis

& occultis morbis statuere.

*Ex præcedentibus torminibus erosi uilli, quibus
uis retinendi fulcitur.* XCV.

INtestinorum tormina, quod Græci
δυσεντέριον uocant, exulcerare intesti-
na intus cōsueuerunt, indeq; descendūt
cruentā & muccosa excrementa: cumq;
id mālum diutius inueterascit, aut homi-
nem tollit, aut (qd̄ forsitan deterius est)
nūnq; sanescit. Nā & nos Iulianū quen-
dam nouimus, qui cum post quadragin-
ta dies, quibus hoc morbo uexatus est,
sublatis iam doloribus ac deijciendi cu-
pидitate, eius aluus impendiō liquidior
permanisset, & sæpius q̄ par fuerat fe-
ret, nullis unq; auxilijs curari potuit, qn̄
semper quoad uixit & impetum uētris
cohibere nequiret, et ubicunq; deijcien-
di cupiditas hominē urgeret, ibidē ex-
crementa deponeret, erosis scilicet ex
præcedentibus torminibus atq; cōsum-
ptis uillis, qbus uis ipsa retinendi fulcit̄.

Ex iisdem torminibus erosa uiscera. XCVI.

VIdimus & alium natione Areti-
num, qui cum ijs item torminibus
diutius

diutius vexatus fuisset, ex iisdem denique in erodentia ipsorum intestinorum hucera, tum in tabem, postremò in mortem incidens, erosa intus viscera ostendebat: è quibus dum ita affectus superuixit, ut triennium non exceßerit, continuo sanies effundebatur.

Morbus comitialis.

XCVII.

ET si notissimus inter cæteros morbos esse soleat qui comitialis nominatur, ignotus tamen apud multos plerumque est, ut quem nuper in puella uisimus Aretina: quæ cum huiusmodi inuaderetur morbo, minimè (ut assolet) concidebat, minimeque ex eius ore ferebatur spuma. Sed stans caput tantum hinc inde, ac si quid inspicere uellet, tota cum ceruice mouebat, nihil interim loquens, nihil audiens, nihil sentiens. Cumque iterum ad se reuerteretur, interrogata quid egisset, penitus ignorabat. Causam autem perquirētibz nobis cur puella cum comitiali afficeretur morbo, non concideret, uisum est ex hoc contingere, quòd cōtractio & tentio ad cerebrum nō fer-

retur, cū solus uapor sursum ascenderet, Ex quo nullo rigore cerebrū ipsum intentum ab inordinatis motibus reliqua membra præseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo laborasset, et medici omnes quicunq; eam uiderant, affirmabant, & rei euentus facile comprobauit: cū prorumpentibus mēstruis hoc malū euaserit. Nam ut quandoq; in pueris Venus, ita in puellis menstruorū initium huiusmodi morbū tollere solet.

Elephantia.

XCVIII.

Longis morbis annumeratur is quē ^{ἑλεφαντία} Græci uocant: qui in Italia penē nunq; uisus à medicis, uix dignoscitur. Peregrinum quendam uidimus in grabatulo iacentem, cuius summa corporis parte maculis quibusdā ad atrum colorem uergentibus inficiebatur, & cutis inæqualiter aspera crassaq;, & uelut squamis fœda ac liuens, diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur: quin & ossibus ipsis, ut uidebatur, iam uitiatis, & uniuerso corpore macie ac tabe confecto, ita suræ ipsius os, pedes &

des & manus intumuerant, ut utriusque partis digiti sub tumore ipso conderentur. Quare cum ad hæc mala etiam febricula quædam adderetur, quæ hominem absumeret, unius tantum mensis spatium è uita migrauit ad Dominum, Parcat igitur Auicenna, qui elephantiam tumorem pedum dixit: cum hæc non solum pedes, sed uniuersum corpus afficiat, & species lepræ sit, quæ apud nostros nondum uisa, apud Paulum probè descripta notatur.

Ex calidiori materia caput impetente furit ac moritur puella. XCIX.

INsanæ tria sunt genera, & acutum quodlibet. Vnum cum in accessione febris, aut in suo uigore desipit æger, & aliena loquitur, sed tamen leuata febre statim resipit. Alterum, quod Græci φρενισμὸν uocant, cui semper dementia comes est. Nam licet inter morbi initia resipere interdum uideatur æger, eius tamen mens quibusdam semper imaginibus agitur. Tertium uerò genus est lethale magis ac pestiferum, cum scilicet

cet æger ipse non solum perpetuò desipit, sed & quæcunque agit, impetu quodam & uiolento motu operatur. In huius aut generis lethalem insaniam cum nobilissimi cuiusdam uiri filia prolapsa malè ageretur, & nos ad eam in tempesta nocte uocati accederemus, adeò furētem puellā inuenimus, ut dum hinc inde sese uiolento quodam impetu iactaret, quicquid interim obuium habebat, dentibus arriperet, frangeret, laniaret. Ex quo proprios capillos, brachia & manus, & si quid præterea aliud arripere poterat, ita mordicus, nullo habito discrimine suum ne an alienū esset, apprehendebat, ut nisi scissum ac prorsus laceratum ex eius dentibus eripi nō posset, adeò ut uinciri puellam oportuerit, ne sibi aut alteri noceret. Verum cū paucis post horis furor illi remitti cœpisset, in somnum incidit grauiorē, quo (tametsi nostris præsijs, studio & diligētia ægrè cederet) uix tandē excusso, ab insania quoq; puellam ipsam liberauimus. Sed ut est ingenium mulierum, præfer-

præsertim nobiliū , cum sanitate adepta nihil eorum quæ pro tuenda firmandaq; ualitudine iniuncta fuerāt, obseruasset, & sua uiueret libertate , post integrum mēsem quo pristina usa est ualitudine, in eundem incidit morbū: à quo cū nullis unquam auxilijs potuerit à medicis liberari , unius tantum diei spatium è medio sublata est . Si quis autē huius morbi causam quærat, nos quantum coniectare licuit, materiā credimus fuisse calidiorem, sed paucam tamen: quæ cum caput peteret, suo & incendio & mobilitate puellam furentem redderet . Et quoniam caput ipsum frigidiori materia oppletum fuerat , hanc quoq; , cum & ipsa ut creditur & par fuit, exagitata fuisset, priori illa materia extincta ac resoluta, ipsum deniq; profundiores somnū puellæ fecisse putamus.

vermis è nare proiectus.

C.

Solet interdum acutus & pestifer dolor in capite excitari , quem Græci κεφαλαλγία uocant, sed talem, quo caligent oculi, alienetur mens, citetur uomi-

tus, supprimatur uox, frigescat corpus,
 & ipsa deniq; deficiat anima, rarum est
 uidere. Nam & nos amicum habuimus
 Philippum nomine, qui cum his omni-
 bus ageret malis, & aduentante die se-
 ptimo mors ipsa nullis cōferentibus au-
 xilijs iamiam adesse uideretur, ui tan-
 robustioris naturæ uermem è dextra na-
 re palmo longiorē eiecit: quo propulso,
 omnis statim cū eo amotus est languor.

Spasmo Cynico mortua mulier.

C I.

CUm imperitus quidā medicus cui-
 dam mulierculæ ex gena dextra
 tuberculū furunculo simile scalpello ab-
 scidisset, nulla habita ratione neruorum
 ac uenularum, quibus illud, cum semi-
 ouī magnitudinem expleret, alligabat,
 illico subsequuta est inflammatio ac do-
 lor, ex quo simul infelix mulier in eum
 incidit morbū, quem Græci κυνικόν σπασ-
 μόν uocant: quo dum misellæ illi teme-
 rario quodam motu peruertitur os, & fa-
 cies modò in dexteriolem, modò in sini-
 steriolem partem distenditur, ac totum
 deniq; corpus pallore quodam suffun-
 ditur,

ditur, adeò afflicta mulier, ut cū neq̃ sanguinis missiōe, neq̃ alui ductu, neq̃ unctiōibus ullis, neq̃ alio quouis genere auxiliij hoc malū inhiberi posset, infra paucos admodū dies è uita migrauerit: hoc nobis suo ipsius infortunio documentū relinquēs, ut cū scilicet oportuerit, nō passim nos om̃ibus q̃ sibi chirurgici nomē usurpāt, sed his tantū q̃ doctrina simul usu & iudicio praeualēt, credamus.

Gelatus.

CII.

Post graueis diuturnosq̃ labores, quibus per ingētia frigora turbido & pluuio coelo, perq̃ flagrantissimos aestus diu noctuq̃ perequitans sese fatigarat Antonius Collensis, in difficiliorem tandē incidit aegritudinē: qua statim ut corripiebatur (quod saepe hominī cōtingebat) amissa illico memoria sensuque, eodē quo erat dum ab ea inuaderet habitū perseuerabat, patentibus etiā & incōniuis oculis: si em̃ inter ambulandum hoc illi cōtingebat malū, ambulabat: si inter quiescēdū, quiescebat: sin uerò inter aliud quoduis agendū, tantisper ipa

sum agebat, nihil interim audiens, nihil loquens, nihil cognoscēs, donec cedente morbo ad se regrederet, et tunc etiam nihil eorum quæ egisset, reminiscebat. Ex medicis aut qui hominem uiderint, alijs uirtutem quæ discernit & unit coniungitq, læsam esse iudicantibus, eiusq; noxam cæteris uentriculis iunctum iri uolentibus, adeò ut memoria ex hoc & communis sensus intrinsecus paterent; alijs aliter, & quidem argutius, & morbum & causam explicare conantibus: nos hominem gelatū dicebamus: cum huius morbi notæ, quæ per se satis eruditioribus eas uestigare uolentibus manifestæ sunt, eiusmodi detegerent ægritudinem. Fit autem id malum ex nigriori bile postremū uentrem cerebri impetenti, quæ statim memoriā tollens, suā etiam siccitate cæteros uentres contrahit: quibus clausis tollitur pariter sensus & motus, & quoniā frigidior est, hominem gelat. Quibus uerò medicamentis ad hunc morbū profligandum usi simus, propterea quod eius cura notissima est, intexea

intexere superfluum iudicauimus.

Tensio neruorum ceruicis.

CL. CIII.

G Rauioribus morbis obnoxia ceruix est; sed inter cæteros importunior acutiorq; , qui rigore quodam neruorū erectam ægri ceruicem intendēs, eum sæpe uel intra quartam diem interimit. Quo morbo cum Parmensis quidā Franciscus nomine grauiter urgeretur, & nos ad eum uocati, hominem robustioris naturæ, & qui turgentibus uenis faciem etiam atq; oculos rubicūdiore haberet, inspiceremus, sanguinem statim ex ea uena, quam κεφαλίκη Græci uocāt, mitti iubeo. Tum parciori uictu, hoc est, sola aqua ex melle hominem cibans, hyrcino atq; caprino oleo detonsum madefacio caput: superq; imposto pileo, aluum etiam his medicamentis duco, quibus à capite ipso ac cæteris superioribus partibus deduci resoluique possit humor, qui huius malī causa fuerat: ex quo ocyus affuit illi sanitas quàm mors affutura putabatur.

Ex abscessu gulæ hominem penè iugulatū. CIII.

Aliud quoque morbi genus circa fauces oriri consuevit, & id interdum pestiferū acutumq; : quale in Alexandro Serralio nuper uidimus, cui neque rubor neq; tumor ullus intus in gula aut extrà ostendebat, sed aridum corpus erat & squalidum. Cumq; nihil omnino alimēti demitteret, sed quicquid absumeret statim reiectans uix spiritum traheret, & uox adeò faucibus hæreret, ut ne mutire quidē posset, iugulari prorsus hominem putares : nos tamen & urgentis morbi & ægri uitū ratione habita, utile & præsentaneum remediū duximus sanguinem mittere; tum & cucurbitulis natibus affixis deducere humore conati, frictionibus simul alijsq; præsidijs quæcunq; extrinsecus hominem iuuare poterant, tantisper utendū censuimus, donec ægri fauces detumescerēt. Verum ubi malum his omnibus auxiliis non modò cedere aut leuari, sed in horas uehemētius ac cōtumacius fieri aduertimus, omni abiecta spe ægrum tanquā

quàm proxima nocte moriturum, Deo
& naturæ reliquimus. Hūc autem cum
assistētes, uelut iamiam spiritū exhalas-
turū, signo Crucis ex more in auroram
usq; singulis momētis cōsignarēt ac mu-
nirēt, ecce statim à summis ægri faucibus
tam ingēs ex adaperto intus absces-
su purulētæ materiæ uis effertur, ut ho-
mine penè iugulato, catinulū, in quo re-
cepta est, ad summū repleret labrū. Qua
expulsa, statim resumptus est spiritus, et
æger qui iam pro mortuo lugebatur, ue-
luti ab inferis remeans, paulatim conua-
lescere coepit, donec integram cōsequu-
tus est sanitatem.

Vitio lienis curatus.

C V.

Lienis uitio afficiuntur quamplurimi;
horū sinistra pars tumens ac du-
rior premēti renititur. Quod si diu per-
seuerat (nam interdum perpetuū id ma-
lum est) tumescunt crura: & si hulcera
præterea innascuntur, uix sanescunt.
Multos nos talī uitio affectos curaui-
mus: inter quos unum, quem, cum se-
ptennio hoc morbo vexatus frustra mul-

ta consilia, ac penè infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem capparì, qui tali ægritudini aptissimus cibus est, sola'que ui aquæ, in qua faber ferrarius sæpe candens ferrum extinguit, annua potione liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc uitium inest uis atque uirtus. Vnde & compertum est, animalia quæ apud hos fabros educantur, perquam exiguos habere lienes.

Morbo coeliaco curatus.

C V I.

IN ipsius uentriculi porta morbus in nascitur, qui à Græcis κοιλιακός appellatur. Durescere sub hoc uenter solet, & torminibus premi, aluusq; ipsa adeò nihil reddere, ut ne spiritus quidem infra, sed nec suprà erūpere possit. Paulus pater meus haud mediocris ingenij & doctrinæ uir, hoc morbo malè uexatus, cū diu multa ac uaria auxilia, sed frustra, expertus fuisset, clystere ex solo lacte condito in uentrē iniecto, ac multis sub inde strigmētis depositis, ad pristinam reuersus est sanitatem.

Ex

Ex tenuioris intestini morbo sanatus. CVII.

IN tenuiori intestino acutus interdū & pestifer oritur morbus, ex quo etiā supra umbilicum intolerabiles excitantur dolores, nec spiritus ullus transmittitur: & non solum cibus ipse, sed ster-
cus ipsum plerunque per os redditur. Vomitus autē uariis aut niger existēs, grauioris etiā odoris est. Tali igitur morbo adeò Laurentius amantissimus frater affectus est, ut cum neque missio sanguinis, neque alui ductio, neq; aliud quoduis idoneum auxilium hoc malum frangere posset, materia tandem ad neruos prolapsa, in morbum incidit comitialē. Quo breui & in mortis discrimen adductus, cum triduò hoc habitu iacuisset, nihil omnino degustans, à medicis derelictus est. Verum die quarta, ubi paululum reuiuiscens uinum lambere coepit, resumitur spiritus, & morbus paulatim uī naturæ propulsus, praesidijs cedit, donec tandem per Dei gratiam penitus sublatus, hominem sanum

reliquit : quod non prius tamen effecit,
quàm exactis quatuor mensibus , à die
quo primum ille huiuscemodi affectus
est morbo.

*Morbo uulvæ inedia liberata est
mulier.*

CVIII.

VExari uulvæ morbis ut mulieria-
bus commune , ita sanè inauditū
sic uexari , ut patiens nullum cibi genus
deuorare queat. In cœnobio mōtis Cœ-
lij monialem uidimus , quæ cum huius-
modi uulvæ morbo grauiter afflicta-
tur , ita prorsus quancunque illi submi-
nistraissent escam fastidiebat , ut quodā
uelut impetu æstuātis stomachi eam sta-
tim ut acceperat , uomitione propelle-
ret: quod nos ab irresolubili & crassiori
uento , qui à uulua ipsa uersus stomachū
ferretur, fieri putantes , multa pro re ac
tempore adhibuimus auxilia : quæ cum
nihil omnino proficerent, & ad decimū
ipsa iam diem sola panis buccella (quod
mirum est) uitam traduxisset , uī tan-
dem inediæ deuicto ac penitus profligato

gato morbo, ad pristinā reuerſa eſt mulier ſanitatē.

Aqua inter cutem elifo utero

propellitur. CIX.

Accidit interdum caſu & fortuna ſanari nonnullos, quos medicina curare nō poteſt. Mulierem ſcimus, quæ dum aqua inter cutem adeò laboraret, ut nulla de ſalute eius ſuper'eſſet ſpes, neſcio quo ſpiritu impulſa, de eminenti quodam loco ad terram deuoluatur, & utero ad lapidem elifo diſiectaque, ita prorsus om̃is effuſus eſt humor, ut quæ puerum octimenſem geſtare uidebatur, enixam crederes. Sed nec multo poſt aut tempore aut labore idoneis ad hanc rem adhibitis præſidijs, penitus ſanata eſt mulier.

Alapa mortuus. CX.

EXorta inter duos iuuenis lite, cū alter alterum extento brachio alapa percuffiſſet, in morbum ſtatim, quem ^{ἀποπληξία} Græci uocant, reſolutus uapulans, pucis etiā horis iugulatus in-

terijt. Quare cōuocatis medicis (in uin-
culis enim detinebatur reus) quæsitum
est de causa mortis ipsius. Verum alijs
in ictum ipsum, quo materiam commo-
tam fuisse putarent; alijs in humidiorē
locum, quo diutius obdormierat; non-
nullis etiā in lautiorē uictum & po-
tum pleniorē, quo dum uixit est usus,
huiusmodi malī causam referētibus, in-
discussum apud præsidem remansit iudi-
cium. Nouimus item fullonem quendā
nomine Petrū, qui unico pugno stoma-
cho cuiusdam iuuenis uolentius impe-
rito, hominem interemit.

Gemini pueri.

CXI.


GEminos nasci nullus dubitat, sed
ita nasci, ut indistincti sint, mon-
struosum. Mulier quædam Alexandra
nomine, ex Mediolanensi agro Floren-
tiam ueniens, geminos mares quæstui
spectandos dabat: quorum alter inte-
ger toto corpore, distinctis que mēbris
erat: alter uerò ita scapulis alterius iun-
gebatur uentriculo, ut illo totum caput
inie-

iniecisse uideretur : cætero uerò corpore ab eo seiunctus, nō secus illo de mamma matris lac exugente mouebatur, ac si ipse pariter sugeret. Sed & sub idem ferè tempus uidimus & alios geminos, qui ab humero ad plantam pedis coierant capite excepto, alter sinistro, dextro alter ubi iungebantur cauebat brachio. Coxa, crus, & pes unus ac communis erat. Altera tamen corporis parte integra se iunctaque distinguiebantur.

ANTONII BENIVENII DE
abditis morborum & sensationum causis,

FINIS.

x 3



DE SALVBRIVICTVS

ratione priuatorum, Guin

terio Ioanne Ander

naco interprete.



RIVATOS hanc uiuendi rationē sequi oportet. Hyeme plus esse, minus bibere conuenit. Sed potioni uinum quammeracissimum, esui panis exhibendus est. Carne potius assa, modicè oleribus utendum. Huiusmodi namq; alimentis corpus & siccum & calidum euadet. At Vere potioni adiiciendum: sed paulatim tamen & dilutius bibendum est. Cibo demendum, eoq; molli, pulte uidelicet magis quàm pane, magis oleribus utendū est. Eadem lege transeundum paulatim ab assis ad elixa. Aestate uerò cibo minus duro, & elixis, & oleribus tum crudis, tum coctis, potiōe multa corpus æget: cauendum tamen, ne magna subito di-

ctorum fiat mutatio. Eo tempore aptissima sunt, pulticula mollis, caro elixa, potio quamdilutissima. Atque hæc ita obseruanda sunt, ut corpus molle sit, & frigidum. Nam id calido anni tempore, & sicco, exurit, squalidumque redditur. Itaque his rationibus tueri oportet. Pari autem modo ex Vere in Aestatem, sicut ex Hyeme in Ver constituere, cibis demendo, adiiciendoque potioni. Rursus ex Aestate in Hyemem traducere, dum annus absoluatur, expedit. Per Autumnum cibo paulo pleniore, & siccior uti licet: minus, sed meracius, bibere. Quæ admodum, ubi Hyems bona contigerit, meraca etiam magis & exigua portione, cibo pleniore, & uehementer sicco uti. Ita enim hoc frigido admodum & humido tempore, optima ualetudine frueris, minusque frigus senties. Quod ad habitus & ætates attinet, plenis, mollibus, rubicundulis ob temperaturæ humiditatem siccior uictus ex usu est: Gracilibus, duris, rufis, & nigris humidior.

Nam

Nam huiusmodi corpora sicca sunt. Iuuenibus autē rarior & humidior : quorum ætas sicca est, & corpora magis induruerunt. Senibus magna ex parte sicciior aptus est. Siquidē humidī, molles, & frigidi sunt. Proinde habitus & ætatis, & temporis anni ratione, uitæ modū instituerē oportet, qui præsentibus et calori, & frigori contrarius existat. Sic enim potius sani degemus. Per hyemem celementer ambulandum : æstate conquiescendum est, aut non in sole ambulandum. Obesis cita ambulatio, gracilibus lenta conuenit. Per æstatem frequēti balneo, hyeme raro utendum est : idque magis tenuibus, quàm plenīs. Eo quoque tempore corpus ueste pura, per æstum uili lacerua uelandum est. Obesi, qui graciles fieri cupiunt, labores uniuersos ieiuni subibūt, & sudantes adhuc, necdum refrigerati cibum assument : uinum temperatum, & non perfrigidum prius bibēt : epulæ, sesanum, atque id genus alimēta dulcia sunt, eaque copiosa. Sic enim uel

paucissimis bellarijs saturantur. Semel die cibus assumptus, rarum balneum, lectus per æstatem terra, hyeme durū cubile, sine uestibus obambulatio, quanta maximè fieri potest, conducit. Qui tennes se implere uolunt, præter alia, quæ plenis contraria facient, modicè ieiunij exerceri debent. Vomitu uerò, & uentris deiectione à medicamēto petita sic utendum est. Sex hybernis mensibus uomere utile est. Nam & pituitæ plus, & capitis grauitas subest. Ad hæc dolor præcordia exercet. Deiectionis æstate usus est. Tum enim æstus biliosum corpus reddit, grauitates lumbos fatigant, & genua calore infestantur, uentris oriuntur tormina, & distorsiones. Iam uero superiores corporis partes per inferiores purgandæ sunt. Deiectio autem plenioribus & humidioribus à medicamento magis salso: siccioribus autem, & tenuioribus, & imbecillius à pinguiore, crassioreq; petatur. Pingue igitur & crassum est lac, aqua ex cicere

cere cocta, atque hoc genus alia: tenue
& falsum olus, aqua marina, reliqua:
que huiusmodi. Vomitus prouocandi
hoc pacto sunt. Crassiores ieiuni, &
cursu, citaque ambulatione exercitati
medio die uomere debent. Potui sumat
hyssopi sesquicyathū, aquæ congio in-
tritū, eumq; totum bibat, aceto saleq; ad-
iecto, quò edulcescat. Primum lentè,
mox citius potandū est. Tenuiores, ma-
gisq; imbecilli à cibo uomitum ita mo-
uebunt: Loti calida, meri cyathos tres
bibent, dein epulas varias assument: ue-
rū sine potione, neq; post has biben-
dum est, nisi tanto interuallo, quāto sta-
dia quatuordecim expedias: post uinis
tribus cōmistis utendū est, austero, dul-
ci, & acri. Primum meracius & modicè
paulatimq; bibere, postea dilutius, libe-
ralius, & citius conuenit. Qui uomere
bis in mense uult, melius consulet, si bi-
duo cōtinuarit, quā si post quintūde-
cimū diem uomuerit. Alij secus faciūt.

Qui post epulas uomere uolūt, uel quibus aluus astricta est, his om̃ibus die sapius, uariosq; cibos esse: tum uina bina, aut terna bibere expedit. Quibus uomitus non est utilis, uēter autem sanus est, his contraria superioribus conueniunt. Pueris calida lauatio longo tēpore apta est: uinum dilutius, neq; omnino frigidum. Hoc autem exhibēdum est, quod uentrem minimē attollit, perturbatq; & inflationes parit. Quæ omnia conducūt ne conflictētur, sed maiores, colorationesq; fiant. Mulieribus siccior uictus ex usu est. Etenim cibus siccus, potio meracior carne mollibus idonea est: ad hæc secundis, & foetui nutriendo potior est. Qui corpus exercēt, per Hyemem curare & colluctari debēt. Aestate luctandum modicē, currendum nihil est. In frigore multa ambulatio conuenit. Qui cursu fatigantur, luctari debent. Qui ex lucta fatigationem sentiunt, his currendum est. Quibus exercitatis, uētris proflua oboriuntur, & cruda incoctaque deſeſis

deſciūtur, iſs exercitiorum pars tertia, ciborum dimidia prorsus demenda est. Quippe uenter eorum copiam cōtinendo non est. Ad hoc panem quammaximè assum ex uīno esse oportet: bibere uerò nimis quāmodicè, sed meraciū. Semper autem post cibum conuiſcere: qui ſemel die tunc assumendus est.

Hac enim ratione uenter ſibi commiſſa maximè conſouet, mutatq;. Accidunt huiusmodi profluvia potiffimū iſs, quæ ex uictus conſuetudine carnem denſam acquiſierunt. Nam uenæ denſiores alimēta nō recipiunt. Atqui tales in eodem habitu ſubſiſtere diu non poſſunt, ſed in alterutrā partem declināt. Qui rariores cute ſunt, & hīrſuti magis, carnis eſum ex facili admittunt: labores magis ſuſtinent, diūq; bono corporis ſtatu fruuntur. Qui cibos poſtero die eructant, & præcordiis dolent, iſs ueluti crudis adhuc cibus, diutius dormiendū est: nonnum genus laboris ſubendū est. Vini meraciū, largiūq; bibere oportet.

tet: cibis uti paucissimis. Quippe constat
uentriculum imbecillitatis frigorisq; ui-
tio ciborum copiam concoquendo non
esse. Qui siti premuntur, parcius edent,
minusq; laborabunt, uinum dilutum, si-
mul & frigidissimum bibent, Quos do-
lores uiscerum infestant, uel ex labore,
uel alia quadam ambulatione, sine cibis
recreandi sunt: modica potio conuenit,
maximeq; ea quæ moueat urinam, quo
uenæ ex uisceribus prodeuntes,
repletæ non distendantur.
Nam hinc inflationes
febresq; oriuntur.

F I N I S.

BASILEAE, APVD ANDREAM
CRATANDRVM ANNO

M. D. LXIX.



1529



• 71 •

